

QK13  
.G65  
1889

DICCIONARIO

# BOTÁNICO

DE LOS

NOMBRES VULGARES

CUBANOS Y PUERTO-RIQUEÑOS

POR

MANUEL GOMEZ DE LA MAZA

Doctor en Ciencias Naturales, Licenciado en Medicina, Secretario de la Sección de Ciencias de la Real Sociedad Económica, Miembro numerario de la Sociedad Antropológica, Ayudante del Jardín Botánico y del Museo de Historia Natural de la Universidad.

Mo. Bot. Garden,  
1895.



HABANA.

Imprenta "La AntiMa" de G. Cacho-Negrete,  
CALLE DE ZULUETA NUM. 73.  
1889.

A MIS PADRES.

## ADVERTENCIA.

---

El actual Diccionario establece la clasificación moderna de las plantas que viven en Cuba y en Puerto-Rico. Al efecto, encierra los materiales de las obras que, por cualquier concepto, se refieren á la Flora de ambos países, revisa esos datos cuando son erróneos, indica si son enigmáticos, relaciona los distintos nombres que una misma planta recibe en una y otra isla y atiende preferentemente á los nombres usados por la primitiva raza que vivió en las dos Antillas.

La importancia que en Cuba y en Puerto-Rico ameritan los estudios botánicos—por desgracia tan desatendidos—la rareza de publicaciones sobre esta materia, lo deficiente ó erróneo de la mayoría de las mismas y, en fin, el deseo de ofrecer datos para un léxico general cubano-puerto-riqueño, son los motivos que me decidieron á publicar mi Diccionario, siendo inútil consignar que, de antemano, he contado se dispense benévola acogida á la producción de un obrero dispuesto á servir siempre—según sus fuerzas y las ocasiones—á esas dos islas hermanas. [\*]

---

[\*] Los datos del Diccionario se refieren á Cuba, salvo cuando la abreviatura siguiente: [P. R.] indica que recaen sobre Puerto-Rico.



## OBRAS LOCALES CONSULTADAS.

---

Señor Armas, *Orígenes del lenguaje criollo.*

- » Bachiller, *Agricultura cubana.*
- »       »   *Cuba primitiva.*
- » Balmaseda, *Tesoro del agricultor cubano.*
- » Coloma, *Jardinería.*
- » Fernández, *Arboricultura cubana.*
- » Jiménez, *Aventuras de un mayoral.*
- »       »   *El ingenio.*
- » Lachaume, *El jardinero cubano.*
- »       »   *Plantas textiles.*
- » Morales, *Flora arborícola de Cuba, aplicada.*
- » Oviedo, *Historia física y natural de las Indias.*
- » Pezuela, *Diccionario geográfico de Cuba.*
- » Pichardo, *Diccionario provincial de voces y frases cubanas.*
- » Poey, *Repertorio físico-natural de la isla de Cuba.*
- » Richard, *Fanerogamia de la Historia física, política y natural de la isla de Cuba por R. de la Sagra.*

Señor Sauvalle, *Flora cubana.*

- » Stahl, *Flora de Puerto-Rico.*

*Anales de la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales de la Habana.*

Periódico: *Crónica médico-quirúrgica.*

- » *La Enciclopedia.*
  - » *Revista Enciclopédica.*
  - » *Revista de Ciencias médicas.*
-



## TRABAJOS DEL AUTOR. PUBLICADOS.

---

*Generalidades sobre las Moringeas y descripción, propiedades y utilización del Moringa pterygosperma. Gærtn.*—Revista Enciclopédica, I, número 4, página 168. Habana 1886.

*Estudio fitográfico de algunas plantas cubanas que suministran medicamentos amargos.*—Revista Enciclopédica, II, números 1, 2, 4, 5, página 55 y siguientes. Habana 1887. [En colaboración con el Dr Eugenio Molinet.]

*Análisis y propiedades médicas del aceite de Nogal de la India. [Aleurites Moluccana, Willd.]*—La Enciclopedia, III, número 11, página 548. Habana 1887. [En colaboración con el Dr Eugenio Molinet.]

*Flora de Cuba.*—Tesis para el Doctorado en Ciencias naturales. Habana 1887.

## PROXIMOS A PUBLICARSE.

---

*Estudio sobre la representación de las Leguminosas Papilionaceas en Puerto-Rico y en Cuba.*

*Catálogo de las Perigoníadas cubanas.*

*Nombre moderno y clasificación familiar de las plantas representadas por A. Richard en la Fanerogamia de la Historia física, política y natural de la isla de Cuba por R. de la Sagra. Tomos X y XI. [I y II de la Fanerogamia.]*

*Contribución fitográfica cubano-puerto-riqueña. Catálogo indicador de las familias Thymelæaceas, Menispermæas, Laurineas, Dilleniaceas, Ochnaceas, Cisteas, Sapindaceas, Sabieas, Dichapetaleas, Halorageas.*

*Contribución fitográfica cubano-puerto-riqueña. Catálogo indicador de las familias Samydeas, Rhizophoraceas.*

*Estudios sobre la Flora de Cuba.* [En colaboración con el Dr Eugenio Molinet.]

*Plantas taníferas cubanas.*

---

# DICCIONARIO BOTANICO

DE LOS

## NOMBRES VULGARES

### CUBANOS Y PUERTO-RIQUEÑOS

POR

Manuel Gomez de la Maza.

#### A

- ABÁ. [Fernández.] V. Abás.
- ABABAYA. [Bachiller.] No es nombre taino, sino caribe, de la Fruta bomba.
- ABABEY. [Bachiller.] Nombre taino de una Rutacea enigmática.
- ABABUY. No se usa en Cuba; en algunas Antillas designa á la Jia manzanilla. [Ximenia Americana, Lin.]
- ABACÁ. s. m. La Musa textilis, Nees., Scitaminea filipina, introducida en Cuba, con resultado poco satisfactorio. Suministra un textil dicho Abacá ó Cáñamo de Manila.
- ABÁS. [Fernández.]?, ó Abá.
- ABELLUELO. s. m. [P. R.] Bijáguara en Cuba. [Colubrina ferruginea, Brongn.] En P. R. también la llaman Quitarán.
- ABELMOSCO. s. m. Malvacea de jardín, igualmente nombrada Ambarina [V.]. Es el Hibiscus Abelmoschus, Lin. [Abelmoschus moschatus, Michx.]
- ABEY. s. m. La Jacaranda Sagreana, Cand., y su variedad arborea, Gris. [J. Bahamensis, R. Br., non Cand.], Bignoniacea indígena.
- ABEY HEMBRA. V. Tengue.
- ABEY MACHO. [Fernández.] Bignoniacea cultivada, la Jacaranda cærulea, Gris. [Bignonia cærulea, Lin. Jacaranda Bahamensis, Cand., non R. Br.]
- ABIPILO. [Fernández.]?
- ABRÁN DE COSTA. La Bunchosia nitida, Cand., Malpighiacea indígena.
- ABROJO. s. m. [Cuba y P. R.] Nombre de dos Zygophylleas silvestres, el Tribulus maximus, Lin.; y el T. Cistoides, Lin.

- ABROJO AMARILLO. [Fernández.] ?
- ABROJO DE PIEDRA. [Fernández.] ?
- ABROJO DE LA FLORIDA. *Cactea silvestre*, la *Pereskia Portulacifolia*, Haw.
- ABUTILON. s. m. Nombre científico, pasado al dominio vulgar; designa una *Malvacea* silvestre, el *Abutilon pedunculare*, Kth.
- ACABA. [Bachiller.] V. *Auzuba*.
- ACACIA AMARILLA. [P. R.] *Faurestina* en Cuba.
- ACACIA HOJAS DE LENTISCO. [Fernández.] V. *Humo*.
- ACACIA INSULAR. La *Acacia insularis*, Rich., *Leguminosa*.
- ACACIA LEBBET. [Fernández.] Nombre erróneo. V. *Faurestina*.
- ACACIA LEUCOSEPHALA. [Fernández.] Nombre erróneo. V. *Aromo blanco*.
- ACACIA MICROSEPHALA. [Fernández.] Nombre erróneo. V. *Tocino*.
- ACACIA MIMOSA LATIFOLIA. [Fernández.] ? Nombre erróneo.
- ACACIA MIMOSA SCANDENS. [Fernández.] Nombre erróneo. V. *Boja*.
- ACACIA PÁLIDA. [P. B.] *Aromo blanco* en Cuba. [*Leucæna glauca*, Benth.]
- ACACIA PORTORRIQUEÑA. [P. R.] Nombre erróneo. *Moruro de costa* en Cuba.
- ACACIA PROPINCUA. [Fernández.] V. *Faurestina*.
- ACACIA PUERTO-RIQUEÑA. [P. R.] *Moruro de costa* en Cuba.
- ACACIA SILVESTRE. [P. R.] *Leguminosa silvestre*, la *Albizzia Berteriana*, G.-M. [*Acacia Berteriana*, Balb.] No la hay en Cuba.
- ACACIA VALENZUELANA. [Fernández.] La *Acacia Valenzuelana*, Rich., *Leguminosa*.
- ACACIA YNERMIS. [Fernández.] ? Nombre erróneo.
- ACAJÚ. s. m. Nombre poco usado en Cuba. En otros países, además de la *Caoba* [V.], designa las siguientes plantas que se encuentran en la isla: la *Curatella Americana*, Lin. [V. *Vaca-buey*], el *Anacardium Occidentale*, Lin. [V. *Marañón*], y la *Cedrela Glaziovii*, C. Cand. [V. *Cedro*.]
- ACANA. s. m. *Sapotea* indígena, la *Labourdonnaisia albescens*, Benth. [*Bassia albescens*, Gris. *Sapota Acana*, Moral. *Sapota Marta*, Moral.] [V. *Almiquí*.]
- ACANA DE COSTA. El *Mimusops dissecta*, R. Br., *Sapotea silvestre*. [V. *Ausubo*.]
- ACANTO. s. m. *Acanthacea* cultivada, el *Acanthus mollis*, Lin., ó *Branca ursina*, *Yerba jiganta* y *Ala de ángel*.
- ACAYÚ. V. *Acajú*.
- ACEBO. s. m. *Ilicinea* silvestre, el *Plex Occidentalis*, Macf.
- ACEBO CUBANO. V. *Acebo de sierra*.
- ACEBO DE SIERRA. El *Plex montana*, Gris., ó *Acebo cubano*, *Ilicinea*.
- ACEDIANA. [Pezuela.] ?, ó *Arcediana*.
- ACEITE BENOPTÉRICO. V. *Aceite de Ben*.
- ACEITE DE BEN. Nombre del aceite suministrado por los cotiledones del *Moringa pterygosperma*, Gærtn. Científicamente sería mejor llamado *Aceite benoptérico*. [V. *Ben*.]
- ACEITE DE PALMA CHRISTI. V. *Palma Christi*.
- ACEITE DE PALO. V. *Bálsamo de Copaiba*.
- ACEITE DE RICINO. V. *Palma Christi*.
- ACEITERO. [Fernández.] V. *Citero*.
- ACEITILLO. [Fernández.] ?
- ACEITUNA. s. f. V. *Olivo*.
- ACEITUNILLO. [Fernández.] V. *Aceitunillo de Chile*.
- ACEITUNILLO DE CHILE. El *Ætotoxicum punctatum*, R. & Pav., *Elæagnea* cultivada.
- ACEITUNO SILVESTRE. El *Styrax obtusifolia*, Gris., ó *Azulejo de loma*, *Styracacea* indígena.



- ACELGA. s. f. Chenopodiacea cultivada, la *Beta vulgaris*, Moq., variedad *Ciela*.
- ACHICORIA BLANCA. [Pichardo.] V. Escarola.
- ACHICORIA CIMARRONA. V. Achicoria silvestre.
- ACHICORIA DE CABRO. [P. R.] Compuesta silvestre, el *Senecio Hieracifolius*, Lin. [*Erechtites Hieracifolia*, Raf.], y su variedad *Cacalioides*. Dicha especie carece de nombre vulgar en Cuba.
- ACHICORIA SILVESTRE. Compuesta silvestre, el *Erigeron Canadensis*, Lin., ó *Achicoria cimarrona*. En P. R. se denomina *Pascueta*.
- ACHIOTE. s. m. [Cuba y P. R.] V. Bija.
- ACHIOTE. s. m. V. Bija.
- ACHOTE. s. m. V. Bija.
- ACHUETE. V. Bija.
- ACIBAR. s. m. Jugo amargo extraído de las hojas de diversas Liliaceas del género *Aloe*. Entre ellas se encuentran en Cuba: el *A. vulgaris*, Lam<sup>k</sup>; el *A. Margaritifera*, Ait.; y el *A. Socotorina*, Lam<sup>k</sup>, dichas *Sábila*, *Zábida* y *Zábila*, indistintamente.
- ACUBA. V. Auzuba.
- AÇUBA. [Oviedo.] V. Auzuba.
- ADEDICA. s. f. V. *Vigueta naranjo*. [*Rondeletia Tinifolia*, Gris.]
- ADELFA. s. f. *Apocynaea* cultivada, el *Nerium Oleander*, Lin., ó *Rosa francesa*. Presenta variedades de flor sencilla ó doble y blanca ó rosada.
- ADORMIDERA. s. f. El *Desmanthus virgatus*, Willd., Leguminosa silvestre, y el *Papaver somniferum*, Lin., *Papaveracea* de jardín.
- AFRICANA. s. f. *Asclepiadea* cultivada, la *Stapelia variegata*, Lin., ó *Estrella*.
- AGALLA. s. f. Dáse este nombre, y los de *Arbol de la frutica*, *Roble agalla* y *Roble amarillo* [V.], á una *Boraginea* silvestre, la *Beurreria calophylla*, Gris. Además, se llama *Agalla*, la *Genipa ciliolata*, G.-M. [*Randia ciliolata*, Sauval.] [V. *Jagua-yagüita*.]
- AGALEA DE COSTA. Rubiaceae silvestre, la *Randia aculeata*, Lin. Otros la llaman *Pitajoni bravo*, *Pitajoni espinoso* y *Yamaguey de costa*. [V. *Dragale*.] Es el *Tintillo* de P. R. Actualmente el género *Randia* es sección del *Genipa*.
- AGAPANTO. s. m. [Pichardo.] V. *Tuberosa azul*.
- AGAVE DE MÉJICO. *Tillandsia recurvata*, Lin., Bromeliacea silvestre.
- AGE. s. m. Nombre siboney del Boniato. [*Pomaea Batatas*, Lam<sup>k</sup>.] Erróneamente se identificaba el término *Age* con el de *Name*, hasta que Dn<sup>a</sup> Bachiller y Morales determinó su legítima correspondencia. También se escribe *Aje*, *Axe* y *Haje*. [V. *Zababeyes*.]
- AGENGIBRE. V. *Gengibre*.
- AGOREROS. Nombre taino de los frutos verdes de la *Pitahaya*. [*Cereus Pitajaya*, Cand.] Cuando estos frutos toman el color rojo que le es peculiar en la maduración, reciben el nombre de *Yaguaaraja* ó *Yaguaraba*.
- AGRACEJO. s. m. La *Parathesis Cubana*, Molt & G.-M. [*Ardisia Cubana*, A. Cand.], *Myrsinea* indígena. Se nombra además *Agracejo de sabana* y *Cofa*.
- AGRACEJO CARBONERO. *Exostema Neriifolium*, Rich., Rubiaceae silvestre.
- AGRACEJO DE MONTE. *Samydea* indígena, la *Guidonia Rosauriana*, G.-M. [*Cascaria eriophora*, Wr.]
- AGRACEJO DE SABANA. V. *Agracejo*.
- AGRASEJO CARBONERO. V. *Agracejo carbonero*.
- AGRAZEJO. [Pichardo.] V. *Agracejo*.
- AGRIMONIA. s. f. El *Teucrium Cubense*, Lin.; el *T. inflatum*, Sw.; y el *T. Canadense*, Lin., *Labiadas* silvestres.

- AGRIÓ DE GUINEA. [Pichardo.] V. Aleluya roja de Guinea.
- AGUACATE. s. m. *Persea gratissima*, Gærtn., *Laurinea* cultivada.
- AGUACATE SILVESTRE. *Persea sylvestris*, Rich.
- AGUACATILLO. s. m. 1: El *Ocotea leucoxylon*, G.-M., [Oreodaphne, Nees, Gris.] Esta especie tiene una variedad cubana:  $\beta$ , elongata, G.-M., [Oreodaphne leucoxylon, Nees;  $\beta$ , elongata, Meissner], sin vulgar conocido. 2: La *Nectandra leucantha*, Nees, ó Boniato aguacatillo y Baullúa. [Fernández.] ? [V. Baconá y Baullúa.]
- AGUEDITA. s. f. V. Quina del país.
- AGUEDITA BLANCA. V. Rompe-hueso. [Guidonia sylvestris, G.-M.]
- AGUINALDITO RASTRERO. El *Evolvulus nummularius*, Lin., y la *Dichondra repens*, Forst., Convolvulaceas.
- AGUINALDO. s. m. La *Ipomæa cathartica*, Poir., y la I. *Rudolphi*, Rœm. & Schult. [V. Chamiso y Aguinaldo blanco.]
- AGUINALDO AMARILLO. *Ipomæa umbellata*, Mey.
- AGUINALDO AZUL. *Ipomæa Tamnifolia*, Lin.
- AGUINALDO AZUL-CLARO. *Ipomæa Nil*, Roth, ó Manto de la Virgen [V.], Convolvulacea.
- AGUINALDO BLANCO. Convolvulacea silvestre, la *Ipomæa Sidæfolia*, Choisy. También se llama Aguinaldo [V.], A. de Navidad, A. de Pascua, A. de Pascua de Navidad, Campanilla, C. blanca [V.], Himiní [V.] y Jiminí. A dicha especie corresponde el *Convolvulus monospermum*, Poey. Pichardo trae otros dos Aguinaldos blancos, enigmáticos.
- AGUINALDO BLANCO, FONDO PURPÚREO. [Pichardo.] ?
- AGUINALDO BLANCO-VIOLADO. [Pichardo.] ?
- AGUINALDO COLOR DE CARNE. [Pichardo.] ?
- AGUINALDO DE ALMENDRA. *Ipomæa dissecta*, Pursh.
- AGUINALDO DE NAVIDAD. V. Aguinaldo blanco.
- AGUINALDO DE PASCUA. V. Aguinaldo blanco.
- AGUINALDO DE PASCUA DE NAVIDAD. V. Aguinaldo blanco.
- AGUINALDO DE PINARES. *Ipomæa alterniflora*, Gris.
- AGUINALDO GRANDE, ROJO-CLARO. [Pichardo.] ?
- AGUINALDO MATIZADO. [Pichardo.] V. Aguinaldo purpúreo.
- AGUINALDO PURPÚREO. *Ipomæa purpurea*, Lam<sup>k</sup>.
- AGUINALDO ROSADO. *Ipomæa triloba*, Lin. La especie de Aguinaldo rosado citada por Pichardo es enigmática. La *Ipomæa triloba*, Lin., se dice también Marrullero.
- AGUINALDO VELLUDO. *Ipomæa pentaphylla*, Jacq.
- AGUINALDO VIOLACEO. [Pichardo.] La *Ipomæa Hederæfolia*, Lin., ó Manto de la Virgen [V.].
- AISSO. [Bachiller.] ? ó Aizzo.
- AITÉ. s. m. V. Yaití.
- AIZO. V. Aisso.
- AJE. s. m. V. Age.
- AJEDREA. s. f. El *Hyptis scoparia*, Poit., Labiada silvestre.
- AJENJO. s. m. La *Artemisia Absinthium*, Lin., Compuesta cultivada en Cuba, donde algunos le dan el nombre de Incienso ajenjo.
- AJENJO CIMARRÓN. [P. R.] Escoba amarga en Cuba.
- AJES. V. Age.
- AJÍ. s. m. *Capsicum pendulum*, Willd., [Fernández.] ?
- AJÍ AGUJETA. [Pichardo.] ?
- AJÍ CABALLERO. [Pichardo.] ?
- AJÍ CABEZA DE VACA. [Pichardo.] ?
- AJÍ CACHUCHA. [Pichardo.] ? ó Ají Guinea.
- AJÍ CHILE. ?
- AJÍ COMÚN. V. Pimiento.
- AJÍ CORAZÓN DE PALOMA. ?



- AJÍ CORNICABRA.** ?  
**AJÍ DÁTIL.** ?  
**AJÍ DE CHINA.** V. Tomatillo de la Habana.  
**AJÍ ESCURRE.** [Pichardo.] ?, ó Ají escurre huespedes  
**AJÍ ESCURRE HUESPEDES.** [Pichardo.] V. Ají escurre.  
**AJÍ GUAGUAO.** *Capsicum baccatum*, Lin. Se le ha llamado Ají jíjí.  
**AJÍ GUINEA.** V. Ají cachucha.  
**AJÍ JIJÍ.** V. Ají guaguao.  
**AJÍ JOBITO.** V. Ají jobo.  
**AJÍ JOBO.** [Pichardo.] ?, ó Ají jobito.  
**AJÍ LENGUA DE PÁJARO.** [Pichardo.] ?  
**AJICÓN.** s. m. El *Solanum scabrum*, Vahl, Solanea.  
**AJO COMÚN.** *Allium sativum*, Lin.  
**AJO PORRO.** *Allium Porrum*, Lin., hortaliza introducida. Dícese también Ajo puerro ó Puerro común.  
**AJO PUERRO.** V. Ajo porro.  
**AJONJOLÍ.** s. m. *Sesamum Indicum*, Lin.  
**AKEE DE AFRICA.** Sapindacea cultivada, la *Cupania sapida*, Camb. [Blighia, Koen.], dicha en Cuba Arbol del seso. La semilla, cuyo gran arilo es comestible, constituye el Seso vegetal.  
**ALA DE ÁNGEL.** V. Acanto.  
**ALACRANCILLO.** s. m. Se aplica este nombre á varios *Heliotropium* silvestres, son: el *H. fruticosum*, Lin.; el *H. Indicum*, Lin.; el *H. filiforme*, K<sup>th</sup>; el *H. parviflorum*, Lin.; y el *H. inundatum*, Sw. [V. Araña-gato.]  
**ALACRANCILLO BLANCO.** El *Heliotropium bursiferum*, Wr.; el *H. imbricatum*, Gris.; el *H. pauciflorum*, Gris.; el *H. Serpylloides*, Gris.; el *H. microphyllum*, Sw.; y el *H. humifusum*, K<sup>th</sup>.  
**ALACRANCILLO DE PLAYA.** El *Heliotropium Curassavicum*, Lin., Boraginea silvestre.  
**ALAMBRILO.** s. m. *Dioscorea* indí-
- gena, la *Rajania cordata*, Lin.  
**ÁLAMO AMARILLO.** El *Ficus Indica*, Lin., Urticacea cultivada.  
**ÁLAMO DE VIRGINIA.** El *Populus heterophylla*, Lin., ó Álamo de la Carolina y Álamo del Norte.  
**ÁLAMO DE LA CAROLINA.** V. Álamo de Virginia.  
**ÁLAMO DEL NORTE.** V. Álamo de Virginia.  
**ÁLAMO JAGÜEY.** V. Laurel de la India.  
**ALBAHACA ANISADA.** *Ocimum Basilicum*, Lin.; variedad *Anisatum*.  
**ALBAHACA AROMÁTICA.** El *Orthosiphon glabratus*, Benth., Labiada cultivada [?].  
**ALBAHACA CIMARRONA.** El *Ocimum sanctum*, Lin., y el *O. macranthum*, Willd., ó Albahaca de clavo. Pichardo trae otra especie, el *Ocimum Americanum*, Lin.  
**ALBAHACA DE CLAVO.** V. Albahaca cimarrona.  
**ALBAHACA DE CUCHARA.** [Pichardo.] ?  
**ALBAHACA DE HOJAS ANCHAS.** El *Ocimum Basilicum*, Lin., variedad *bullatum*, ó Albahaca mondonguera, Labiada.  
**ALBAHACA DE HOJAS FINAS.** [Lachaume.] El *Ocimum minimum*, Lin.  
**ALBAHACA DE HOJAS DE LECHUGA.** *Ocimum Basilicum*, Lin., variedad *Lactucæfolium*, Labiada.  
**ALBAHACA DE SABANA.** El *Eupatorium villosum*, Sw., ó Rompezaragüelles [V.], y el *E. Cubense*, Cand., ó Rompezaragüelles de sabana, Compuestas.  
**ALBAHACA DE SANTA RITA.** [Pichardo.] ?  
**ALBAHACA FRANCESA.** [Pichardo.] ?  
**ALBAHACA MONDONGUERA.** V. Albahaca de hojas anchas.  
**ALBAHACA MORADA.** [Pichardo.] ?  
**ALBAHACA VIOLADA.** [Pichardo.] ?  
**ALBAHAQUILLA.** s. f. [Pichardo.]



- Es el *Ocimum sanctum*, Lin., ó *Albahaca cimarrona* [V].
- ALBAHAQUILLO.** s. m. El *Eupatorium odoratum*, Lin., ó *Filigrana* de sabana, Compuesta. En P. R. le dicen Santa María [V].
- ALCACHOFA.** s. f. Compuesta cultivada, el *Cynara Scolymus*, Lin.
- ALCANFOR.** s. f. En Cuba se aplica este nombre á dos *Cycadeas* cultivadas, el *Cycas revoluta*, Thunb., ó *Sagú* [V], Palma elegante de sagú, Palma alcanfor [V.] y Palma sagú [V.]; y el *Cycas circinalis*, Lin., ó *Sagú* y *Tapíoca*.
- ALCAPARRA DE INDIA.** Nombre desusado en Cuba. V. *Marañuela*.
- ALCAPARRO.** s. m. El *Capparis Grisebachii*, Eichl., *Capparídea* indígena.
- ALCAPARRO BEJUCO.** La *Anredera scandens*, Moq., *Chenopodiacea* silvestre.
- ALCÓN.** [Fernández.]?
- ALELÍ.** [Fernández.]? [V. *Lirio amarillo*.]
- ALELÍ AMARILLO.** El *Cheiranthus Cheiri*, Lin., ó *Alelí pajizo* y *Ramo de oro*, *Crucifera* cultivada.
- ALELÍ BLANCO.** V. *Lirio blanco*.
- ALELÍ COMÚN.** [Coloma.]?
- ALELÍ DE MAHÓN.** *Malcolmia maritima*, R. Br., *Crucifera* cultivada.
- ALELÍ GRIEGO.** *Crucifera* de jardín, la *Matthiola Græca*, Cand.
- ALELUYA.** [Pichardo.] V. *Aleluya roja de Guinea*.
- ALELUYA BLANCA.** [Pichardo.]?
- ALELUYA ROJA DE GUINEA.** *Malvacea* cultivada, el *Hibiscus Sabdariffa*, Lin., dicha también *Agrio de Guinea*, *Aleluya* y *Serení*.
- ALFILER.** s. m. V. *Jamaguey de monte*.
- ALGALIA.** s. f. [P. R.] *Abelmosco* ó *Ambarina* [V.] en Cuba.
- ALGARROBO.** s. m. [Cuba y P. R.] V. *Curbaril*.
- ALGARROBO DEL PAÍS.** *Pithecolobium Saman*, Benth., *Leguminosa*.
- ALGARROBO LOCO.** V. *Arbol del amor*.
- ALGODÓN.** s. m. Dáse este nombre á diversos *Gossypium* y á la *lana* que cubre sus semillas. En Cuba se encuentran las siguientes especies: el *G. herbaceum*, Lin.; el *G. arboreum*, Lin.; el *G. hirsutum*, Lin.; el *G. Barbadense*, Lin.; y el *G. racemosum*, Poir. Son *Malvaceas*. En P. R. solamente existe el *G. Barbadense*, Lin., dicho *Algodón*, y dos variedades; de la una es sinónimo el *G. purpurascens*, Poir., ó *Algodón rojo*, y de la otra el *G. Janiphæfolium*, Bello, ó *Algodón yuca*. En Cuba no parece que existe la primera variedad; en cuanto á la segunda puede optarse por la negativa.
- ALGODÓN ROJO.** [P. R.] V. *Algodón*.
- ALGODÓN YUCA.** [P. R.] V. *Algodón*.
- ALGODONCILLO.** s. m. [P. R.] *Cucurbitacea* silvestre, la *Anguria Plumeriana*, Schlecht., y su variedad *trifoliata*, Cogniaux. No existen en Cuba.
- ALGODONCILLO DE MÉJICO.** La *Asclepias incarnata*, Lin.
- ALGODONERO.** s. m. Nombre desusado en Cuba. V. *Algodón*.
- ALHUCEMA DE COSTA.** V. *Balsamillo*.
- ALMÁCIPO.** s. m. [P. R.] En Cuba *Almácigo colorado*.
- ALMÁCIPO AMARILLO.** V. *Almácigo colorado*.
- ALMÁCIPO BLANCO.** [Fernández.] V. *Almácigo colorado*.
- ALMÁCIPO COLORADO.** *Anacardiacea* indígena, el *Bursera gummiifera*, Lin. Recibe otros muchos nombres vulgares; tales son: *Almácigo amarillo*, *A. blanco*, *Cachibú* y, por error, *Azucarero* [V.]; en P. R. le dicen *Almácigo*.

- ALMÁCIGO DE COSTA.** [Fernández.] ?  
ó Almácigo espinoso.
- ALMÁCIGO DE PAREDÓN.** La *Bursera angustata*, Wr.
- ALMACIGO ESPINOSO.** V. Almácigo de costa.
- ALMENDRILLO.** s. m. Dos *Rhamneas* indígenas reciben ese nombre: el *Rhamnidium retusum*, Gris., y el *R. reticulatum*, Gris. [P. R.] V. Cuajani.
- ALMENDRILLO DE COSTA.** El *Rhamnidium revolutum*, Wr., ó Piñipiñi de sabana.
- ALMENDRO.** s. m. Dáse este nombre: 1) á dos *Ternstroemiaceas* indígenas, el *Hemocharis Curtyana*, G. M. [Laplacea Curtyana, Rich.], y el *Hemocharis Wrightii*, G. M. [Laplacea Wrightii, Gris.]; 2) á una *Celastracea* endémica, la *Hippocratea coriacea*, Wr.
- ALMENDRO DE LA INDIA.** *Terminalia eriostachya*, Rich., *Combretacea* indígena, y *T. Catappa*, Lin., cultivada. Esta se dice Almen-drón en P. R.
- ALMENDRO SILVESTRE.** La *Bumelia Cubensis*, Gris., *Sapotea silvestre*.
- ALMENDRÓN.** s. m. [P. R.] V. Al-mendro de la India.
- ALMEZ DE FLORES PEQUEÑAS.** [Fernández.] *Trema micrantha*, H. Bn, *Urticacea* cultivada.
- ALMIDÓN.** s. m. Fécula extraída de los talomas de la Yuca agria y de la Y. dulce [V.]
- ALMIJE.** [Fernández.] V. Mije.
- ALMIQUÍ.** Otro nombre del Acana [V.]
- ALMIRONCILLO.** s. m. *Senecio* species [Cacalia discolor, Gris.], *Compuستا* indígena.
- ALMOREJO.** s. m. V. Rabito peludo.
- ALMORRANA.** s. f. La *Ipomæa pterodes*, Choisy, ó Tomate de mar.
- ALPISTE.** s. m. *Graminea* cultivada el *Phalaris Canariensis*, Lin.
- ALVERJA.** s. f. *Leguminosa* cultivada, la *Vicia sativa*, Lin. Otros escriben Arverja ó Arveja. [V. Chicharo.]
- AMAPOLA.** s. f. *Papaveracea* cultivada, el *Papaver rhæas*, Lin. En la provincia de Santiago de Cuba se le dice Camelia [V.]. [Pichardo.] En Holguín y Puerto Príncipe, se nombra Amapola el Mar Pacífico [V.]
- AMARANTO.** [Pichardo.] ?
- AMBARINA.** s. f. V. Ábelmosco y Viuda.
- AMIQÚ.** [Fernández.] Nombre erróneo por Almiquí [V.]
- AMOR SECO.** Las *Leguminosas* siguientes: *Desmodium barbatum*, Benth.; *D. incanum*, Cand.; *D. axillare*, Cand.; y *D. ciliare*, Cand., ó Pegapega [V.]. También la *Pri-va echinata*, Juss., *Verbenacea*.
- AMOR SECO CHICO, DE CUBA.** [Colmeiro.] *Desmodium canescens*, Cand.
- AMOR SECO GRANDE, DE CUBA.** [Colmeiro.] La *Lespedeza polystachya*, Michx., *Leguminosa*.
- AMOR SECO MEDIANO, DE CUBA.** [Colmeiro.] El *Desmodium infractum*, Cand., *Leguminosa*.
- ANA.** s. f. [Bachiller.] Término tai-no que significa Flor.
- ANACAGÜITA.** [Pichardo.] V. Anacahuita.
- ANACAHUITA.** s. f. *Boraginea* mejicana, cultivada en Cuba; la *Cordia Boissieri*, A. Cand.
- ANAMÚ.** s. m. La *Petiveria Alliacea*, Lin., *Phytolaccacea*.
- ANANA.** s. f. V. Piña morada. [Ananas Cubense, G. M.]
- ANEA.** s. f. V. Espadaña.
- ANÉMONE.** s. f. La *Anemone coronaria*, Lin., y la *A. hortensis*, Lin., *Ranunculaceas* de jardín.
- ANGÉLICA.** [Fernández.] ?
- ANIGUAMAR.** [Oviedo.] Nombre si-boney de una variedad de Boniato [V.]
- ANÍS.** s. m. V. Badiana.
- ANNONA.** [Las Casas.] El Anón [V.]

- ANÓN.** s. m. [Cuba y P. R.] La Anona squamosa, Lin., ó Anón de escamas, Ate y Ates, Anonacea cultivada. [P. R.] La Anona dolabriptela, Cand., no cubana.
- ANÓN DE ESCAMAS.** V. Anón.
- ANONA.** s. f. V. Mamón.
- ANONA DE MÉJICO.** ?
- ANONCILLO.** s. m. Anonacea endémica: la Rollinia Franci-Frias, Moral, [Anona Cascarilloides, Wr.], ó Anoncillo de paredón y Anoncillo de sabana. [V. Laurel de cuabal y Mamoncillo.]
- ANONCILLO DE CUBA.** La Anona Laurifolia, Dun., ó Laurel de sabana, Anonacea silvestre.
- ANONCILLO DE PAREDÓN.** V. Anoncillo.
- ANONCILLO DE SABANA.** V. Anoncillo.
- ANOTO.** [Armas.] V. Bija.
- ANTEJO.** [Pichardo.] ?
- ANTEJO DE POETA.** Acanthacea bengala, cultivada en Cuba; la Thunbergia alata, Hook. Presenta algunas variedades, como la Aurantiaca, la Alba y la Luteo-unicolor, diciéndose también Ojo de poeta.
- AÑIL.** s. m. El Indigofera Pascuocorum, Benth.; el I. Anil, Lin.; el I. tinctoria, Lin.; y la Dalea Tephrosioides, Gris, [Indigofera microcarpa, Desv.], Leguminosas. En P. R. solo se llama Añil el I. Anil, Lin.
- AÑIL CENIZO.** [P. R.] V. Barbesco.
- AÑIL CIMARRÓN.** El Indigofera Lespedezioides, Kth?, ó Jiquilete
- AÑIL DEL PINAR.** V. Sumaque.
- AÑIL FALSO.** [P. R.] La Tephrosia Aniloides, Bello, Leguminosa endémica.
- AÑIL FRANCÉS.** Sesbania Ægyptiaca, Pers., Leguminosa.
- AÑIL RACIMILLO.** [P. R.] Leguminosa silvestre, la Tephrosia leptotachya, Cand. No la hay en Cuba.
- AOBARA.** El Elæis Guineensis, Lin., planta africana, cultivada en las Antillas adonde ha traído su nombre africano de Aovora. El término Aobara debe desterrarse de los del lenguaje taino, igual que el de Aovara. [V. Corajo de Guinea.]
- AOVARA.** V. Aobara.
- AOVORA.** V. Aobara.
- APASOTE.** s. m. El Chenopodium Ambrosioides, Lin., Chenopodiacea silvestre, y el C. Anthelmincticum, Lin. [V. Bien-granada.]
- APASOTE BLANCO.** [Pichardo.] V. Cenizoblanco.
- APICHŪ.** [Armas.] Nombre siboney del Boniato [V.].
- APIO.** s. m. Umbellifera cultivada, el Apium graveolens, Lin.
- AQUILÓN.** s. m. [P. R.] Rubiacea silvestre, la Guettarda resinosa, Pers. [Stenostomum resinosa, Gris.] En Cuba carece de nombre vulgar.
- ARABO COLORADO.** El Erythroxylon obovatum, Macf., y el E. rufum, Cav., Linaceas silvestres.
- ARABO DE PIEDRA.** V. Cubanicú.
- ARAIGAN.** [Bachiller.] V. Arraigan.
- ARALEJO.** [Fernández.] ?
- ARALIA BLANCA.** ?
- ARALIA ELEGANTE.** [Lachaume.] La Aralia elegans, Lindl., [Oreopanax, Decsne & Planch.] Es una Araliacea cultivada.
- ARANDA.** [Pichardo.] ?
- ARAÑA.** s. f. El Panicum distichum, Lamk., Graminea indígena, y la Nigella Damascena, Lin., Ranunculacea cultivada, dicha además Arañuela.
- ARAÑA-GATO.** Gesneriacea silvestre, la Martynia diandra, Glox, ó Martynia y Alacrancillo [V.].
- ARAÑUELA.** s. f. V. Araña.
- ARARÁ.** s. m. V. Júcaro de playa.
- ARARÁ DE HOJAS ANGOSTAS.** [Fernández.] V. Júcaro espinoso.
- ARBEJA.** V. Alverja.
- ARBERJA.** V. Alverja.
- ARBICUAJER.** [Fernández.] ?



ARBOL BONITO. [Fernández.]?  
 ARBOL DE JUDAS. V. Arbol del amor.  
 ARBOL DE LA BIBIJAGUA. V. Bijáupa.  
 ARBOL DE LA CERA. V. Arbol del sebo.  
 ARBOL DE LA FRUTICA. V. Agalla.  
 ARBOL DE LA GALLINA. V. Palo de gallina.  
 ARBOL DE LA NUEZ. V. Rascabarriga amarillo. [Genipa calophylla, G. M.]  
 ARBOL DE LA VIDA. [Fernández.]?, ó Güiquí.  
 ARBOL DEL AMOR. El *Cercis siliquastrum*, Lin., Leguminosa cultivada. Dícese también Algarrobo loco, Arbol de Judas y Ciclamor.  
 ARBOL DEL CUERNO. La *Acacia cornigera*, Rich., Leguminosa.  
 ARBOL DEL PAN. Úrticacea cultivada, el *Artocarpus incisa*, Lin., ó Castaño del Malabar.  
 ARBOL DEL SEBO. *Stillingia sebifera*, Michx., Euphorbiacea china, cultivada en Cuba. Además, se nombra Cera ó Arbol de la cera.  
 ARBOL DEL SESO. V. Akee de Africa.  
 ARBOL DEL ULE. V. Oli.  
 ARBOL DEL VIAJERO. La *Ravenala Madagascariensis*, Sonn. [Urania speciosa, Willd.], Scitaminea cultivada. Hay quien le dice Ravenala. Fernández la llama Palma urania [V.] y Rabanela [V.], dándole el nombre técnico de Areca rubra, lo que es erróneo.  
 ARCE DE VIRGINIA. [Fernández.] El *Acer rubrum*, Lin.  
 ARCEDIANA. [Pezuela.] V. Acediana.  
 ARETILO. s. m. La *Savia sessilifera*, Willd., Euphorbiacea indígena, dicha también Carbonero de costa, Carbonero de sabana y Macó [V.].  
 ARGELINO. [Fernández.]?  
 ARMUELLES. s. m. El *Atriplex cristata*, Kth., Chenopodiacea indígena.

ARNICA. s. f. El *Arnica montana*, Lin., Compuesta cultivada.  
 AROMA BLANCA. V. Aromo blanco.  
 AROMA DE LAGUNA. *Cephalanthus Occidentalis*, Lin., Rubiaceae.  
 AROMO AMARILLO. Leguminosa silvestre, la *Acacia Farnesiana*, Willd. Su nombre siboney es *Cují*.  
 AROMO AMARILLOSO. [Fernández.] V. Aromo amarillo.  
 AROMO BLANCO. *Leucaena glauca*, Benth., Leguminosa.  
 AROMO UÑA DE GATO. [Fernández.] V. Manca-montero.  
 ARRAGAN. [Coloma.] V. Arrayán.  
 ARRAIGAN. s. m. La *Myrica punctata*, Gris., Myriceae indígena.  
 ARRAYÁN. s. m. El *Myrtus communis*, Lin., Myrtaceae cultivada. En España sus frutos se llaman Murtiños, pero en Cuba no tienen nombre especial. Además de dicha especie, se nombra Arrayán á una *Solanea* indígena, la *Goetsea amæna*, Gris., ó Rascabarriga.  
 ARRIERO. [Fernández.]?  
 ARROW-ROOT. Nombre indio que significa Raíz de flecha, y dado á productos feculentos de los talomas del Tulola, del Sagú ó Yucquilla y del Yerén [V.].  
 ARROW-ROOT DE LA INDIA. Fécula extraída de los talomas de la *Marranta Arundinacea*, Lin., variedad Indica [M., Indica, Tuss.], ó Sagú [V.].  
 ARROW-ROOT DE LAS ANTILLAS. V. Arrow-root del oeste indio.  
 ARROW-ROOT DEL OESTE INDIO. Fécula procedente de los talomas del Tulola [V.]. Se le dice también Arrow-root de las Antillas.  
 ARROZ. s. m. Gramínea cultivada, el *Oryza sativa*, Lin. [V. Oriza].  
 ARROZ CANILLITA.  
 ARROZ DE AFUERA.  
 ARROZ DE VALENCIA.  
 ARROZ DE LA TIERRA.  
 ARROZ DEL NORTE.  
 ARROZ SILVESTRE. } Variedades de Arroz [V.]

- ARTEMISA. s. f. La Ambrosia Artemisiaefolia, Lin., Compuesta.
- ARTEMISA DE PLAYA. Iva Cheiranthifolia, Kth., Compuesta.
- ARTEMISILLA. s. f. V. Escoba amarga.
- ARUÑA-GATO. V. Volatina.
- ARVEJA. V. Alverja.
- ASAFÉTIDA. s. f. Gomo-resina de una Umbellifera cultivada, la Ferula Assa-fetida, Lin.,
- ASCLEPIAS DE SYRIA. [Lachaume, Textiles.] V. Yerba acolchada.
- ASTROMEDA. s. f. [P. R.] Júpiter en Cuba.
- ATABAIBA. s. f. V. Lirio blanco.
- ATE. s. m. V. Anón.
- ATEJE. s. m. La Cordia Callococca Lin., Boraginea indígena. [Fernández.] La Cordia Ulmifolia, Juss., variedad  $\gamma$ , lineata, Cand. [Fernández núms 16 y 19.] ? La Cordia globosa, Kth [según Fernández.], y la C. tremula, Gris. [V. Carey.]
- ATEJE AMARILLO. [Fernández.] La Cordia rotundifolia, R. & Pav., [Varronia rotundifolia, Cand.] ? Es el Paraíso de Méjico ó Uva gomosa. [V. Varía blanca.]
- ATEJE BLANCO. [Fernández.] V. Vomitel blanco [Cordia Galeottiana, Rich.] y Varía blanca.
- ATEJE DE COSTA. La Beurreria succulenta, Jacq., ó Roble negro, Boraginea indígena.
- ATEJE DE CUBA. [Fernández.] ?
- ATEJE HEMBRA. V. Vomitel blanco.
- ATEJE MACHO. V. Vomitel blanco.
- ATEJILLO. s. m. V. Vomitel blanco.
- ATES. V. Anón.
- ATIBIUNEIX. [Oviedo.] Nombre indígena de una variedad de Boniato. [V. Atibunisix.]
- ATIBUNISIX. [Bachiller.] Término más propio que el de Atibiuneix [V.]
- AURÍCULA. s. f. [Coloma.] V. Oreja de oso.
- AUSÚ. s. m. [P. R.] Myrtacea silvestre, la Pimenta vulgaris, W. & Arn. En Cuba se cultiva, llamándose Pimienta de Jamaica.
- AUSUBO. [Fernández.] V. Auzuba [P. R.] El Acana de costa en Cuba ?
- AUVERNIA. [Pichardo.] V. Luisa.
- AUYAMA. s. f. V. Calabaza común. También se dice Ayote.
- AUZUBA. s. f. El Sideroxylon Auzuba, Plum. No es el Sapote, como dice Bachiller, sino una planta de la familia Sapoteas. Se escribe su nombre de las siguientes maneras: Acaba, Acuba, Açuba, Ausubo, Avsuyo y Azuba. [V. Acana de costa.]
- AVELLANA. s. f. Fruto importado de la Cupulifera Corylus Avellana, Lin., planta dicha Avellano común.
- AVELLANA DE AMÉRICA. [Fernández.] La Omphalea triandra, Lin., Euphorbiacea.
- AVELLANO COMÚN. V. Avellana.
- AVELLANO DE COSTA. Nombre de dos Euphorbiaceas silvestres: la Omphalea diandra, Lin., y la O. trichotoma, J. Müll.
- AVELLANO DE CUBA. [Colmeiro.] La Avellana de América [V.]
- AVELLANO DE HECHICERAS. Traducción española del nombre vulgar Witch-hazel. Corresponde á una Saxifragacea desconocida en Cuba, la Hamamelis Virginica, Lin., [V. Hamameliná.]
- AVENA. s. f. La Avena sativa, Lin., Graminea cultivada.
- AVSUVO. [Fernández.] V. Auzuba.
- AXE. V. Age.
- AXES. V. Age.
- AXI. V. Aji.
- AYABACANEL. [Bachiller.] ?
- AYABADÍA. [Bachiller.] Otro nombre indo-americano de la Bayuda ó Bayúa.
- AYAPANÁ. s. f. El Eupatorium Ayapanoides, Gris., Compuesta.
- AYOTE. [Armas.] V. Auyama.

- AYŪA. s. f. El *Xanthoxylon Clava-Herculis*, Lin., ó *Ayuda*, Rutacea silvestre.
- AYŪA BARÍA. V. *Ayua* varía.
- AYŪA CIBIACEA. [Fernández.]?
- AYŪA COMO PIMIENTA. [Fernández.]?
- AYŪA PRIETA. Anacardiacea indígena, la *Bursera glauca*, Gris.
- AYŪA VARÍA. El *Xanthoxylon duplicipunctatum*, Wr.
- AYUDA. s. f. V. *Ayúa*.
- AYUDA BLANCA. *Xanthoxylon Juglandifolium*, Willd., ó *Ayuda hembra*, Rutacea silvestre.
- AYUDA HEMBRA. V. *Ayuda* blanca.
- AYUDA PRIETA. V. *Ayuda* sin espinas.
- AYUDA SIN ESPINAS. El *Xanthoxylon Bombacifolium*, Rich., ó *Ayuda prieta*.
- AZAFRÁN CIMARRÓN. V. *Azafrán* del país.
- AZAFRÁN DE OTOÑO. *Crocus sativus*, All., *Iridea* cultivada.
- AZAFRÁN DE PRIMAVERA. *Crocus vernus*, All.
- AZAFRÁN DEL PAÍS. *Amaryllidea* indígena, el *Hypoxis Scorzonerefolia*, Lamk., ó *Yuquilla* [V.] y *Azafrán cimarrón*.
- AZOFAIFA DE COSTA. *Sarcomphalus Havanensis*, Gris., y *S. acutifolius*, Gris., *Rhamneas* silvestres.
- AZOFAIFA DE PLAYA. *Rhamnea* indígena, el *Sarcomphalus divaricatus*, Gris.
- AZOFAIFA DE LA ESPINA DE CRISTO. *Rhamnea* cultivada, el *Zizyphus Spina-Christi*, Willd.
- AZOTA-CABALLO. [P. R.] Palo bronco de pinares en Cuba.
- AZUBA. [Armas.] V. *Auzuba*.
- AZŪCAR. Producto dulce y cristizable que se extrae del jugo de diversas plantas, tales como la *Caña de azúcar*, la *Remolacha*, el *Melón* y el *Maíz*.
- AZUCARERO. s. m. Anacardiacea indígena, el *Hedwigia balsamifera* Sw., [*Icica Hedwigia*, Rich.], ó *Azucarero de montaña*, Palo cochino y Palo de cochino. [Sauvaille da el nombre de *Azucarero* al *Bursera gunnifera*, Lin., ó *Jacq.*, que es el *Almácigo amarillo*, *Almácigo colorado* ó *Cachibú*.]
- AZUCARERO DE MONTAÑA. V. *Azucarero*.
- AZUCARITO. s. m. La *Paullinia pinata*, Lin., Sapindacea.
- AZUCENA. s. f. El *Lilium candidum*, Lin., ó *Lirio blanco*, Liliacea.
- AZUCENA DE MÉJICO. V. *Tararaco*.
- AZUCENA LISTADA. El *Amaryllis vittata*, Ait., *Amaryllidea*.
- AZUCENA ROJA. El *Lilium bulbiferum*, Lin.
- AZUCENA SILVESTRE. V. *Martagón*.
- AZUFRE VEGETAL. *Lycopodium cernuum*, Lin., *Lycopodiacea*.
- AZULEJO. s. m. El *Eranthemum nervosum*, R. Br., *Acanthacea* cultivada. [Pichardo.] V. *Velesa*. [Fernández.] V. *Azulejo de monte*.
- AZULEJO BEJUCO. *Euphorbiacea* silvestre, el *Phyllanthus scandens*, J. Müll.
- AZULEJO DE LOMA. V. *Aceituno* silvestre.
- AZULEJO DE MONTE. El *Phyllanthus virens*, J. Müll., *Euphorbiacea*.
- AZULEJO DE SABANA. El *Symplocos Cubensis*, Gris., *Styracacea*.
- AZULEJO DE LA ISLA DE PINOS. El *Symplocos Salicifolia*, Gris., *Styracacea* indígena.
- AZULEJO DEL PINAR. *Symplocos Martinicensis*, Jacq.
- AZULEJO DEL ROSARIO. *Symplocos ovalis*, Wr., *Styracacea* endémica.

B

- BACABUEY. [Fernández.] Ortografía errónea de *Vaca-buey* [V.]
- BACAGÜE. [Fernández.]?
- BACONÁ. s. m. La *Alchornea latifolia*, Sw., ó *Aguacatillo* [V.]
- BACONAO. [Pichardo.]?



- BACONATO.** [Bachiller.]?
- BACQUOAS.** [?] V. Pándano caracolillo.
- BACŪ.** [Fernández.]?
- BACUEY.** [Pichardo.]?
- BADIANA.** s. f. Nombre vulgar de una Magnoliacea silvestre, el *Illicium parviflorum*, Michx; llámase, además, Anís, y es el representante local del *Illicium Anisatum*, Lin., de la China, dicho Badiana ó Anís estrellado y cultivado en Cuba.
- BADIERA.** s. f. Dos Polygaleas indígenas reciben este nombre, la Badiera Domingensis, Cand., y la Badiera diversifolia, Cand. La primera especie se nombra Badiera de Santo Domingo en P. R.
- BADIERA DE SANTO DOMINGO.** [P. R.] V. Badiera.
- BAGÁ.** s. m. Anonacea indígena, la *Anona palustris*, Lin., ó Palo bobo de Cuba; Cayur en P. R.
- BAHAMA.** s. f. [Pichardo.] V. Yerba de la Bermuda.
- BAIGŪA.** [Bachiller.]?, ó Baygua.
- BAINA.** [Fernández.]?
- BAITOA.** [Bachiller.]?
- BAJAQUILLO.** s. m. El *Baccharis Halimifolia*, Lin.
- BALDOMERO.** s. m. [Fernández.]?
- BALLITO.** [Fernández.] Probablemente el Bayito [V.].
- BALONÁ.** [Fernández.] Ortografía errónea de Baconá [V.].
- BALSAMILLO.** s. m. Boraginea silvestre, la *Tournefortia Gnaphalodes*, B. Br., ó Alhucema de costa, Incienso de playa é Incienso marino. En P. R. se llama Balsamillo á una Rubiaceae silvestre, el *Coccyzselum repens*, Sw. Existe en Cuba, careciendo de nombre vulgar.
- BÁLSAMO AMARILLO.** [P. R.] V. Ponasí amarillo.
- BÁLSAMO COLORADO.** [P. R.] V. Ponasí.
- BÁLSAMO DE COPAIBA.** V. Bálsamo de Copaiba.
- BÁLSAMO DE COPAIVA.** Nombre del *Copaifera officinalis*, Lin., Leguminosa cultivada, que produce la oleo-resina impropriamente llamada Bálsamo de Copaiba, Bálsamo de Copaiva y Aceite de palo. [V. Oleo-resina de Copaiva.]
- BÁLSAMO DE GUATEMALA.** Especie de bálsamo confeccionado con las semillas del *Myrospermum pubescens*, Kth, variedad emarginatum [Myrospermum emarginatum, Klotz.], Leguminosa cultivada, que constituye modernamente la única especie de su género.
- BÁLSAMO DE TOLŪ.** Indistintamente se designa con ese nombre una Leguminosa cultivada, la *Toluiifera Balsamum*, Lin. [Myrospermum Toluiferum, Rich., Miroxylon Toluifera, Kth.], y la resina que suministra.
- BÁLSAMO DEL PERŪ.** Leguminosa cultivada, la *Toluiifera Balsamum*, Lin., variedad Peruiferum. [Myrospermum Peruiferum, Cand.]
- BÁLSAMO MASŪ.** V. Bálsamo Mazú.
- BÁLSAMO MAZŪ.** [Fernández.] No hay planta que lleve tal nombre, sino un medicamento cubano.
- BÁLSAMO TRANQUILO.** [Fernández.] Nombre de un medicamento, no de una planta.
- BAMBŪ.** s. m. Gramínea aclimatada, la *Bambusa Arundinacea*, Willd., también dicha Caña brava y Pito.
- BANANA.** s. f. El fruto del Bananero. Es palabra poco usada en Cuba, donde se sustituye con la de Plátano [V.].
- BANANERO.** s. m. V. Plátano.
- BANDERA DE ESPAÑA.** V. Soberbia.
- BANDERILLA.** s. f. Labiada brasileña cultivada en Cuba. Es la *Salvia splendens*, Ker, ó Mimos.
- BAOBAB.** s. m. Nombre vulgar de la *Adansonia digitata*, Lin., Malvacea africana, cultivada en Cuba. En el Africa dan á sus frutos un

- nombre cuya traducción es Pan de monos.
- BARBA DE INDIO.** Las plantas designadas con este nombre son Gramíneas silvestres, denominándose: *Eragrostis reptans*, Nees; *Eragrostis Bahiensis*, Schrad.; *Eragrostis pilifera*, Benth.; *Chloris petraea*, Thunb.; *Chloris radiata*, Sw.; *Panicum proliferum*, Lam<sup>k</sup>; *Panicum dichotomum*, Lin.; y *Tricholæna Insularis*, Gris.
- BARBA ESPAÑOLA.** V. Guajaca y Guajaquillo.
- BARBASCO.** s. m. [P. R.] V. Cúrbana. [Canella alba, Murr.]
- BARBERO.** s. m. V. Jazmín de la tierra. [Allamanda cathartica, Lin.]
- BARBESCO.** s. m. La *Tephrosia cinerea*, Pers., variedad *littoralis*; Leguminosa.
- BARÍ.** s. m. Es la Guácima amarilla ó Varía [V].
- BARÍA.** s. f. V. Varía.
- BARÍA BLANCA.** V. Varía blanca.
- BARÍA CARBONERA.** [Fernández.] ?
- BARIAO.** s. m. [Cuba y P. R.] *Meliacea* silvestre, la *Trichilia trachyantha*, C. Cand. [*Moschoxylum trachyanthum*, Gris.]
- BAROLA.** [Fernández.] ?
- BARRIGONA.** s. f. El *Colpothrinax Wrightii*, Gris, & Wendel., ó *Palma barrigona* [V].
- BARRILLA.** s. f. La *Batis maritima*, Lin., planta indígena, clasificada antiguamente entre las *Chenopodiaceas* pero que en la actualidad constituye por sí sola la familia *Batideas*. También se llama Yerva de vidrio.
- BASTÓN DE SAN FRANCISCO.** El *Leonotis Nepetæfolia*, R. Br., Labiada indígena, conocida además por Cola de león. En P. R. se le dice Rascamonio.
- BATATA.** s. f. En Cuba no se usa tal nombre, empleándose el de Boniato [V]. Según Pichardo, solo se aplica á una de las variedades de la planta indicada.
- BATATA BLANCA.** [Pichardo.] ?
- BAULLÍA.** s. f. No debe confundirse con Bayúa [V]. Es el nombre vulgar de una *Laurinea* silvestre, la *Nectandra leucantha*, Nees, ó Aguacatillo. Impropiamente se escribe Bauyúa.
- BAUYÚA.** V. Baullúa.
- BAYGUA.** [Bachiller.] V. Baigua.
- BAYITO.** s. m. El *Hænianthus Salicifolius*, Gris. Esta especie se incluye modernamente en el género *Linociera*, y es una *Oleacea* indígena.
- BAYONETA.** s. f. La *Yucca gloriosa*, Lin. [V. Espino.]
- BAYÚA.** s. f. *Rutacea* indígena, el *Xanthoxylon emarginatum*, Sw. Muchos dicen Bayuda. Uno y otro término no deben confundirse con Baullúa [V]. [V. Ayabadía.]
- BAYUDA.** V. Bayúa.
- BAYUJÁN.** [Pichardo.] ?
- BAYUYO.** s. m. El *Piper confusum*, Cand., *Piperacea* indígena. Esta planta, como tantas otras, se dice Platanillo de Cuba [V].
- BEGONIA.** s. f. Nombre de uno de los tres géneros de la familia *Begoniaceas* ó *Begoniacas*. Ha pasado al dominio vulgar, especialmente entre los floricultores, y designa un gran número de plantas indígenas ó cultivadas. Entre las primeras se cuentan: la *Begonia acuminata*, Dry., la *Begonia Cubincola*, Cand., la *Begonia Wrightiana*, Cand., la *Begonia Lindeniana*, Cand., la *Begonia rotundifolia*, Lam<sup>k</sup>, la *Begonia Tovarensis*, Klotz., y la *Begonia scandens*, Sw. Entre las especies cultivadas pueden citarse: la *Begonia Fuchsioides*, Hook., la *Begonia Nelumbifolia*, Cham. & Schlecht., la *Begonia Heracleifolia*, Cham. & Schlecht., y la *Begonia argentea*, Linden.

- BEJUCO AGRIJO. ?
- BEJUCO ALCANFOR. La *Peperomia subrotundifolia*, C. Cand., Piperacea silvestre.
- BEJUCO AMARGO. La *Aristolochia trilobata*, Lin., Aristolochiaceae.
- BEJUCO ANGARILLA. [Pichardo.] ?
- BEJUCO CANASTA. V. Guaniquí.
- BEJUCO CARACOL. [Pichardo.] ?
- BEJUCO CAREY. V. Bejuco guará.
- BEJUCO COLORADO. V. Bejuco guará. [*Serjania lucida*, Schum.,] [Pichardo.] ? [P. R.] La *Rudolphia volubilis*, Willd., Leguminosa silvestre, no cubana.
- BEJUCO CUADRANTE. [Pichardo.] ?
- BEJUCO DE AGUA. [P. R.] V. Parra cimarrona. [*Vitis Caribaea*, Cand.,]
- BEJUCO DE BASTONES. [Morales.] V. Mantequilla.
- BEJUCO DE BERRACO. V. Cainca.
- BEJUCO DE CANASTA. V. Guaniquí.
- BEJUCO DE CANASTO. V. Guaniquí.
- BEJUCO DE CONCHITAS. [Cuba y P. R.] Leguminosa cultivada, la *Clitoria Ternatea*, Lin., ó Conchita azul.
- BEJUCO DE CORRALES. La *Serjania paniculata*, Kth, y la *Serjania Lupulina*, Schum., Sapindaceas silvestres. [P. R.] La *Serjania triternata*, Willd., especie no cubana.
- BEJUCO DE COSTILLA. [P. R.] El Azucarito de Cuba [V.].
- BEJUCO DE CRUZ. La *Hippocratea ovata*, Lamk, Celastraceae indígena, dicha Bejuco prieto [V.] en P. R.
- BEJUCO DE CUBA. La *Gouania tomentosa*, Jacq., Rhamnaceae silvestre.
- BEJUCO DE FIDEO. *Cuscuta Americana* Lin., Convolvulacea.
- BEJUCO DE HOJAS DE CAREY. [Cblmeiro.] Es el Bejuco guará ó Bejuco carey. [*Tetracera volubilis*, Lin., *Tetracera Poeppigiana*, Schlecht.,]
- BEJUCO DE INDIO, CRIOLLO, MORADO. La *Ipomæa heptaphylla*, Gris., Convolvulacea indígena.
- BEJUCO DE MANGLE. *Echites torosa*, Jacq., Apocynaceae silvestre.
- BEJUCO DE MIEL. [P. R.] La *Salmea scandens*, Cand. [*Salmea grandiceps*, Cass.,] Compuesta silvestre, á igual que en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- BEJUCO DE MONA. [P. R.] *Menispermea silvestre*, el *Cissampelos Pareira*, Lin.,  $\beta$ , Lin., [*Cissampelos microcarpa*, Cand.,] Esta variedad falta en Cuba. [V. Pareira brava.]
- BEJUCO DE PARALEJO. [P. R.] El *Stigmaphyllon floribunda*, Cand., Malpighiaceae silvestre, no cubana. El *Triopteris rigida*, Sw., Malpighiaceae dicha en Cuba San Pedro de flor azul. El *Tetrapteris inæqualis*, Cav., y el *Tetrapteris paniculata*, Bello, Malpighiaceas no cubanas. [V. Bejuco San Pedro y Bejuco San Pedro, de flor amarilla.]
- BEJUCO DE PARALEJO, ROSADO. [P. R.] Malpighiaceae silvestre, no cubana, el *Heteropteris purpurea*, Kth. También es de P. R. la especie *H. Laurifolia*, Juss., ó Vergajo de toro en Cuba, sin nombre vulgar en aquella isla.
- BEJUCO DE PERDÍZ. El *Pithecoctenium hexagonum*, Cand., ó Bejuco peludo, Mariposa [V.] y Papelera.
- BEJUCO DE PURGACIÓN. Nyctaginea indígena, la *Boerhaavia scandens*, Lin.
- BEJUCO DE SAN PEDRO. V. Bejuco San Pedro.
- BEJUCO DE SOPLA. [P. R.] V. Flor de la cruz. [*Securidaca virgata*, Sw.,]
- BEJUCO DE LA VIRGEN. La *Cassia chrysotricha*, Coll., Leguminosa.
- BEJUCO GUARÁ. La *Tetracera volubilis*, Lin., [*Tetracera Poeppigiana*, Schlecht.,] ó Bejuco Carey, Beju-



- co hoja de carey y Carey bejuco; y la Davilla rugosa, Poir., ó Bejuco colorado [V.] y Bejuco guaraná. Ambas son Dilleniaceas indígenas. También se llama Bejuco guará al *Geophila reniformis*, Don, Rubiaceae silvestre, incluida modernamente en el vasto género *Uragoga*.
- BEJUCO GUARANÁ. [Morales.] V. Bejuco guará. [Davilla rugosa, Poir.]
- BEJUCO INGLÉS. [P. R.] Es la *P.....* de perro en Cuba. [*Capparis Cynophallophora*, Lin.]
- BEJUCO JABONCILLO. V. Bejuco leñatero.
- BEJUCO JAIREL. V. Jairel.
- BEJUCO LECHOSO. *Fischeria Havanensis*, Decsne, *Asclepiadea* indígena, dicha también *Curamagüey* de costa. [Pichardo.] ?
- BEJUCO LEÑATERO. *Rhamnea silvestre*, la *Gouania Domingensis*, Lin., ó Bejuco jaboncillo, Jaboncillo bejuco y Leñatero bejuco.
- BEJUCO LOMBRICES. V. Lombricero.
- BEJUCO LONGANIZA. [Pichardo.] ?
- BEJUCO MARRULLERO. Pichardo confunde bajo este nombre dos plantas muy distintas: la *Vigna vexillata*, Rich., ó Marrullero [V.], y la *Clematis dioica*, Lin., ó Cabello de ángel [V.]. La última identificación ha sido establecida por Morales.
- BEJUCO PELADO. [Pichardo.] ?
- BEJUCO PELUDO. V. Bejuco de perdíz.
- BEJUCO PERDÍZ, ROSADO. Con este nombre, y el de Uña de gato, se conoce una *Bignoniaceae* indígena, la *Bignonia unguis*, Lin.
- BEJUCO PERDIZERO. [Pichardo.] Nombre erróneo. V. Bejuco de perdíz.
- BEJUCO PRIETO. La *Forsteronia corymbosa*, Mey., y la *Forsteronia Alexandri*, Gris, dichos también *Curamagüey prieto*. [Pichardo.] ? [P. R.] V. Bejuco de cruz.
- BEJUCO SABANERO. [Pichardo.] ?
- BEJUCO SAN PEDRO. El *Stigmaphyllon Periplocifolium*, Juss.; el *Stigmaphyllum Sagreanum*, Juss.; y el *Stigmaphyllum lineare*, Wr.
- BEJUCO SAN PEDRO, DE FLOR AMARRILLA. El *Stigmaphyllum Faus-tinum*, Sauval, y el *Stigmaphyllum rhombifolium*, Sauval, [*S. puberum*, Juss. ?], *Malpighiaceas* silvestres. La última especie se llama Bejuco de paralejo [V.] en P. R.
- BEJUCO SERNÁ. [Pichardo.] ? ó Pén-dola [V.]
- BEJUCO TORTUGA. La *Bahuinia heterophylla*, Kth, *Leguminosa* indígena, y la *Schnella excisa*, Gris, cultivada.
- BEJUCO UBÍ. El *Vitis trifoliata*, Moral, variedad *rhombifolia*, *Vitea* indígena, ó mejor *Cissus rhombifolia*, Vahl.
- BEJUCO UBÍ, MACHO. Dos *Viteas* indígenas tienen este nombre: el *Vitis trifoliata*, Moral, variedad alata, y el *Parthenocissus quinquefolia*, Planchon. Esta última se dice, además, Parrita cimarrona.
- BEJUCO VERGAJO. [Pichardo.] V. Vergajo de toro.
- BEJUCO VERGAJO DE TORO. [Pichardo.] V. Vergajo de toro.
- BEJUCO VERRACO. V. Cainca.
- BELAM-CANDA. s. f. Nombre indio— apenas empleado en algunos jardines—de una *Iridea* cultivada, la *Belamecanda Chinensis*, Rheed. [*Ixia Chinensis*, Lin. *Pardanthus Chinensis*, H. Kew.]
- BELENCANDA. Adulteración de *Belam-canda*.
- BELESA. [Pichardo.] Es el *Embeleso*, *Embeleso*, *Azulejo* y *Velesa* de otros autores. [V. esos nombres.]
- BELLA-DAMA. [Coloma.] V. *Belladonna* de otoño.
- BELLA DE NOCHE. V. *Don Diego* de noche. [*Allionia incarnata* Lin.]
- BELLADONA DE OTOÑO. El *Amaryllis Belladonna*, Lin. [*Coburgia Be-*

- lladona, Herb., ó Bella-dama, Amarylloidea cultivada.
- BELLADONA DE LA TIERRA.** V. Palo de gallina.
- BELLORITA.** s. f. [P. R.] Compuesta silvestre, el Erigeron Bellioides, Cand. Existe en Cuba [la misma especie?], careciendo de nombre vulgar.
- BELLOTILLA.** [Fernández.] ?
- BEMBÚ.** [Bachiller.] V. Benubú.
- BEN.** s. m. Nombre vulgar del Moringa pterygosperma, Gaertn. Esta planta es una de las tres especies que constituyen la familia de las Moringeas. Se consideró antes como una Leguminosa y en la actualidad algunos autores la refieren á las Capparideas. Recibe, además del de Ben, los nombres de Palo jeringa, Palo geringa, Palo blanco [V.] y Paraiso francés, y en Méjico el de Coatli. Es indígena de Ceylán y silvestre en Cuba. [V. Aceite de Ben.]
- BENUBÚ.** s. m. V. Yerva brava.
- BERA.** Ortografía viciosa de Vera [V.].
- BERA - CERA.** [Pichardo.] Nombre etíoneo. V. Vera-cera.
- BERENGENA.** s. f. Solanea cultivada, el Solanum esculentum, Dun. [Solanum Melongena, Lin.] La hay blanca y morada.
- BERGAMOTA.** s. f. Rutacea cultivada, el Citrus Limetta Bergamia, Risso. Recibe igual nombre vulgar en P. R.
- BERMUDA.** [Pichardo.] V. Yerba de la Bermuda.
- BERRO.** s. m. [Cuba y P. R.] Crucifera silvestre, el Nasturtium officinalis, Cand.
- BERRO DE COSTA.** El Cakile æqualis, L. Hérit., Crucifera.
- BETÓNICA.** s. f. La Betonica officinalis, Lin.
- BIBONA.** [Fernández.] V. Víbona. [Dendropanax arboreum, Decsne & Planch.]
- BIENGRANADA.** s. f. El Chenopodium Botrys, Lin., Chenopodiaceae cultivada. [V. Apasote.]
- BIGUETA DE NARANJO.** [Fernández.] V. Vigueta de naranja. [Tapura Cubensis, Gris.]
- BIGUETA DEL PERÚ.** [Fernández.] Es el Bálsamo del Perú. [V. Vigueta del Perú.]
- BIGUETA HEMBRA.** [Fernández.] ? [V. Vigueta hembra.]
- BIHAOS.** [Oviedo.] V. Plátano silvestre.
- BIJA.** s. f. Bixacea cultivada, la Bixa Orellana, Lin. También se nombra Achote, Achiote, Achioto y Anoto.
- BIJAGUA.** [Fernández.] ? [V. Bijaguara.]
- BIJÁGUARA.** s. f. La Colubrina Cubensis, Brongn., y la Colubrina ferruginea, Brongn. Esta última se llama Fuego [V.] en Guantánamo y Abelluelo ó Quitarán en P. R. Según Fernández, la Colubrina reclinata, Brongn., es también Bijaguara, pero, al decir de Sauvalle, es un Jayajabico [V.]. Tal vez sea sinónimo del término Bijaguara el de Bijagua citado por Fernández.
- BIJÁURA.** s. f. Solanea indígena, la Datura suaveolens, Kth, ó Campanilla blanca [V.], Arbol de la bi-bijagua y Campana.
- BIRIJÍ.** s. m. Tres Myrtaceas indígenas llevan tal nombre: la Eugenia Poirerii, Cand., dicha Birijí y Hoja menuda en P. R.; la Eugenia cyphophlæa, Gris; y la Eugenia Ligustrina, Willd.
- BIRIJÍ DE HOJAS MENUDAS.** La Eugenia rigidifolia, Rich., ó Tomillo de costa.
- BLEDO.** s. m. Dos Chenopodiaceas reciben este nombre: el Amaranthus viridis, Lin. [Euxolus viridis. Moq.], indígena; y el Amaranthus oleraceus, Wst. ? [Euxolus caudatus, Moq. Chenopodium caudatus, Jacq.], cultivado.

- BLEDO CARBONERO.** Nombre vulgar de cuatro Phytolacceas silvestres: la *Phytolacca decandra*, Lin., ó Yerba carmín; la *Phytolacca icosandra*, Lin.; la *Phytolacca octandra*, Lin.; y el *Stegnosperma Halimifolia*, Benth. [*Stegnosperma Cubensis*, Rich.]
- BLEDO DE CLAVO.** *Amarantus Polygonoïdes*, Lin.
- BLEDO ESPINOSO.** El *Amarantus spinosus*, Lin., *Chenopodiacea* indígena. Parece falso que los indígenas de Cuba lo llaman Calalú [V.]
- BLEDO FRANCÉS.** El *Amarantus paniculatus*, Moq., variedad. [*Amarantus paniculatus*, Lin.]
- BLEDO MORISCO.** [Pichardo.] ?
- BOCA DE DRAGÓN.** El *Antirrhinum majus*, Lin., *Scrophularinea* cultivada. En algunos jardines le dicen Monigote.
- BOCA DE LEÓN.** Tres *Gesneraceas* indígenas reciben tal nombre, son: la *Heppiella rupicola*, Wr.; el *Rytidophyllum crenulatum*, Cand.; y el *Rytidophyllum Wrightii*, Gris.
- BOCA DE LEÓN, DE PAREDÓN.** *Rytidophyllum tomentosum*, Mart., ó *Salvilla*.
- BOCA DE LEÓN, DE PAREDÓN, DE FLOR ROSADA.** *Rytidophyllum petiolare*, Cand., *Gesneracea* silvestre.
- BOCA DE LOBO.** V. *Pepú*.
- BOJ DE PERSIA.** V. *Murraya*.
- BOJA.** s. f. La *Entada scandens*, Benth.
- BOJE.** s. m. El *Maytenus Buxifolius*, Gris., ó mejor *Celastrus Richardi*, G.-M. En P. R. la Quina [V.]
- BOLA DE NIEVE.** El *Viburnum opulus*, Lin., variedad *sterilis*, Cand. También se llama Mundillo y Rosa de Gueldres. Es una *Caprifoliacea* de jardines.
- BOMBÓ.** s. m. V. *Qimbombó*.
- BOMBONAXA.** s. f. Nombre peruano de una *Cyclanthacea* introducida en Cuba, la *Carludovica palmata*, R. & Pav. Se dice también *Hiracca*, fabricándose con sus hojas los sombreros de Panamá ó de Jipijapa [V.]
- BOMINISÍ.** [Fernández.] ?
- BOMITEL AMARILLO.** [Fernández.] También se dice Bomitel sebestena. [Fernández.] Es nombre erróneo de la *Cordia scabrifolia*, Cand., mejor llamada *Vomitel amarillo*.
- BOMITEL BLANCO.** [Fernández.] V. *Carey*.
- BOMITEL ENCARNADO.** [Fernández.] Nombre erróneo del *Vomitel encarnado* ó *Vomitel colorado* [V.] [*Cordia Sebestena*, Lin., *Cordia speciosa*, Willd.]
- BOMITEL SEBESTENA.** [Fernández.] V. *Bomitel amarillo*.
- BONASÍ.** V. *Ponásí*.
- BONIAMA.** s. f. [Bachiller.] Nombre taino de la Piña morada. [*Ananas Cubense*, G.-M.]
- BONIATA.** s. f. Nombre taino de la Yuca dulce.
- BONIATILLO.** s. m. El *Persea triplinervis*, G.-M. [*Phœbe triplinervis*, Gris. *Phœbe Antillana*,  $\alpha$ , genuina, Meissner.] También se dice *Boniato blanco* [V.] Ambos nombres se aplican además á las dos variedades siguientes de la misma especie: *Persea triplinervis*, G.-M.,  $\beta$ , *Wrightii*, G.-M. [*Phœbe Cubensis*, Nees. *Phœbe Antillana*,  $\gamma$ , *Cubensis*, Meissner.]; y *Persea triplinervis*, G.-M.,  $\gamma$ , *Valenzuelana*, G.-M. [*Phœbe Valenzuelana*, Rich. *Oreodaphne* ? *alba*, Rich.] [V. *Boniato amarillo*.]
- BONIATO.** s. m. La *Ipomœa Batatas*, Lamk. [*Batatas edulis*, Choisy. *Convolvulus Batatas*, Lin.,]. *Convolvulacea* india, muy cultivada en Cuba. La especie tiene un tipo y algunas variedades, siendo aquel el *Boniato Antonio Díaz*.



- Las variedades son: porphyrrhiza, Boniato camareto; leucorrhiza, Boniato cubano, Boniato malojito, Boniato Cienfuegos y Boniato tumba-saco; violacea, Boniato morado, Boniato brujo y Boniato de cuarenta días; xanthorrhiza, Boniato amarillo [V.] y Boniato yema de huevo. [V. Age, Aniguamar, Atibiuneix, Guacaraica, Guaganax, Guananax, Guaraca, Guacabacoca, Guaragüey, Hobos, Sasabeios, Squibetes y Tuna.]
- BONIATO AGUACATILLO.** V. Aguacatillo.
- BONIATO AMARILLO.** Laurinea indígena, la *Nectandra exaltata*, Gris. [*Nectandra Boniato*, Rich.] Se le dice también Boniatillo [V.] y Boniato de costa. [Fernández.]? [V. Boniato.]
- BONIATO BATATA.** [Pichardo.]?
- BONIATO BLANCO.** Laurinea indígena, el *Persea Cubensis*, Meissner. [V. Boniatillo.]
- BONIATO BRUJO.** V. Boniato.
- BONIATO CACHAZUDO.** [Pichardo.]?
- BONIATO CAMARETO.** V. Boniato.
- BONIATO CIENFUEGOS.** V. Boniato.
- BONIATO CIGUA.** [Fernández.] V. Cigua.
- BONIATO CUBANO.** V. Boniato.
- BONIATO DE COSTA.** V. Boniato amarillo.
- BONIATO DE CUARENTA DIAS.** V. Boniato.
- BONIATO DE PLAYA.** Cuatro *Convolvulaceas* indígenas llevan este nombre, son: la *Ipomæa Pes-Capræ*, Sw.; la *Ipomæa Nymphæifolia*, Gris.; la *Ipomæa imperati*, Gris.; la *Ipomæa Acetosæfolia*, Rœm. & Schult.
- BONIATO DEL PINAR.** *Persea montana*, Spreng. [*Phcebe montana*, Gris.], Laurinea indígena.
- BONIATO LAUREL.** El *Ocotea floribunda*, G.-M. [*Strychnodaphne floribunda*, Gris.], Laurinea silvestre. [Fernández.] V. Leviza.
- BONIATO MALOJITO.** V. Boniato.
- BONIATO MORADO.** V. Boniato.
- BONIATO TUMBA-SACO.** V. Boniato.
- BONIATO YEMA DE HUEVO.** V. Boniato.
- BORRAJA** s. f. El *Borago officinalis*, Lin., Boraginea cultivada.
- BOTIJA.** s. f. El *Cochlospermum Hibiscoides*, Kth, Bixacea indígena.
- BOTÓN BLANCO.** [P. R.] Rubiacea silvestre, el *Spermacoce verticillata*, Lin., variedad Americana, Lin. [*Borreria verticillata*, Mey.] No la hay en Cuba.
- BOTÓN BLANCO DE ARENALES.** [P. R.] Rubiacea silvestre, el *Spermacoce podocephala*, Sauval. [*Borreria podocephala*, Cand.] Existe en Cuba [la misma especie?], careciendo de nombre vulgar.
- BOTÓN DE ORO.** Dáse este nombre á las tres plantas siguientes: el *Abutilon Indicum*, Don, Malvacea silvestre, dicha también Botoncillo de oro y, en P. R., Buenas tardes; el *Ranunculus Cubensis*, Gris., *Ranunculacea* endémica, igualmente llamada Botoncillo de oro; y el *Spilanthes beccabunga*, Cand., Compuesta.
- BOTÓN DE PLATA.** La *Wulffia deltoidea*, G.-M. [*Melanthera deltoidea*, Rich.], Compuesta silvestre, lo mismo que en P. R., donde se llama Cariaquito blanco.
- BOTONCILLO** s. m. *Verbesina alata*, Lin., Compuesta silvestre, dicha Capitaneja en P. R., En esta última isla se llama Botoncillo á una Rubiacea silvestre, el *Spermacoce parviflora*, Sauval, [*Borreria parviflora*, Mey.], esp. común á Cuba, donde no tiene nombre vulgar.
- BOTONCILLO DE ORO.** V. Botón de oro.
- BOUGAINVILLEA** s. f. Este nombre científico, derivado de Bougainville—célebre navegante francés—

- ha pasado al dominio vulgar, sobre todo entre los jardineros, y designa dos Nyctagineas cultivadas: la *Bougainvillea spectabilis*, Willd., y la *Bougainvillea fastuosa*, Herincq.
- BOX DE PERSIA.** [Fernández.] V. *Murraya*.
- BOX INDÍGENO.** [Fernández.] Nombre erróneo del *Macrocnemum Jamaicense*, Lin., Rubiaceae.
- BRANCA URSINA.** V. *Acanto*.
- BRASIL.** s. m. [Fernández.] La *Guacamaya* de costa. [V. *Paño de Campeche*.]
- BRASIL DE SOGA.** V. *Palma Attalea funifera*.
- BRASILETE.** s. m. La *Cæsalpinia pectinata*, Cav.
- BRASILETE BASTARDO.** V. *Brasilete falso*.
- BRASILETE COLORADO.** *Cæsalpinia crista*, Lip., Leguminosa.
- BRASILETE DE CABAÑA.** [Fernández.]?
- BRASILETE FALSO.** El *Tariri Antidesma*, H. B<sup>n</sup> [*Picramnia Antidesma*, Sw.], ó *Brasilete bastardo*, *Simarubea* indígena.
- BRASILETE HÓRRIDO.** [Fernández.] La *Cæsalpinia horrida*, Rich., Leguminosa.
- BRETAÑA.** s. f. V. *Jacinto*.
- BRETÓNICA.** s. f. [P. R.] *Compuesta* silvestre, la *Gerbera* (*Chaptalia*) *nutans*, G. M. [Leria *nutans*, Cand.] También es silvestre en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- BRETÓNICA AFELPADA.** [P. R.] La *Melochia tomentosa*, Lin., Malvacea silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- BRETÓNICA ASERRADA.** [P. R.] V. *Bretónica peluda*.
- BRETÓNICA PELUDA.** [P. R.] La *Melochia hirsuta*, Cav. [*Melochia serrata*, Vent.], Malvacea silvestre en ambas islas, pero sin nombre vulgar en Cuba. Es la *Bretónica aserrada* de P. R.
- BRETÓNICA PIRAMIDAL.** [P. R.] V. *Malva común*. [*Melochia pyramidata*, Lin.]
- BRETÓNICA PRIETA.** [P. R.] V. *Malva colorada*. [*Melochia nodiflora*, Sw.]
- BRIGUETA.** s. f. [P. R.] El *Ilex repanda*, Gris. [*Ilex dioica*, Gris.], *Ilicinea* silvestre en ambas islas, careciendo de nombre vulgar en Cuba. En P. R. se llama *Cuero de sapo* [V.].
- BRIGUETA NARANJO.** [P. R.] El *Ilex Macoucoua*, Pers., *Ilicinea* silvestre, no cubana.
- BRÓCOLI.** s. m. *Brassica oleracea*, Lin., variedad *Botrytis*, sub-variedad *Asparagoides*. Es una *Crucifera* cultivada.
- BRUJA.** s. f. El *Amaryllis Lindleyana*, Herb., *Amaryllideae* indígena. [P. R.] V. *Prodigiosa*.
- BRUJITA.** s. f. *Planta* silvestre, el *Amaryllis rosea*, Spreng.
- BRUSCA.** s. f. [Pichardo.] V. *Yerba hedionda*. [*Cassia Occidentalis*, Lin.]
- BÚCAGO.** s. m. [P. R.] V. *Búcare*.
- BÚCARE.** s. m. La *Erythrina glauca*, Willd., Leguminosa indígena. Es el *Búcago* de P. R. [P. R.] La *Erythrina umbrosa*, Kth, especie cultivada; no la hay en Cuba?
- BÚCARE COMÚN.** [Fernández.]?
- BÚCARE ESPINOSO.** [Fernández.] V. *Piñón de costa*.
- BUENAS TARDES.** [P. R.] V. *Botón de oro*. [*Abutilon Indicum*, Don.] [Pichardo.]?, ó *Doce del día*.
- BUENOS DÍAS.** [P. R.] V. *Hibisco del pinar*. [*Hibiscus bifurcatus*, Cav.]
- BÚFANO.** s. m. *Fraxinus viridis*, Michx., variedad *Berlanderiana*, A. Gray. Es una *Oleacea* silvestre.
- BUNIATO.** Corrupeión de *Boniato* [V.].
- BUTOS.** [Bachiller.] Este término, en lenguaje taíno, significaba *Arbol*.

## C

- CABAÍOS.** [Pedro Martir de Anglería.] ?
- CABALONGA.** s. f. Apocynaea indígena, la *Thevetia Nerifolia*, Juss., ó *Cobalonga*.
- CABELLO DE ÁNGEL.** Dos Ranunculaceas indígenas llevan este nombre, son el *Clematis dioica*, Lin. [*Clematis Havanensis*, Rich.,] dicha lo mismo en P. R.; y el *Clematis sericea*, Kth.
- CABEZA DE NEGRO.** Nombre peruano del fruto de la *Tagua* ó *Palma marfil* [V.]. La semilla suministra el *Marfil vegetal*.
- CABEZA DE TORO.** ?
- CABEZA DE VIEJO.** *Cactea* cultivada, el *Cereus senilis*, Salm-Dyck.
- CABIMA.** s. f. V. *Manajú*.
- CABO DE AGUA, CIMARRONA.** [Fernández.] ?
- CABO DE HACHA.** *Meliacea* indígena, la *Trichilia Spondioides*, Sw. [*Cupania trachycarpa*, Gris.,] ó *Jubabán*. En P. R. dos especies no cubanas, la *Trichilia hirta*, Lin., y la *Trichilia simplicifolia*, Spreng. [*Pholacilia diversifolia*, Gris.]
- CACALOTE.** s. m. V. *Dibidibi*.
- CACAO.** s. m. [Cuba y P. R.] *Malvacea* cultivada, el *Theobroma Cacao*, Lin.
- CACHIBÉ.** s. m. V. *Almácigo colorado*.
- CACHIMBO.** s. m. [P. R.] V. *Taburete* de flor marañuela. [*Uragoga crocea*, G.-M.]
- CACHIMBO VERDE.** [P. R.] *Rubiacea* silvestre, extraña á la Flora cubana. Es *Uragoga species*. [*Palicourea umbellata*, Cand. ?]
- CADILLO.** s. m. [P. R.] *Malvacea* silvestre en ambas islas, carece de nombre vulgar en Cuba y es la *Urena lobata*, Lin.
- CADILLO ALTEA.** [P. R.] El *Triumfetta Althaeoides*, Lamk, *Malvacea* silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar; y el *Triumfetta semitriloba*, Lin., ó *Guizazo* [V.] en Cuba.
- CADILLO ANARANJADO.** [P. R.] La *Pavonia coccinea*, Cav., *Malvacea* silvestre. No la hay en Cuba.
- CADILLO DE CIÉNAGA.** [P. R.] V. *Majaguilla*.
- CADILLO ESPINOSO.** [P. R.] V. *Majaguilla* de costa, espinosa.
- CADILLO PATA DE PERRO.** [P. R.] V. *Escoba*.
- CADILLO PEQUEQUE.** [P. R.] V. *Tábano*.
- CAFÉ.** s. m. [Cuba y P. R.] *Rubiacea* cultivada, la *Coffea Arabica*, Lin. Más propiamente debe llamarse *Cafeto* la planta y *Café* el infuso acuoso de sus semillas.
- CAFÉ CARACOLILLO.** Variedad del *Café*.
- CAFÉ CIMARRÓN.** *Rubiacea* silvestre, la *Coussarea odoratissima*, G.-M. [*Faramea odoratissima*, Cand.] También se llama *Cafetillo* [V.], *Jújano*, *Nabaco* [V.] y, en Cuba y P. R., *Palo de toro*.
- CAFÉ DE LIBERIA.** [P. R.] Variedad del *Café*.
- CAFÉ DE LA INDIA.** [P. R.] V. *Murraya*.
- CAFÉ GARRAPATA.** Variedad del *Café*.
- CAFETILLO.** s. m. [P. R.] *Samydea* silvestre, la *Guidonia nitida*, G.-M. [*Casearia nitida*, Jacq.] No existe en Cuba. [V. *Café cimarrón*.]
- CAFETO.** s. m. V. *Café*.
- CAGIGALA.** s. f. V. *Damasquina*.
- CAGUAIRÁN.** s. m. Otro nombre de la *Quiebra hacha* [V.].
- CAGUAJOSA.** [Bachiller.] ?
- CAGUANÍ.** s. m. V. *Ébano amarillo*.
- CAGUASO.** V. *Caguazo*.
- CAGUATE.** [Bachiller.] Es el *Caguazo*, *Cyperacea*, no *Gramínea*.
- CAGUATO.** ?
- CAGUAZO.** s. m. *Cyperacea* silvestre, el *Carex scabrella*, Wahl.



- CAGUIRÁN.** [Fernández.] V. Caguairán.
- CAIME.** [Bachiller.] ?
- CAIMITILLO.** s. m. Dáse este nombre á dos Sapoteas indígenas, el *Chrysophyllum monopyrenum*, Sw. [*Chrysophyllum Olivæforme* & *microphyllum*, Auctor.]; y el *Chrysophyllum glabrum*, Jacq.
- CAIMITO.** s. m. Sapotea indígena, el *Chrysophyllum Cainito*, Lin. [V. *Caimito morado*.]
- CAIMITO BLANCO.** El *Chrysophyllum argenteum*, Jacq. ?
- CAIMITO DE CARTAGENA.** ?
- CAIMITO MORADO.** El *Chrysophyllum Cainito*, Lin., variedad 7, *cæruleum*. [*Chrysophyllum cæruleum*, Jacq.] [V. *Caimito*.]
- CAIMITO PINTORESCO.** [Fernández.] ?
- CAIMONÍ.** ?
- CAINCA.** s. f. La *Chiococca racemosa*, Jacq., dicha Bejuco de berraco en Cuba y en P. R., y la *Chiococca nitida*, Benth., ó Bejuco de berraco y Bejuco verraco en Cuba. Son Rubiaceas silvestres.
- CAIREL.** Es el Jairol [V.].
- CAISIMÓN.** s. m. Nombre de las siguientes Piperaceas indígenas: el *Piper peltatum*, Lin. [Potomorphe peltata, Miq.], y el *Piper umbellatum*, Lin. [Potomorphe umbellata, Miq.]
- CAISINILLA.** ?
- CAJA COMÚN.** [Fernández.] V. Palo de caja.
- CAJA YANILLA.** [Fernández.] V. Palo de caja.
- CAJIGAL.** V. Damasquina.
- CAJUELA.** s. f. Euphorbiacea indígena, la *Antidesma Rosauriana*, G.-M. [*Hieronyma Clusioides*, Gris, non J. Müll., *Hieronyma Cubana*, J. Müll., *Hieronyma pallida*, J. Müll.]
- CAJUIL.** [Pichardo.] Es el Pajuil [V.].
- CALABACÍN.** ?
- CALABAZA.** s. f. [P. R.] Cucurbitácea cultivada, la Cucurbita Pepo, Lin., dicha en Cuba Calabaza común [V.].
- CALABAZA AMARILLA.** Cucurbita maxima, Duch., variedad potiro, Pers.
- CALABAZA BONETERA.** Cucurbita Melopepo, Lin.
- CALABAZA COMÚN.** Es la Calabaza [V.] en P. R., dicha Auyama [V.] en Santo Domingo. Se cultiva en Cuba.
- CALABAZA DE BONETE.** V. Calabaza bonetera.
- CALABAZA DE CABALLO.** [Pichardo.] V. Calabaza de puercos.
- CALABAZA DE CASTILLA.** [Pichardo.] ?
- CALABAZA DE CULEBRA.** [Pichardo.] ?
- CALABAZA DE PUERCO.** [Pichardo.] ? ó Calabaza de caballo.
- CALABAZA YEMA DE HUEVO.** [Pichardo.] ?
- CALAGUALA.** s. f. Filicinea indígena, de la familia Polypodiaceas. Es el *Polypodium crassifolium*, Lin.
- CALAGUALA DE LA TIERRA.** [Pichardo.] V. Calaguala del país.
- CALAGUALA DEL PAÍS.** Polypodiaceas silvestre, el *Aspidium Capense*, Willd.
- CALALÉ.** s. m. Término indígena que designa cierta comida, siendo tal vez otro nombre del Bledo espinoso [V.].
- CALAMBREÑA.** s. f. V. Uvero blanco.
- CALAMÍAS.** La *Averrhoa Bilimbi*, Lin., Geraniaceas cultivada, dicha también Camías.
- CAMACEY ALMENDRO.** [P. R.] Melastomaceas silvestre: el *Meeranium Amygdalinum*, Sauval. [*Cremanium Amygdalinum*, Gris.] En Cuba carece de nombre vulgar.
- CAMACEY BLANCO.** [P. R.] La *Miconia Fothergilla*, Naud. [*Diplochita Fothergilla*, Cand.], Melastomaceas silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar.

- CAMACEY COLORADO.** [P. R.] *Miconia impetiolaris*, Don. Carece de nombre vulgar en Cuba.
- CAMACEY DE PALOMA.** [P. R.] V. Cordobancillo de arroyo.
- CAMACEY NEGLIGENTE.** [P. R.] *Clidemia hirta*, Don, *Melastomacea* no cubana.
- CAMACEY PELUDO.** [P. R.] V. Cordobán peludo.
- CAMACEY RAMOSO.** [P. R.] *Miconia racemosa*, Cand., *Melastomacea* extraña á la Flora de Cuba.
- CAMACEY TOMASA.** [P. R.] *La Miconia Thomasiana*, Cand., especie no cubana.
- CAMAGUA.** s. f. V. Guacamari. [*Wallenia Clusiæfolia*, Gris.]
- CAMAGÜIRA.** ?
- CAMALARA.** [Fernández.] ?
- CAMALOTE.** s. m. *Polygonacea* indígena, el *Polygonum glabrum*, Willd., ó *Camelote*.
- CAMARETO.** s. m. V. Boniato.
- CAMARÓN.** [Fernández.] ?
- CAMARUCA.** s. f. Nombre guayanés de una *Malvacea* cultivada, la *Stereulia Carthagenensis*, Cav. [*Helicteres apetala*, Jacq.]
- CAMBRÓN.** s. m. [P. R.] Jía brava en Cuba. [*Guidonia ramiflora*, G.-M.]
- CAMBUSTERA CIMARRONA.** La *Manettia coccinea*, Willd., *Rubiacea* silvestre.
- CAMBUSTERA DE HOJA ANCHA: PUNZÓ.** *Convolvulacea* indígena, la *Ipomæa coccinea*, Lin.
- CAMBUSTERA DE HOJAS MENUDAS.** La *Ipomæa Quamoclit*, Lin., *Convolvulacea* silvestre.
- CAMBUSTERA DEL PAÍS.** *Rubiacea* silvestre, la *Manettia Lygistoides*, Gris.
- CAMBUTE.** Algunos dan este nombre al *Milium lanatum*, Kth [*Paspalum*, Roem. & Schult.], *Graminea* silvestre. [V. *Cambutera*.]
- CAMBUTERA.** [Pichardo.] También *Cambute* [V.] y *Gambutera*. Es *Cambustera*, nombre que se antepone á cuatro específicos.
- CAMELIA.** s. f. En Santiago de Cuba, la *Amapola* [V.]
- CAMELOTE.** s. m. V. *Camalote*.
- CAMIÁS.** V. *Calamías*.
- CAMPANILLA.** s. f. V. *Aguinaldo blanco*.
- CAMPANILLA BLANCA.** V. *Aguinaldo blanco* y *Bijaura*.
- CAMPANILLITOS.** V. *Gloriosa del país*.
- CAMPECHE.** s. m. Otro nombre de la *Guacamaya* de costa. [*Caesalpinia bijuga*, Sw.]
- CANA.** s. f. [Pichardo.] La *Palma cana* y el *Guano cana* de monte.
- CANARIO.** s. m. *Leguminosa* silvestre, la *Crotalaria incana*, Lin. [*Crotalaria Cubensis*, Cand. *Crotalaria hirta*, Lag.] También se llama *Maromera* [V.] y en P. R. le dicen *Cascabelillo vacío*.
- CANARIOS.** V. *Flor del canario*.
- CANCILLA.** s. f. El *Croton clavuliger*, J. Müll. [*Croton penicellatum*, Gris, non Vent.], ó *Canelillo* [V.], *Euphorbiacea* silvestre.
- CANDELILLA.** s. f. *Euphorbiacea* indígena, la *Tragia gracilis*, Gris.
- CANDELÓN.** s. m. V. *Guamá hediondo*.
- CANDUNGÓ AMARGO.** V. *Güiro cimarrón*.
- CANELA BLANCA.** V. *Malambo*.
- CANELA DE CUBA.** [Colmeiro.] *Dicypellium Caryophyllum*, Nees, *Laurinea* silvestre [?] ó cultivada [?].
- CANELERO.** s. m. El *Cinnamomum Zeylanicum*, Breyne, ó *Laurel canelero*, *Laurinea* cultivada.
- CANELILLA.** s. f. [Fernández.] Es la misma planta que llama *Copalillo*. [V. (*Thouinia nervosa*, Gris.)]
- CANELILLO.** s. m. El *Ocotea cuneata*, G.-M. [*Oreodaphne* ? *obovata*, Rich. *Nectandra cuneata*, Gris. *Nemodaphne cuneata*, Meissner.], *Laurinea* silvestre. [V. *Cancilla* y *Copalillo*.]

- CANELO SILVESTRE DE CUBA. La *Persea Indica*, Spreng., Laurinea silvestre [?] ó cultivada [?].
- CANGRE. s. m. Todas las partes aéreas de la planta Yuca.
- CANISTÉ. V. Canistel.
- CANISTEL. s. m. Sapotea indígena, la *Lucuma nervosa*. A. Cand., Muchos dicen Canisté.
- CANUTILLO. V. Cañutillo.
- CANUTILLO DE PAREDÓN. V. Cañutillo de paredón.
- CAÑA ALGARROBEÑA. V. Caña criolla.
- CAÑA AMARILLA DE JAVA. V. Caña Bellouguet blanca.
- CAÑA AMARILLA DE TAITÍ. [\*] *Saccharum officinarum*, Lin., variedad  $\delta$ , Tahitense, sub-variedad 1. Se le dice Caña americana en Andalucía, Caña solera en Nueva Granada, Caña de Cayena en el Brasil, Avae en Taití y, también, Caña blanca de Taití ó Caña color de paja de Taití. Cuba! cultivo extenso. Tiene dos variaciones: Caña de Borbón [isla de la Reunión.] y Caña de Singapoor ó Tibboo leent.
- CAÑA AMARILLA DEL NEPAL. ? Cuba?
- CAÑA AMARILLO-VIOLETA DE BATAVIA. *Saccharum violaceum*, Tuss., variedad  $\alpha$ , genuina, sub-variedad 1. Cuba?
- CAÑA AMERICANA. V. Caña amarilla de Taití.
- CAÑA BAMBÚ. V. Caña de Salangora.
- CAÑA BELLOUGUET BLANCA. ? Se le nombra, además, Caña blanca de Java, Caña amarilla de Java, Caña de Salangora blanca [nombre impropio.], Caña de Japparoh y,

en Java, Tibboo poutih. Se cultiva en Cuba!

- CAÑA BELLOUGUET ROJA. ? Nómbrase también Caña de Salangora roja [nombre impropio.] y, en Java, Tibboo menareh. Cultívase en Cuba!
- CAÑA BLANCA DE JAVA. V. Caña Bellouguet blanca.
- CAÑA BLANCA DE TAITÍ. V. Caña amarilla de Taití.
- CAÑA BRAVA. V. Bambú.
- CAÑA CAVANGERIE BLANCA. ? Cuba!
- CAÑA CAVANGERIE LISTADA. ? Cuba!
- CAÑA CAVANGERIE ROJA. ? Cuba!
- CAÑA COLOR DE PAJA DE TAITÍ. V. Caña amarilla de Taití.
- CAÑA CRIOLLA. *Saccharum officinarum*, Lin., variedad  $\alpha$ , commune. Es la Caña algarrobeña de Andalucía, Caña de la tierra, Caña doradilla, Caña de Santo Domingo. Cuba!
- CAÑA CRISTALINA. V. Caña violeta de Batavia.
- CAÑA DE ARROYO. V. Cañuela santa. [*Costus spicatus*, Sw.]
- CAÑA DE AZÚCAR. Gramínea cultivada, de la sub-familia Panicaceas, tribu Andropogoneas. Es el *Saccharum officinarum*, Lin., Nada es más difícil que la clasificación científica de las numerosas variedades, sub-variedades, variaciones y sub-variaciones, espontáneas ú obtenidas por el cultivo, que presenta esta especie. Las principales variedades y sub-variedades, que racionalmente parece posible relacionarles, son:
- |                            |   |   |                           |                               |
|----------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|
| }                          | $\alpha$ , commune. C. criolla.   |   |                           |                               |
|                            | $\beta$ , purpureum.  |   |                           |                               |
|                            | $\gamma$ , giganteum. C. elefante de la Cochinchina.  |   |                           |                               |
|                            | $\delta$ , Tahitense:   |   |                           |                               |
|                            | <table border="0"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; vertical-align: middle; padding-right: 5px;">}</td> <td>(1) C. amarilla de Taití.</td> </tr> <tr> <td>(2) C. gruesa verde de Taití.</td> </tr> <tr> <td>(3) C. de cintas de Taití.</td> </tr> </table> | } | (1) C. amarilla de Taití. | (2) C. gruesa verde de Taití. |
| }                          | (1) C. amarilla de Taití.   |   |                           |                               |
|                            | (2) C. gruesa verde de Taití.   |   |                           |                               |
|                            | (3) C. de cintas de Taití.  |   |                           |                               |
| var. ? C. roja de Bengala. |   |   |                           |                               |
| var. ? C. Nueva Caledonia. |   |   |                           |                               |
| var. ? C. de Salangora.    |   |   |                           |                               |

[\*] El nombre de esta colonia francesa—de las islas de la Sociedad, Polynesia—se escribe también Tahití, O Taití y Otahití. Las variedades de Caña de azúcar que existen en Taití—además del Tu-ute, Oara, Irimotu y Avae—son las cuatro siguientes: Rutu [originaria de la isla Ruruki.], Vaihi ó Uouo [originaria de las islas Vaihi, Sandwich.], Piavere y To-polu.



**CAÑA DE BATAVIA.** Graminea cultivada, el *Saccharum violaceum*, Tuss., *Fl. Antill.*, I, 160, t. 25. Gris., *Fl. Br. W. Ind.*, ve en esta especie solo una variedad del *Saccharum officinarum*, Lin., ó Caña de azúcar. El *Saccharum violaceum* se descompone en las variedades y sub-variedades siguientes:

- |   |   |
|---|---|
| { | α, genuina:                                     |
|   | (1) C. amarillo-violeta de Batavia.             |
|   | (2) C. violeta de Batavia.                      |
|   | β, purpureum. C. morada.                        |
|   | γ, fasciolatum. C. rayada de Batavia.           |
|   | δ, Batavense. C. de Batavia [sentido estricto]. |

**CAÑA DE BATAVIA.** En el sentido estricto es el *Saccharum violaceum*, Tuss., variedad δ, Batavense; Tibboo Betavee de los malayos. Cuba?

**CAÑA DE BENGALA.** V. Caña roja de Bengala y Caña de India.

**CAÑA DE BORBÓN.** V. Caña amarilla de Taití.

**CAÑA DE CASTILLA.** Graminea silvestre, el *Gynerium Saccharoides*, Kth.

**CAÑA DE CAYENA.** V. Caña amarilla de Taití.

**CAÑA DE CHINA.** Graminea cultivada?, el *Saccharum Sinense*, Roxb. No hay que confundirla con la Caña de Salangora [V.].

**CAÑA DE CINTAS DE TAITÍ.** *Saccharum officinarum*, Lin., variedad δ, Tahitense, sub-variedad 3. Se nombra igualmente Caña de vetas rojas de Taití y, en Taití, Oara. Cuba!

**CAÑA DE INDIA.** Palma no cubana, el *Calamus Rotang*, Lin., ó Caña de Bengala [V.]. Se emplea en bastones.

**CAÑA DE JAPPAROH.** V. Caña Bellouguet blanca.

**CAÑA DE KAYLEK.** ? Cuba?

**CAÑA DE PINANG.** V. Caña de Salangora.

**CAÑA DE POOSSE.** ? Cuba?

**CAÑA DE SALANGORA.** Variedad del *Saccharum officinarum*, Lin.? Tiene en sinonimia: Caña bambú, Caña de China [V.], Caña de Pinang; los malayos de Singapoor y Malacca le dicen Tibboo cappor [Caña encalada.] y los de Wellesley, Tibboo bittong beraboo. [Caña de corteza empolvada.] Se ensaya en Cuba!

**CAÑA DE SALANGORA BLANCA.** Nombre impropio de la Caña Bellouguet blanca, en las Antillas.

**CAÑA DE SALANGORA RAYADA.** ? Cuba?

**CAÑA DE SALANGORA ROJA.** Nombre impropio de la Caña Bellouguet roja, en las Antillas.

**CAÑA DE SALANGORA VERDE.** ? Cuba?

**CAÑA DE SALANGORA VIOLETA.** ? Cuba?

**CAÑA DE SANTO DOMINGO.** V. Caña criolla.

**CAÑA DE SINGAPOOR.** V. Caña amarilla de Taití.

**CAÑA DE LA TIERRA.** V. Caña criolla.

**CAÑA DE LAS PAMPAS.** Graminea de la América meridional, cultivada en Cuba, el *Gynerium argenteum*, Nees, ó Carrizo de Chile y Cola de zorra.

**CAÑA DORADILLA.** V. Caña criolla.

**CAÑA ELEFANTE DE LA COCHINCHINA.** [Reynoso.] *Saccharum officinarum*, Lin., variedad γ, giganteum. Se le dice también Caña gigante, Caña mónstruo del Japón [V.] y Caña pié de elefante. Cuba!

**CAÑA FÍSTOLA.** V. Caña fistula.

**CAÑA FÍSTOLA CIMARRONA.** [Fernández.] *La Cassia grandis*, Lin. [*Cathartocarpus Brasiliana*, Jacq. .] [V. Cassia del Brasil.]

**CAÑA FÍSTOLA EXÓTICA.** [Fernández.]?

- CAÑA FÍSTOLO. V. Caña fistula.
- CAÑA FÍSTULA. [Cuba y P. R.] Leguminosa silvestre, la Cassia fistula, Lin., ó Caña fistola y Caña fístolo.
- CAÑA FÍSTULA CIMARRONA. [P. R.] Cassia del Brasil en Cuba.
- CAÑA GIGANTE. V. Caña elefante de la Cochinchina.
- CAÑA GRUESA VERDE DE TAITÍ. Saccharum officinarum, Lin., variedad ó, Tahitense, sub-variedad 2. Es el Irimotu de Taití. Cuba?
- CAÑA IMPERIAL DEL BRASIL. ? Cuba!
- CAÑA LUSIER. [Jiménez.] ? Cuba!
- CAÑA MONSTRUO DEL JAPÓN. [Lachaume.] Nombre erróneo? [V. Caña elefante de la Cochinchina.]
- CAÑA MORADA. Saccharum violaceum, Tuss., variedad β, purpureum. No debe confundirse con la Caña violeta de Batavia. Cuba, cultivo extenso!
- CAÑA NEGRA DE JAVA. V. Caña violeta de Batavia.
- CAÑA NEGRA DEL NEPAL. ? Cuba?
- CAÑA NUEVA CALEDONIA. [Jiménez.] Variedad del Saccharum officinarum, Lin.? Introducida en Cuba! [\*]
- CAÑA PIÉ DE ELEFANTE. [Jiménez.] V. Caña elefante de la Cochinchina.
- CAÑA PORT MAKAY. [Jiménez.] ? Cuba!
- CAÑA RAYADA DE BATAVIA. Saccharum violaceum, Tuss., variedad

- γ, fasciolatum. Es la Caña transparente de Batavia ó Caña veteadada de Batavia. Cuba?
- CAÑA REINA DE CELEDONIA. ? Cuba?
- CAÑA ROJA DE ASSAM. ? Cuba?
- CAÑA ROJA DE BENGALA. Variedad del Saccharum officinarum, Lin.? Se le dice, además, Caña de Bengala, Caña roja de Calcuta y, los malayos, Tibboo merah. Cuba?
- CAÑA ROJA DE CALCUTA. V. Caña roja de Bengala.
- CAÑA ROJA DE JAVA. V. Caña Bellouguet roja.
- CAÑA SANTA. V. Cañuela santa.
- CAÑA SOLERA. V. Caña amarilla de Taití.
- CAÑA TRANSPARENTE DE BATAVIA. V. Caña rayada de Batavia.
- CAÑA VETEADA DE BATAVIA. V. Caña rayada de Batavia.
- CAÑA VIOLETA DE BATAVIA. Saccharum violaceum, Tuss., variedad α, genuina, sub-variedad 2. Es el Tibboo etam [Caña negra.] de los naturales de Java, Ute de los de Taití, la Caña cristalina de Cuba, la Caña negra de Java. Cuba!
- CAÑAMO. s. m. Malvacea indígena, el Pentapetes Phœnicea, Lin. Urticacea cultivada, el Cannabis sativa, Lin.
- CAÑAMO DE MANILA. V. Abacá.
- CAÑITA DE LIMÓN. V. Cañuela santa.
- CAÑUELA. s. f. Dáse este nombre: 1) á las dos Cyperaceas siguientes: Scleria lacustris, Sauval, y Scleria Luzulaeformis, Sauval, [Scleria verticillata, Muhl.?]; 2) á las Gramineas: Chloris brevigluma, Sauval; Eriochloa punctata, Hamilt.; Eriochloa annulata, K<sup>th</sup>?; Arundinella Phragmatoides, Gris.; y Andropogon Halapensis, Sibth.; y 3) á una Orchidea: Epidendrum cochleatum, Lin. Todas estas especies son silvestres.
- CAÑUELA DE SARANA. Graminea silvestre, la Arundinella Brasilien-

[\*] Sería bueno determinar con precisión cual es la variedad neo-caledonés introducida en Cuba, porque en la Nueva Caledonia existen las numerosas variedades siguientes: I) de tallos velludos, Pounemate, Kabopolenouen; II) de tallos lampiños: 1) violetas, Niengou, Goreate, Kinemaité, Poilote, Maïou, Kouhala, Kiaboue &<sup>a</sup>; 2) blanco-violáceos, Paiambou, Poboue, Schimate, Tshiambo; 3) acintados, Donelone, Gadenadeboni, Mebouangue, Tulebi, &<sup>a</sup>; y 4) verdes ó amarillos, Pidiak, Kondimoua, Otten-maugia, Paieme, Boiepe.

- sis, Radd. [*Arundinella Cubensis*, Gris.]
- CAÑUELA SANTA. Nombre de dos Scitamineas indígenas, el *Costus ruber*, Wt., y el *Costus spicatus*, Sw. Se les dice también Caña santa, Cañita de limón, Limoncillo, Yerba de limón, Yerba limón y, á la última especie, Caña de arroyo.
- CAÑUTILLO. s. m. Las Commelinaceas siguientes: *Commelina Cayennensis*, Rich.; *Commelina Hamipila*, Sauval; *Commelina longicaulis*, Jacq.; *Commelina angustifolia*, Michx.; *Commelina Virginica*, Lin.; y *Commelina nudiflora*, Lin. Se les dice también Pitillo ó Canutillo.
- CAÑUTILLO DE PAREDÓN. Commelinacea indígena, la *Sauvallea Blaini*, Wt., ó Canutillo de paredón.
- CAOBA. s. f. La *Swietenia Mahagoni*, Lin., Meliacea indígena. Según Fernández, en Santiago de Cuba le dicen Acajú [V].
- CAOBA DE CARACOLILLO. Variación de la Caoba.
- CAOBA DE CLAVO. ?
- CAOBA DE RAMAZÓN. Variación de la Caoba.
- CAOBA LISA. ?
- CAOBILLA. s. f. [Fernández.] El *Croton lucidum*, Lin., ó Cuabá de ingenio, Euphorbiacea silvestre.
- CAOBILLA DE COSTA. Rubiaceas indígenas, la *Guetarda rotundata*, G.-M., [*Stenostomum rotundatum*, Gris.]
- CAOBILLA DE SABANA. V. Encospe y Vigueta blanca.
- CAOBILLA DE SABANA, DE FLOR BLANCA. V. Vigueta blanajo.
- CAOBILLA DE SABANA, DE FLOR PUNZÓ. V. Hatillo.
- CAPA AMARILLA. [Fernández.] ?
- CAPA BLANCA. V. Varía blanca.
- CAPA PRIETA. V. Varía.
- CAPA ROTA. V. Hierro de sabanas, de hojas menudas y Varía.
- CAPA SABANERO. [P. R., según Fernández.] ?
- CAPITANEJA. s. f. [P. R.] V. Botoncillo.
- CAPUCHINA GRANDE. Nombre poco usado del *Tropæolum majus*, Lin., ó Capuchina mayor. [V. Marañuela.]
- CAPUCHINA MAYOR. V. Capuchina grande.
- CAPULINAS. La *Muntingia Calabura*, Lin., Malvacea indígena, también llamada Guácima cerezo y Guásima cerezo.
- CAQUIRAU. Según Colmeiro, la Quiebra-hacha [V].
- CARACOL REAL. Leguminosa cultivada, el *Phaseolus Caracalla*, Lin.
- CARACOLILLO DE CERCA. [Pichardo.] V. Marrullero.
- CARACOLILLO LABRADO. [P. R., según Fernández.] ?
- CARACOLILLO LISO. [Fernández.] ?
- CARACOLILLOS DE CERCA. V. Marrullero.
- CARAMANÁ. ?, ó Caramarama.
- CARAMARAMA. V. Caramaná.
- CARAMBOLÍ. ?
- CARAPICHO. s. m. V. Escoba.
- CARATÁ. [Bachiller.] También Karata. V. Piñuela.
- CARBONERO. s. m. El *Capparis Jamaicensis*, Jacq., *Capparidea* indígena. La *Cassia biflora*, Lin., Leguminosa silvestre.
- CARBONERO DE COSTA. V. Atetillo.
- CARBONERO DE SABANA. V. Atetillo.
- CARDO DE COMER. Compuesta cultivada, el *Cynara Cardunculus*, Lin.
- CARDO SANTO. [Cuba y P. R.] *Papaveracea* silvestre, el *Argemone Mexicana*, Lin.
- CARDÓN. s. m. *Cactea* indígena, el *Melocactus communis*, Link & Otto, ó Cardona, Tuna cabezona y Tuna cabezada.
- CARDONA. s. f. V. Cardón.
- CARDONCILLO. s. m. Dáse este nombre á tres Compuestas indígenas: la *Chuquiraga Pardoiana*, G.-M. &

- Molt [Anastrophia Illicifolia, Don.]; la Chuquiraga Mantuensis, G.-M. & Molt [Anastrophia Mantuensis, Wr.]; y la Chuquiraga intertexta, Molt & G.-M. [Anastrophia intertexta, Wr.]
- CAREICILLO AMARILLO. Compuesta indígena, Verbesina species. [Wedelia reticulata, Cand.]
- CAREICILLO DE MONTE. Rubiaceae silvestre, la Rondeletia odorata, Jacq. ó Cordobancillo [V.] y Rondeletia.
- CAREY. s. m. La Cordia angiocarpa, Rich. Esta especie es repetida en Fernández [Arboricultura, núm. 20, 94 y 173.] con los nombres de Ateje [V.] Bomitel blanco, Carey de costa y Carey vegetal.
- CAREY BEJUCO. V. Bejuco guará.
- CAREY DE COSTA. [Fernández.] V. Carey.
- CAREY VEGETAL. [Fernández.] V. Carey.
- CARIAQUITO BLANCO. [P. R.] Botón de plata en Cuba.
- CARMONÍ. s. m. V. Cúrbana macho.
- CARNE DE DONCELLA. V. Palo de doncella.
- CARNE DE DONCELLA, BLANCA. [Fernández.] ?
- CARO. s. m. [P. R.] V. Ubí.
- CARO AGRIO. [P. R.] V. Ubí agrio.
- CARO DE TRES HOJAS. [P. R.] V. Ubí de tres hojas.
- CAROLINA. s. f. V. Jocuma blanca.
- CAROLINEA. s. f. Tres Malvaceas reciben este nombre, son: la Pachira aquatica, Aubl. [Carolinea princeps, Willd.], ó Castaño silvestre [V.], Ceibón de agua, Ceibón de arroyo, Seibón de agua y Seibón de arroyo, especie cultivada en Cuba, donde no fructifica, y mal llamada Carolineana blanca [V.]; la Pachira insignis, Savign. [Carolineana insignis, Sw.], también cultivada; y la Pachira minor, Aubl.
- CAROLINEA BLANCA. [Sauvalle.] Este nombre no conviene á la Pachira aquatica, Aubl., pues esta especie tiene la flor con estambres purpúreos; conviene, en cambio, á la Pachira alba, Aubl., Malvacea cultivada [V.]. [V. Carolineana.]
- CARPE. [Fernández.] ?
- CARQUESA. s. f. La Ambrosia Crithmifolia, Cand., Compuesta silvestre.
- CARRAPA. [Bachiller.] Nombre taino de la Palma Christi.
- CARRASCO. s. m. [P. R.] Anacardiaceas silvestres: la Comocladia Illicifolia, Sw., y la Comocladia glabra, Spreng. [Comocladia acuminata, Cand.] La última especie existe en Cuba, careciendo de nombre vulgar.
- CARRASPIQUE BLANCO. V. Zarapico y Zaraza.
- CARRASPIQUE MORADO. V. Zarapico.
- CARRASPIQUE PERENNE. V. Cestillo de plata. [Iberis sempervirens, Lin.]
- CARRIZILLO DE MONTE. ? ó Tibisí grande.
- CARRIZO DE CHILE. V. Caña de las pampas.
- CASAIASCO. ?
- CASCABELILLO. s. m. Leguminosa silvestre en ambas islas, la Crotalaria Lotifolia, Lin. [Crotalaria axillaris, Ait.] En P. R. le dicen Cascabelillo axilar. Además, en Cuba, la Crotalaria verrucosa, Lin., variedad obtusa [Crotalaria cærulea, Jacq.], especie introducida.
- CASCABELILLO ALADO. [P. R.] Leguminosa silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es la Crotalaria sagittalis, Lin. [Crotalaria stipularis, Desc.]
- CASCABELILLO AXILAR. [P. R.] V. Cascabelillo.
- CASCABELILLO GRANDE. [P. R.] V. Maromera.
- CASCABELILLO VACÍO. [P. R.] V. Canario.
- CASEARIA DE FLOR PEQUEÑA. [Fernández.] No es nombre vulgar. V.



- Quina. [*Guidonia parvifolia*, G.-M.]
- CASIA DEL BRASIL. La *Cassia grandis*, Lin., Leguminosa silvestre, lo mismo que en P. R., donde la llaman Caña fistula cimarrona.
- CASMAGUA. s. f. V. Guacamari. [*Wallenia Clusiaefolia*, Gris.]
- CASTAÑA PURGANTE. Celastracea indígena, la *Hippocratea Malpighifolia*, Rudg.
- CASTAÑO DEL MALABAR. V. Arbol del Pan.
- CASTAÑO SILVESTRE. [Fernández.] V. Carolina. [*Pachira aquatica*, Aubl.]
- CASUARINA. [Fernández.] V. Pino.
- CATESBEA. s. f. Rubiaceas silvestres, la *Catesbæa spinosa*, Lin., y el *Scolosanthus parviflorus*, Sauval, ó Jía.
- CAUMAO. ?
- CAUVANA. Nombre taino del Cedro.
- CAVIMA. Mala ortografía de Cabi-ma.
- CAYAJABO. s. m. V. Mate de costa.
- CAYAYA. s. f. V. Nigua.
- CAYUMBO. [Bachiller.] ?
- CEBOLLA. s. f. Liliacea cultivada, el *Allium Cepa*, Lin.
- CEBOLLETA. s. f. Cyperaceas silvestres: el *Cyperus Havanensis*, Willd., ó Coquito; y el *Cyperus odoratus* Lin., ó Cebollino.
- CEBOLLINO. s. m. V. Cebolleta.
- CEBOLLINO DE LA PALMA. ?
- CEBORUQUILLO. [P. R.] *Thouinia tomentosa*, Cand., Sapindacea silvestre. Existe en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- CEDRO. s. m. La *Cedrela Glaziovii*, C. Cand. [*Cedrela odorata*, Gris., non Lin.], Meliacea silvestre. [V. Acajú y Cauvana.]
- CEDRO BLANCO. [Fernández.] V. Cedro blanco de Virginia.
- CEDRO BLANCO DE VIRGINIA. El *Chamaecyparis sphaeroidea*, Spach, ó Cedro blanco, Cedro de Virginia blanco, Ciprés falsa thuya, Ciprés hoja de thuya, Thuya [V.], Tuya y Tulla [V.].
- CEDRO BLANCO DE LA GUAYANA. El *Bursera altissima*, H. B. [Icica altissima, Aubl.], Anacardiacea cultivada, dicha también Cedro rojo de la Guayana y Cedro rosado [V.].
- CEDRO-CAOBA. [Fernández.] ?
- CEDRO DE BUSACO. [Fernández.] V. Cedro de Bussaco.
- CEDRO DE BUSSACO. El *Cupressus pendula*, L' Hérit., ó Cedro de Goa y Cedro de Portugal.
- CEDRO DE ESPAÑA. [Fernández.] V. Cedro de España, con fruto negro.
- CEDRO DE ESPAÑA, CON FRUTO NEGRO. Conifera cultivada, el *Juniperus Sabinoides*, Gris. [*Juniperus Thurifera*, Lin.]
- CEDRO DE GOA. V. Cedro de Bussaco.
- CEDRO DE JAMAICA. [Fernández.] V. Guácima.
- CEDRO DE MÉJICO. [Fernández.] Nombre erróneo. V. Cedronela de Méjico.
- CEDRO DE ORO. [Fernández.] Nombre erróneo. V. Cedro Deodara.
- CEDRO DE PORTUGAL. V. Cedro de Bussaco.
- CEDRO DE SIBERIA. [Fernández.] El *Pinus Cembra*, Lin.
- CEDRO DE VIRGINIA. [Fernández.] V. Cedro de Virginia, encarnado.
- CEDRO DE VIRGINIA, BLANCO. V. Cedro blanco de Virginia.
- CEDRO DE VIRGINIA, ENCARNADO. El *Juniperus Virginiana*, Lin., ó Cedro de Virginia, Cedro encarnado de Virginia, Cedro rosado [V.], Enebro criollo y Sabina de Costa.
- CEDRO DE LAS BERMUDAS. *Juniperus Bermudiana*, Lin.
- CEDRO DEL LÍBANO. [Fernández.] ? No es el *Cedrus Libani*, Barr.
- CEDRO DEL LICEO. *Juniperus Phænicea*, Lin. ?
- CEDRO DEODARA. *Cedrus Deodara*, Loud.

- CEDRO ENCARNADO DE VIRGINIA.** V. Cedro de Virginia, encarnado.
- CEDRO HEMBRA.** [Fernández.] El Cedro. [P. R.] El Cedro de Cuba? [V.] ó la Cedrela odorata, Lin.?
- CEDRO MACHO.** [Fernández.] El Cedro.
- CEDRO ROJO DE LA GUAYANA.** V. Cedro blanco de la Guayana.
- CEDRO ROSADO.** [Fernández.] V. Cedro blanco de la Guayana y Cedro de Virginia, encarnado.
- CEDRONELA DE MÉJICO.** Labiada cultivada, la Cedronella Mexicana, Benth. [Gardoquia Betonicoides, Lindl.]
- CEIBA.** s. f. [Cuba y P. R.] V. Seiba.
- CEIBÓN.** s. m. V. Seibón.
- CEIBÓN BOTIJA.** V. Seibón botija.
- CEIBÓN DE AGUA.** V. Carolina.
- CEIBÓN DE ARROYO.** V. Carolina.
- CELESTINA.** s. f. Compuesta silvestre, el Eupatorium Celestinum, Lin. Es una de las varias especies dichas Rompesaragüey [V.]. También el Ageratum cæruleum, Lin. [Celestina cærulea, Cass.], Compuesta naturalizada, ó Celestina azul, cuya especie presenta muchos individuos con las flores blancas; entonces le dan el nombre de Celestina blanca.
- CELESTINA AZUL.** V. Celestina.
- CELESTINA BLANCA.** V. Celestina. Es un nombre contradictorio.
- CELESTINA DE AGUA.** La única Ceratophyllea que existe en Cuba, siendo silvestre. Es el Ceratophyllum demersum, Lin.
- CELIDONIA.** s. f. [Pichardo.] V. Yerba de la sangre.
- CELINDA.** s. f. El Philadelphus coronarius, Lin. ó Geringuilla y Jeringuilla, Saxifragacea cultivada.
- CELOSA CIMARRONA.** V. Violetina.
- CENIZO.** s. m. [P. R.] Melastomacea silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es la Miconia precox, Sauval. [Tetrazygia Elæagnoides, Gris., non Cand.] [V. Humo de sabana.]
- CENIZO BLANCO.** Chenopodiacea silvestre, el Chenopodium album, Lin., ó Apasote blanco.
- CENIZO STAHL.** La Miconia Stahli, G.-M.\* [Tetrazygia Stahlii, Cogniaux.], Melastomacea endémica en P. R.
- CEPA - CABALLERO.** Las Loranthaceas siguientes: Phoradendron Berterianum, Eichl.; Phoradendron rubrum, Gris.; Phoradendron flavescens, Nutt.?, Phoradendron sessilifolium, Gris.; Phoradendron tetrastachyum, Gris.; y Phoradendron hexastachyum, Gris.
- CERA.** s. f. [Pichardo.] V. Flor de cera. [Fernández.] Es el Arbol del sebo [V.].
- CERA AMARILLA.** [Sauvalle.]?
- CERECERO.** s. m. V. Cerezas.
- CEREZAS.** [P. R.] Malpighiacea cultivada en ambas islas; es la Malpighia Punicifolia, Cav., ó Cerecero.
- CEREZO.** s. m. V. Cerezo de Jamaica y Palo de gallina.
- CEREZO DE CAYENA.** Myrtacea silvestre, la Eugenia uniflora Lin.
- CEREZO DE JAMAICA.** Malpighiacea silvestre, la Malpighia glabra, Lin., ó Cerezo.
- CEREZO DEL PINAR.** Myrtacea silvestre, la Eugenia megalopetala, Gris.
- CEREZO SILVESTRE.** Meliacea cultivada [?], la Trichilia trifoliata, Jacq.
- CERILLO.** s. m. V. Macagua de costa.
- CERILLO DE COSTA.** V. Cuabilla de costa.
- CERILLO DE LOMA.** Nombre vulgar de la única Berberideea silvestre, el Berberis Fraxinifolia, Hook.?

[\*] Al refundir esta especie de Tetrazygia en el género Miconia, me considero altamente honrado en que las leyes de la Nomenclatura botánica me permitan continuar exponiendo el apellido del distinguido naturalista puerto-riqueño.

- CERRAJA.** s. f. Compuesta silvestre, *Lactuca species*. [*Sonchus oleraceus*,  $\alpha$ ,  $\beta$ , Lin., *Sonchus ciliatus*, Lamk.] En P. R. le dicen Chicoria.
- CESTILLO DE PLATA.** El *Iberis sempervirens*, Lin., ó *Carraspique perenne*, y el *Iberis semperflorens*, Lin.
- CHAGARETA.** s. f. V. Guano cana de monte.
- CHAMBERGA.** [Pichardo.] ?
- CHAMICO.** s. m. Dáse este nombre á dos *Solaneas* silvestres, la *Datura Stramonium*, Lin., variedad *tatula*, y la *Datura Metel*, Lin.
- CHAMICO BEJUCO.** La *Solandra longiflora*, Tuss., y la *Solandra grandiflora*, Sw., *Solaneas* indígenas.
- CHAMICO DE LA JUDEA.** V. Nangué.
- CHAMICO DE LA TIERRA.** V. Nangué.
- CHAMICO SILVESTRE.** La *Datura cetrifera*, Ort., *Solanea* silvestre.
- CHAMISO.** s. m. [P. R.] La *Dodonaea viscosa*, Lin., *Sapindacea* silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar. [Cuba.] V. Aguinardo. [*Ipomæa calantha*, Gris.]
- CHAPARRO.** s. m. V. Vaca-buey.
- CHAYO.** s. m. V. Piñón vómico.
- CHAYOTE BLANCO.** V. Chayote francés.
- CHAYOTE FRANCÉS.** [Pezuela.] Es el Estropajo [V.] ó Jaboncillo [V.] [*Luffa acutangula*, Roxb.]. Pezuela le dice también Chayote blanco.
- CHIAGARI.** s. m. [P. R.] Se da tal nombre á dos *Lythraceas* silvestres: la *Cuphea micrantha*, Kth., y la *Cuphea Parsonsia*, R. Br. La última especie es silvestre en Cuba, careciendo de nombre vulgar.
- CHÍCHARO.** s. m. El *Pisum sativum*, Lin., ó Alverja y Guisante. [V. Gandú.]
- CHÍCHARO DE CUMANÁ.** V. Gandú.
- CHICHARRO.** [Fernández.] ?
- CHICHARRÓN.** s. m. La *Terminalia* Chicharronia, Sauval., *Combretacea* indígena.
- CHICHARRÓN AMARILLO.** V. Chicharrón de monte.
- CHICHARRÓN DE COSTA.** V. Copalillo.
- CHICHARRÓN DE FARALLÓN.** *Menispermia* indígena, el *Pachygone axilliflorum*, G.-M., [*Anomospermum axilliflorum*, Gris.]
- CHICHARRÓN DE MONTE.** La *Terminalia arbuscula*, Sw.?, y una variedad. Dícese también Chicharrón amarillo. Es una *Combretacea*.
- CHICHARRÓN ESPINOSO.** *Euphorbia* silvestre, el *Drypetes glomerata*, Gris.
- CHICHARRONCILLO.** s. m. *Menispermia* indígena, el *Pachygone Cubensis*, Gris.
- CHICHARRONCILLO DE COSTA.** *Sapindacea* silvestre, la *Thouinia trifoliata*, Poit., ó Copalillo [V.].
- CHICHARRONCILLO DE PAREDÓN.** La *Teophrasta Americana*, Sw.?, *Myrsinea* indígena.
- CHICHICASTRE.** s. m. V. Chichicate.
- CHICHICATE.** s. m. La *Urera baccifera*, Gaud., ó Chichicastre, *Urticacea* indígena.
- CHICORIA.** s. f. [P. R.] V. Cerraja.
- CHICORIA AZUL.** [P. R.] La *Lactuca intybacea*, Jacq., [*Brachyrhamphus intybaceus*, Cand., *Brachyrhamphus Caribæus*, Cand.] Es una Compuesta silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- CHINA DULCE.** [P. R.] Es Naranja de China en Cuba.
- CHINCHONA.** s. f. V. Vigueta. [*Exostema floribundum*, Roem. & Schult.]
- CHIRIMOYA.** s. f. *Anonacea* cultivada, la *Anona Cherimolia*, Mill., [*Anona Humboldtii*, Dun.]
- CHIRIVÍA.** s. f. *Pastinaca* sativa, Lin., *Umbellifera* cultivada.
- CHIRIVITA.** s. f. [P. R.] Compuesta silvestre, no cubana, el *Eupatorium spathulatus*, Vahl.

- CHIVO. s. m. V. Limón-café.
- CHOCHO. s. m. El *Lupinus albus*, Lin., ó Frijol chocho, Leguminosa cultivada.
- CHOTILLO. s. m. V. Pimienta de playa.
- CIBAIOS. [Pedro Martir de Anglería.] ?
- CICLAMOR. s. m. V. Arbol del amor.
- CIDRA. s. f. Rutacea cultivada, el *Citrus Medica*, Risso.
- CIENIGUILLO. s. m. [P. R.] Myrtacea silvestre, la *Myrcia ferruginea*, Cand. No existe en Cuba.
- CIGUA. s. f. La *Nectandra Willdenowiana*, Nees, [*Nectandra sanguinea*, Gris.], Laurinea silvestre.
- CIGUARAYA. s. f. La *Trichilia Havanaensis*, Jacq. [*Trichilia minor*, Rich.], Meliacea silvestre, dicha también Ciguaraya macho, Siguaraya y Siguaraya macho.
- CIGUARAYA MACHO. V. Ciguaraya.
- CILANTRILLO. V. Culantrillo.
- CILANTRO DE CARTAGENA. V. Culantro cimarrón.
- CINAMOMO. s. m. La *Melia sempervirens*, Sw., Meliacea cultivada.
- CINCHONA. s. f. [Sauvalle.] V. Viqueta.
- CINCO-LLAGAS. Acanthacea cultivada, la *Gendarussa vulgaris*, Nees.
- CIPRÉS. s. m. El *Cupressus sempervirens*, Lin.
- CIPRÉS FALSA THUYA. V. Cedro blanco de Virginia.
- CIPRÉS HOJA DE THUYA. V. Cedro blanco de Virginia.
- CIRIO. s. m. La *Xylopia glabra*, Lin. [*Xylopia obtusifolia*, Rich., *Habzelia obtusifolia*, A. Cand.], Anonacea indígena, dicha también Guabica, Guabico de sabana, Guimba, Güimba, Laurel pico de gallo, Palo de bomba, Pico de gallo laurel, Pico de monte.
- CIRUELA AGRIA. V. Jobo.
- CIRUELA AMARILLA. V. Jobo.
- CIRUELA CAMPECHANA. *Anacardium* cea cultivada en ambas islas, el *Spondias purpurea*, Lin., ó Ciruela colorada. En P. R. le dicen Ciruela del país
- CIRUELA COLORADA. V. Ciruela campechana.
- CIRUELA DE MADAGASCAR. Bixacea cultivada, muy rara, la *Flacourtia Ramontchi*, L' Hérit. [*Stigmarota Africana*, Lour.] Su fruto, bastante insípido, recibe en Cuba igual nombre que el árbol.
- CIRUELA DEL PAÍS. [P. R.] V. Ciruela campechana.
- CIRUELA LOCA. V. Jobo.
- CIRUELO CIMARRÓN. V. Jía manzanilla.
- CITERO. [Fernández.] Este nombre y el de Aceitero son erróneos. No designa la *Spondias Cytherea*, Sonn., de las islas de la Sociedad y desconocida en Cuba, sino el Jobo [V.], mal llamado *Spondias Cytherea* por Tussac.
- CLAVEL DE POETA. El *Dianthus barbatus*, Lin.
- CLAVEL DE LA CHINA. Caryophyllaea cultivada, el *Dianthus Sinensis*, Lin.
- CLAVELITOS. Apocynaea indígena, el *Echites sub-erecta*, Jacq., ó Clavelitos de sabana, flor amarilla.
- CLAVELITOS DE MANGLAR. El *Echites paludosa*, Vahl, Apocynaea indígena. [V. Clavelitos de sabana.]
- CLAVELITOS DE SABANA. El *Echites biflora*, Jacq., ó Clavelitos de manglar [V.].
- CLAVELITOS DE SABANA, FLOR AMARILLA. V. Clavelitos.
- CLAVELLINA. s. f. La *Andromeda glandulosa*, Sauval; la *Andromeda obtusa*, Sauval; la *Andromeda Jamaicensis*, Sw.; la *Andromeda latifolia*, Sauval; la *Andromeda lacustris*, Sauval; y la *Andromeda Cubensis*, Gris., Ericaceas indígenas. Además, la *Cenothera* cea silvestre siguiente: *Ludwigia Clavellina*, G.-M. & Molt [Lud-



- wigia repens, H. Bn. *Jussiaea repens*, Lin. *Jussiaea Swartziana*, Cand. ? *Jussiaea Peplodes*, Kth ? *Cubospermum palustre*, Lour.; se nombra también Yerba de clavo y, en P. R., Yerba de clavo acuático. [V. Rosa del río.] [P. R.] V. Guacamaya.
- CLAVELLINA DE LAGUNA.** El *Croton stenophyllus*, Gris., Euphorbiacea endémica. [V. Verraco.]
- CLAVELLINA DE PAREDÓN.** La *Ginoria glabra*, Gris., ó *Cuaresmilla de paredón*, Lythracea indígena.
- CLAVELLINA DE RÍO.** Rubiaceae silvestre, el *Exostema* [ó *Exostema*] *longiflorum*, Roem. & Schult.
- CLAVELLINA ESPINOSA.** La *Ginoria spinosa*, Gris., ó *Cuaresmilla espinosa*, Lythracea indígena.
- CLAVELÓN.** s. m. El *Tagetes erecta*, Lin., Compuesta cultivada, dicha también Copete y Flor de muerto.
- CLAVELÓN DE PLAYA.** [P. R.] Compuesta silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es *Verbesina speciosa*. [Borrichia arborescens, Cand.]
- Co.** s. m. [Bachiller.] Término tai-no que, entre otras cosas, significa Fruto.
- COATLÍ.** s. m. Nombre mejicano del Ben [V].
- COBALONGA.** s. f. V. Cabalonga.
- COCA DEL PERÚ.** Linaceae introducida en Cuba, el *Erythroxylon Coca*, Lamk. Tiene un alcalóide, la Cocaína— $C^{17} H^{21} AzO^4$ —empleado con buen resultado como anestésico local.
- COCAINA.** s. f. V. Coca del Perú.
- COCO.** s. m. Palma indígena, el *Cocos nucifera*, Lin. En Cuba le llaman también Palma de coco y, de rareza, Cocotero.
- COCO DE GUINEA.** V. Palma yeiba.
- COCO MACACO.** Palma indígena, el *Bactris Plumeriana*, Mart., ó *Pajuá*, *Pajicá* y *Palmilla*.
- COCOLLOL.** s. m. V. Palma. [*Caryota urens*, Lin.]
- COCORRÓN.** s. m. [P. R.] *Celastracea silvestre*, el *Elaeodendron xylocarpum*, Cand. No existe en Cuba.
- COCORRONCITO.** s. m. [P. R.] V. Piñipiñi.
- COCOTERO.** s. m. V. Coco.
- COCUÍ.** s. m. V. Cocuy.
- COCUISA.** s. f. Otro nombre de la Pita. [V. y también Cocuy.]
- COCUY.** s. m. Nombre venezolano del Maguey [V.], pero que en Cuba se aplica á la Pita. [V. como Maguey de Cocuí.] Otros escriben Cocuí. [V. Cocuisa.]
- COCUYO.** s. m. El *Sideroxylon confertum*, Sauval, y la *Bumelia retusa*, Sw., Sapoteas indígenas.
- COCUYO DE FRUTO CHICO.** Sapotea indígena, el *Lucuma dictyoneura*, G. M. [*Labatia dictyoneura*, Gris., *Sideroxylon dictyoneurum*, Gris., *Dipholis nigra*, Gris., *Bumelia nigra*, Sw.], dicho por Richard Cucuyo, Ojo de cucuyo y Jiguí, nombres no aceptables.
- COFA.** s. f. V. Agracejo.
- CÓGEOLO TODO.** V. Mil rosas.
- COHIBÁ.** Nombre indo-americano del *Nicotiana Tabacum*, Lin., Solanaceae. Indebidamente se sustituye aquel término con el de Tabaco [V].
- COHOBA.** [Oviedo.] V. Cojoba.
- COJATE.** s. m. Dáse tal nombre á tres Scitamineas, dos indígenas: la *Renealmia Occidentalis*, Gris., y la *Renealmia ventricosa*, Gris., y la tercera cultivada: la *Alpinia nutans*, Rosc.
- COJATILLO.** s. m. La *Renealmia amana*, Rich.
- COJIBÁ.** Pronunciación defectuosa de Cohibá [V].
- COJOBA.** s. f. [P. R. según Fernández.] Quiebra-hacha en Cuba. En P. R. también se emplea este último nombre [V].

- COJÓBANA.** s. f. [P. R.] La *Piptadenia peregrina*, Benth.?, Leguminosa no cubana. [V. Moruro prieto.]
- COJOBILLA.** s. f. [P. R.] La *Albizia Julibrissin*, Boiv.?, [Acacia angustiloba, Cand.], Leguminosa silvestre, no cubana.
- COJOBO.** [Pichardo.]? Parece una planta distinta de la Cojoba ó Quebra-hacha [V.].
- COL.** s. f. Crucifera cultivada, la *Brassica oleracea*, Lin. Presenta numerosas variedades, algunas de las cuales existen en Cuba. [V. Coliflor.]
- COLA.** s. f. Malvacea africana, introducida en Cuba, con mal resultado. Es la Cola acuminata, R. Br. [Sterculia acuminata, P. Beauv.], ó Kola.
- COLA DE CABALLO.** Equisetacea indígena, el *Equisetum ramosissimum*, Desf., ó Rabo de gato y Rabo de zorra.
- COLA DE LEÓN.** V. Bastón de San Francisco.
- COLA DE ZORRA.** Nombre chileno de la Caña de las pampas [V.].
- COLIFLOR.** s. f. Crucifera cultivada, la *Brassica oleracea Botrytis cauliflora*, Cand. [V. Col.]
- COLINABO.** s. m. Crucifera cultivada, la *Brassica campestris Napobrassica*, Cand.
- COLONIA.** [Pichardo.] V. Pepú.
- COLOQUINTILLA.** s. f. [P. R.] Se da ese nombre á dos Cucurbitaceas silvestres en ambas islas y sin nombre vulgar en Cuba. Son: 1) la *Cayaponia racemosa*, Cogniaux [Cionandra racemosa, Gris. *Trianospermum racemosum*, Gris.]; existiendo además en P. R. la variedad Plumieri y en Cuba la variedad acutiloba; 2) la *Cayaponia Americana*, Cogniaux, variedad vulgaris. [Cionandra graciliflora, Gris. *Trianospermum glaciliflorum*, Gris.] En fin, en P. R. se encuentra la *Cayaponia angustiloba*, G.-M. [Cionandra angustiloba, Bello.], sin nombre vulgar, y desconocida en Cuba.
- CONCHITA.** s. f. La *Clitoria glomerata*, Gris., Leguminosa indígena.
- CONCHITA AZUL.** V. Bejuco de conchitas.
- CONCHITA BLANCA.** [P. R.] La *Clitoria Glycinoides*, Cand., Leguminosa silvestre en ambas islas y sin nombre vulgar cubano.
- CONCHITA DE PLUMIER.** [P. R.] Leguminosa común á las dos islas, sin nombre vulgar en Cuba. Es la *Centrosema Plumieri*, Benth.
- CONCHITA DOBLE.** ?, ó Conchita moñuda.
- CONCHITA ESBELTA.** [P. R.] *Clitoria arborescens*, Ait. No la hay en Cuba.
- CONCHITA LAURIFOLIA.** [P. R., según Stahl.] No es nombre vulgar. Se refiere á la *Centrosema Laurifolia*, Poir., Leguminosa silvestre, no cubana.
- CONCHITA MOÑUDA.** V. Conchita doble.
- CONCHITA PELUDA.** [P. R.] *Centrosema pubescens*, Benth. En Cuba no tiene nombre vulgar.
- CONCHITA VIRGINIA.** [P. R.] Leguminosa silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es la *Centrosema Virginianum*, Benth.
- CONCOMBRO.** s. m. [P. R.] V. Pepino cimarrón.
- CONFITILLO.** s. m. V. Escoba amarga.
- CONTRAYERBA.** s. f. La *Flaveria Contrayerba*, Pers., Compuesta silvestre, y la *Flaveria repanda*, Lag., sub-naturalizada.
- COPA DE JúpITER.** [Coloma.] V. Girasol.
- COPAL.** s. m. Anacardiacea silvestre, el *Protium Guianense*, March. [Icica Copal, Rich. *Bursera hoptaphylla*, Sauval.], y la resina que produce.

- COPAL COJOL.** [Fernández.] ? [Aún en el caso de haberse referido Fernández al Copal cocote de Méjico, este nombre es el de una Anacardiacea desconocida en Cuba.]
- COPALILLO.** s. m. 1) La *Thouinia nervosa*, Gris. [Schmidelia nervosa, Rich.,], Sapindacea indígena, dicha, además, Canelillo [V.] y, por Fernández, Canelilla. 2) El *Vitex ringens*, Gris, ó Chicharrón de Costa, Verbenacea silvestre. [V. Chicharroncillo de costa.]
- COPETE.** s. m. V. Clavelón.
- COPEY.** s. m. Clusiacea silvestre en ambas islas, la *Clusia rosea*, Lin. En P. R. se dice Cupey.
- COPEY AMARILLO.** [Sauvalle.] ?
- COPEY VERA.** La *Ternstroemia obovalis*, Rich.; la *T. albo-punctata*, Choisy; la *T. flavescens*, Gris.; y la *T. cernua*, Gris., Ternstroemiaceas silvestres.
- COPEICILLO.** s. m. *Clusia alba*, Lin.?, Clusiacea indígena.
- COPEICILLO DE MANGLAR.** *Clusia venosa*, Lin.?
- COQUITO.** s. m. V. Cebolleta.
- CORAL.** s. m. V. Ponasí.
- CORALILLO.** s. m. Aplícase este nombre á tres plantas cultivadas en Cuba: 1) la *Adenantha Pavonina*, Lin. [V. Palo de Peronías.]; 2) la *Brunnichia cirrhosa*, Banks, Polygonacea de la América boreal; y 3) el *Antigonum leptopus*, Hook., Polygonacea originaria de Méjico.
- CORALILLO BLANCO.** ?
- CORALITOS.** [Cuba.] V. Ojo de ratón. [P. R.] V. Palo de peronías.
- CORAZÓN DE CABRITO.** Nombre del *Caladium bicolor*, Vent., Aroidea cultivada, dicha también Malanga [V.], Corazón de Jesús y Papagayo [V.].
- CORAZÓN DE JESÚS.** V. Corazón de cabrito.
- CORCHO.** s. m. Cycadea indígena, la *Dendrozamia calocoma*, C. Cand.
- CORDOBÁN.** s. m. 1) La *Miconia Poiretii*, G.-M. [Calycogonium Cubense, Rich., in Sagra, *His. fis. polít. nat. Cuba*, X, t. 44, non Gris., *Cat. pl. Cub.* *Pachyanthus Poiretii*, Gris.], Melastomacea indígena. 2) La *Miconia Wrightii*, H. B. [Pachyanthus Wrightii, Gris.], Melastomacea endémica. 3) El *Pentapetes Phænicea*, Lin., Malvacea silvestre. 4) El *Rhæo discolor*, Hance [Tradescantia discolor L' Hérit.], Commelinacea cultivada.
- CORDOBÁN PELUDO.** La *Clidemia lanata*, Cand., y la *Clidemia hirta*, Don, Melastomaceas indígenas. La última especie se dice Camacey peludo en P. R., donde se encuentra, además, la variedad elegans, Don, cubana.
- CORDOBANCILLO.** s. m. La *Miconia angustiflora*, G.-M. [Tetrazygia angustiflora, Gris. T. Elæagnoides, Gris.], y la variedad argyrophylla, G.-M. [Naudinia argyrophylla, Rich.], Melastomacea indígena. La *Miconia species*. [Tetrazygia semicrenata, Gris.] La *Miconia species*. [Tetrazygia brachycentra, Sauval.] La *Miconia species* [Tetrazygia laxiflora, Naud.], ó Corbobancillo de loma. El *Pachyanthus oleifolius*, Gris. El *Pachyanthus angustifolius*, Gris. La *Conostegia Clidemioides*, Wr. El *Calycogonium productum*, Sauval. [V. Cordobancillo peludo.] [P. R.] Rubiaceas silvestre, la *Rondeletia arborescens*, Gris., no cubana, y la *Rondeletia lævigata*, Ait., especie común á las dos islas y sin nombre vulgar en Cuba. [V. Carecillo de monte.]
- CORDOBANCILLO DE ARROYO.** La *Miconia lævigata*, Cand., Melastomacea indígena. En P. R. le dicen Camacey de paloma.
- CORDOBANCILLO DE LOMA.** V. Cordobancillo. [Miconia species. Tetrazygia laxiflora, Naud.]

- CORDOBANCILLO, FLOR ROSADA.** Melastomacea indígena, la *Conostegia Xalapensis*, Don.
- CORDOBANCILLO PELUDO.** La *Clidemia spicata*, Cand., variedad *Surinamensis*, ó *Cordobancillo* [V.], y la *Miconia Ibaguensis*, Sauval. Son Melastomaceas indígenas.
- CORDÓN DE SAN FRANCISCO.** Lycopodiacea indígena, el *Lycopodium phlegmaria*, Lin., variedad *aqualupianum*, Spreng.
- COROJO. s. m.** El *Cocos crispera*, Kth, y el *Gastrococos armentalis*, Moral., Palmas indígenas. [V. *Nabima*.]
- COROJO DE GUINEA.** El *Elæis Guineensis*, Lin. [V. *Aobara*.], y el *Acrocomia sclerocarpa*, Mart., Palmas cultivadas.
- COROJO DE JAMAICA.** Palma silvestre, el *Acrocomia lasiospatha*, Mart.
- COROZO DEL ORINOCO.** La *Martinezia Caryotaefolia*, Kth, Palma cultivada.
- CORTADERA. s. f.** Cyperacea indígena, el *Cyperus Olfersianus*, Kth.
- COWLEINA.** Nombre erróneo. V. *Cowleyina*.
- COWLEYINA. s. f.** Alcalóide extraído de las hojas de la *Yagruma* hembra [*Cecropia peltata*, Lin.] por el Dr F. Vildósola, y dedicado al Dr A. Cowley. [V. *Yagruma* hembra.]
- CRESTA DE GALLO.** Tres Malvaceas indígenas reciben este nombre, son: la *Sloanea Amygdalina*, Gris.; la *Sloanea longiseta*, Wr.; y la *Sloanea Curatellifolia*, Gris., dicha también *Pito*. [V. *Bambú* y *Moco de Pavo*.]
- CRESTA DE GALLO BLANCA.** [Cuba y P. R.] Leguminosa silvestre en ambas islas, el *Teramnus uncinatus*, Sw.
- CRISTAL. s. m.** [Pichardo.] El latex de las plantas.
- CRUZ DE JERUSALÉM.** El *Lychnis Chalcedonica*, Lin., *Caryophyllea* cultivada. También le dicen *Cruz de Malta*.
- CRUZ DE MALTA. V. Cruz de Jerusalém.**
- CUABÁ AMARILLA.** [Fernández.] El *Leucocroton Wrightii*, Gris. [L. flavicans, J. Müll.], Euphorbiacea indígena. [V. *Cuabilla*. (*Amyris maritima*, Jacq.)]
- CUABÁ BLANCA.** Rutacea indígena, el *Amyris balsamifera*, Lin. [A. sylvatica, Rich., non Jacq.], ó *Palo de roble*. Erróneamente se nombra esta planta *Sasafrás* y *Laurel sasafrás* [V.]. [Fernández y Pichardo.] No se refieren á la verdadera *Cuabá blanca* [*Amyris balsamifera*, Lin.], sino á la *Cuabilla*. [*Amyris sylvatica* Jacq.] [V. *Cuabá de sabana*.]
- CUABÁ DE COSTA. V. Cuabilla y Palo de incienso.**
- CUABÁ DE INGENIO. V. Caobilla.**
- CUABÁ DE MONTE.** El *Amyris Plumieri*, Cand.
- CUABÁ DE SABANA.** [Pichardo. Morales.] Sinónimo de la *Cuabá blanca* de Fernández y de Pichardo ó *Cuabilla* de Sauvalle. [*Amyris sylvatica*, Jacq.] [V. *Cuabá blanca*.]
- CUABILLA. s. f.** Rutacea indígena, el *Amyris sylvatica*, Jacq., non Rich., nombrada por Fernández y Pichardo *Cuabá blanca* [V.]. [Pichardo.] Con este nombre y el de *Cuabá amarilla* designa dicho autor el *Amyris maritima*, Jacq. Su verdadero nombre es *Cuabá de costa*. Además, el nombre de *Cuabilla* se aplica á una *Simarubea* indígena, la *Suriana maritima*, Lin. [V. *Incienso*.]
- CUABILLA DE COSTA.** Otro nombre vulgar del *Harpalyce Cubensis*, Gris., ó *Cerillo de Costa*, Leguminosa indígena.
- CUAJANÍ. s. m.** Rosacea silvestre, el *Prunus Occidentalis*, Sw. En P. R. le dicen *Almendrillo* [V.].



- CUAJANICILLO.** s. m. Rosacea silvestre, el *Prunus sphaerocarpa*, Sw.
- CUAJARÁ.** [Pezuela.]?
- CUARENTEÑA.** s. f. V. Encanto.
- CUARESILLA ÁRBOL.** El *Diplusodon Ginorioides*, Gris., Lythracea indígena.
- CUARESILLA DE PAREDÓN.** V. Clavellina de paredón.
- CUARESILLA ESPINOSA.** V. Clavellina espinosa.
- CUASIA.** V. Quasia.
- CUBAINICŪ.** V. CubanicŪ.
- CUBANICŪ.** s. m. El *Erythroxyton minutifolium*, Gris. Dicese también Arabo de piedra y SibanicŪ.
- CUCARACHA.** s. f. Commelinacea brasileña, cultivada en Cuba, la *Zebrina pendula*, Schinzl, [Tradescantia *Zebrina*, Hort.], ó *Cucarachita* y *Efémera*. [Pichardo.] En Santa Clara, nombre de la *Yuca gloriosa*, Lin. [V. Espino.]
- CUCARACHITA.** s. f. V. Cucaracha.
- CUCCHARILLO.** s. m. V. Jurabaina.
- CUCUYO.** [Richard.] V. Cocuyo de fruto chico.
- CUERNECILLO.** s. m. [P. R.] Leguminosa silvestre, no cubana, la *Schrankia distachya*, Cand. [V. Majaguilla de costa.]
- CUERO.** s. m. Las siguientes Rubiaceas silvestres: *Guettarda longiflora*, Gris.; *G. scabra*, Lamk [V. Palo de cucubano.]; *G. reticulata*, Gris.; *G. Lindeniana*, Rich.; *G. undulata*, Gris.; *G. bracteata*, Gris.; *G. retusa*, Sauval.; *G. zygophlebia*, Sauval.
- CUERO DE HOJAS GRANDES.** *Guettarda calyptrata*, Rich., ó *Guayabillo* y *Guayabita* [V.].
- CUERO DE HOJAS MEDIANAS.** *Guettarda macrocarpa*, Gris.
- CUERO DE HOJAS MENUDAS.** *Guettarda holcocarpa*, Sauval.
- CUERO DE SABANA.** *Guettarda elliptica*, Sw., Rubiaceae.
- CUERO DE SAPO.** [P. R.] V. Briguetta y Macagua de costa.
- CUERO DURO.** *Guettarda rigida*, Rich.
- CUJÍ.** s. m. V. Aromo amarillo.
- CULANTRILLO.** s. m. Filiceas indígenas, de la fam. Polypodiaceas; son: el *Adiantum Cubense*, Hook.; y el *Asplenium Trichomanes*, Lin., variedad *majus*, Hook. [V. Doradilla.] Muchos dicen *Cilantrillo*.
- CULANTRILLO DE HOJAS ANCHAS.** *Adiantum macrophyllum*, Sw.
- CULANTRILLO DE MONTE.** *Adiantum trapeziforme*, Lin.
- CULANTRILLO DE LOS POZOS.** *Adiantum Capillus-Veneris*, Lin.
- CULANTRILLO DE POZO.** *Adiantum fragile*, Sw.
- CULANTRILLO SEDOSO.** *Adiantum sericeum*, Eaton.
- CULANTRILLO TRIANGULAR.** *Adiantum deltoideum*, Sw.
- CULANTRILLO VELLUDO.** *Adiantum villosum*, Lin.
- CULANTRILLO VERDE.** *Asplenium rhizophyllum*, Lin.; y *Asplenium Cicutarium*, Sw., Polypodiaceas indígenas.
- CULANTRO CIMARRÓN.** Umbellifera indígena, el *Eryngium foetidum*, Lin., ó *Cilantro de Cartagena*, *Culantro de Cartagena*, *Culantro sabanero* y, en P. R., *Culantro del monte*. En Cuba se le dice también *Yerba del sapo* [V. y Orégano de Cartagena.]
- CULANTRO DE CARTAGENA.** V. *Culantro cimarrón*.
- CULANTRO DE CASTILLA.** ?
- CULANTRO DEL MONTE.** [P. R.] V. *Culantro cimarrón*.
- CULANTRO SABANERO.** V. *Culantro cimarrón*.
- CUNDEAMOR.** s. m. Cucurbitaceas silvestres, la *Momordica Balsamina*, Lin.; y la *M. Charantia*, Lin. En P. R. solo hay, y con igual nombre, la última especie.
- CUNNINGHAMIA.** s. f. Conifera cultivada, la *Cunninghamia Sinensis*, R. Br.
- CUPANIA DE HOJAS OPUESTAS.** [Fer-

- nández.] Este nombre y el de Manninge designan el Yaicuaque de costa [V.].
- CUPEILLO.** s. m. [P. R.] La *Clusia acuminata*, Spreng.
- CUPEY.** s. m. [P. R.] V. Copey.
- CUPEY DE ALTURA.** [P. R.] *Clusia* endémica, la *Clusia Gundlachii*, Stahl.
- CUPIDONA.** s. f. V. Yerba de Cupido.
- CURAMAGÜEY.** s. m. La *Marsdenia clausa*, R. Br., ó *Curamagüey* blanco; la *M. umbellata*, Gris.; la *M. longiflora*, Rich.; y la *M. Vinciflora*, Gris. Son *Asclepiadeas* indígenas.
- CURAMAGÜEY BLANCO.** V. *Curamagüey*.
- CURAMAGÜEY DE COSTA.** *Fischeria Havanensis*, Desf., *Asclepiadea* indígena. [V. Huevo de toro, bejuco.]
- CURAMAGÜEY PRIETO.** V. Bejuco prieto.
- CÚRBANA.** s. f. V. Malambo.
- CÚRBANA MACHO.** El *Cybianthus Bumelioides*, G.-M., & Molt [Conomorpha, Gris. *Ardisia*, Gris.], ó *Carmoní* y *Súrbana macho*, *Myrsinea* indígena.
- CURBARIL.** s. m. La *Hymenaea Courbaril*, Lin., ó *Algarrobo*, Leguminosa.
- CURUJEY.** s. m. Las *Bromeliaceas* silvestres siguientes: *Tillandsia setacea*, Sw.; *T. bulbosa*, Hook.; *T. canescens*, Sw.; *T. utriculata*, Lin.; *T. flexuosa*, Sw.; *T. argentea*, Gris.; *T. pruinosa*, Sw.; *T. Balbisiana*, Sch.; *T. angustifolia*, Sw.; *T. Kunthiana*, Gaud.; *T. ringens*, Gris.; *T. capituligera*, Gris.; *T. dissitiflora*, Sauval.; *T. excelsa*, Gris.; *T. incurvata*, Sauval.; *T. haplostachya*, Sauval.; *T. platynema*, Gris.; *T. pulchra*, Hook.; *T. capitata*, Gris.; *Guzmania* [ó *Guzmannia*] *tricolor*, R. & Pav. [V. *Curujey* lengua de vaca.]
- CURUJEY BONITO.** [Morales.] Es un *Curujey* [V.]. [*Guzmania tricolor*, R. & Pav.]
- CURUJEY DE HOJA DE LLANTÉN.** V. Flor de llantén.
- CURUJEY LENGUA DE VACA.** [Morales.] La *Tillandsia ligulata*, G.-M., [*Caraguata ligulata*, Lindl.], ó *Curujey* [V.] y Flor de incienso.
- CURUJEYES.** [Sauvalle.]?
- CUYÁ.** s. f. V. *Jocuma blanca*.

## D

- DAGAME.** s. m. El *Calycophyllum candidissimum*, Cand., *Rubiacea* silvestre.
- DAGUILLA.** s. f. A dos *Thymelæaceas* silvestres se aplica este nombre: la *Hargasseria venosa*, G.-M., [*Linodendron venosum*, Wr.]; y la *Lagetta lintearia*, Lamk., ó *Daguilla* común.
- DAGUILLA COMÚN.** [Fernández] V. *Daguilla*.
- DAGUILLA DE LOMA.** La *Lagetta Valenzuelana*, Rich., *Thymelæacea* silvestre.
- DAGUILLA VALENZOLANA.** [Fernández] V. *Daguilla* de loma.
- DAGUIYA.** Corrupción de *Daguilla* [V.].
- DAHILÍ.** [Bachiller.] La *Daguilla* común. [*Lagetta lintearia*, Lamk.]
- DAHLIA.** s. f. Dos *Compuestas* cultivadas reciben este nombre; son: el *Bidens species* [*Dahlia variabilis*, Desf. *D. pinnata*, Cav. *D. rosea*, Cav. *D. purpurea*, Poir.], y el *Bidens species* [*Dahlia coccinea*, Cav.], ambos originarios de Méjico.
- DALLA.** Corrupción de *Dahlia* [V.].
- DAMASQUINA.** s. f. El *Tagetes patula*, Lin., ó *Cagigala*, *Compuesta* cultivada.
- DÁTIL.** s. m. El fruto de la *Palma-dátil* [V.] y también toda la planta.
- DATILERA.** s. f. V. *Palma-dátil*.

**DELEITE.** s. m. [Pichardo.] ?  
**DEMAHAGUA.** [Oviedo.] V. Majagua común.  
**DEMAJAGUA.** s. f. V. Majagua común. [Hibiscus Tiliaceus, Lin.]  
**DIACANÁN.** Nombre indígena; presuntamente variedad de la Yuca agria [V.]  
**DIAHUTÍA.** [Oviedo.] V. Yautía.  
**DIAMELA.** s. f. Oleacea introducida, muy abundante en la isla de Cuba, donde se ha hecho silvestre por multiplicación, á pesar de tener siempre las flores dobles. Es el *Jasminum Sambac*, Ait., variedad ó, trifoliatum, Cand. Sería más conveniente apellidar *verticillatum* á esta variedad, porque los verticilos son de tres ó de cuatro y hasta de cinco hojas. El color de la corola es blanco pajizo. También le dicen Jazmín de Arabia. [V. Jazmín de Francia.]  
**DIBIDIBÍ.** s. m. Ortografía más conforme con la pronunciación que la de Dividiví, y correspondiente al nombre de tres Leguminosas silvestres: la *Cesalpinia pauciflora*, Sauval, [Lebidibia, Gris.]; la *C. coriaria*, Willd., ó Guaracabuya; y la *C. pinnata*, Sauval, [Lebidibia, Gris.], dicha además Cacalote y Guatapaná.  
**DÍCTAMO.** s. m. V. Díctamo real.  
**DÍCTAMO REAL.** Tres Euphorbiaceas silvestres llevan este nombre: el *Pedilanthus Tithymaloides*, Poit., ó Gallito colorado; el *P. angustifolius*, Poit.; y el *P. linearifolius*, Gris. Por corrupción se dice Itamo real ó Itamo.  
**DIEZ DEL DÍA.** V. Verdolaga de sabana.  
**DISCIPLINA.** s. f. V. Disciplinaria.  
**DISCIPLINARIA.** s. f. Con este nombre, y el de *Disciplina* ó *Disciplinilla* [V.], se conoce el *Rhipsalis Cassytha*, Gaertn., *Cactea* indígena.  
**DISCIPLINILLA.** s. f. La *Euphorbia Tirucalli*, Lin. [V. Disciplinaria.]  
**DIVIDIVÍ.** s. m. V. Dibidibí.

**DOBLA-UÑA.** [Fernández.] ?  
**DOCE DEL DÍA.** V. Buenas tardes.  
**DOMINICA.** s. f. V. Vicaria.  
**DON DIEGO DE DÍA.** Convolvulacea cultivada, el *Convolvulus tricolor*, Lin.  
**DON DIEGO DE NOCHE.** Nyctaginea silvestre, la *Allionia incarnata*, Lin., también llamada Bella de noche. La planta que en España se llama Don Diego de noche es la Maravilla de Cuba. [Mirabilis Jalapa, Lin.]  
**DON TOMÁS.** V. Piñón vómico.  
**DORADILLA.** s. f. Entre las Piperaceas, la *Peperomia nummulariifolia*, Kth.; y entre las Pteridophytas, el *Asplenium serratum*, Lin., ó Culantrillo; el *Asplenium dentatum*, Lin., también Culantrillo [V.]; y el *Asplenium auriculatum*, Sw.  
**DORMIDERA.** s. f. El *Æschynomene viscidula*, Michx., y la *Mimosa viva*, Lin., Leguminosas.  
**DORMILONA.** s. f. V. Dormidera.  
**DRAGALE.** s. m. V. Agalla de costa.  
**DRAGO.** s. m. En Cuba se da este nombre á varias Liliaceas cultivadas, que son: *Dracæna Draco*, Lin., ó Dragonal; *Calodracon ferrea*, Planch.; *Cordyline fragrans*, Planch.; y *Dracæna Cannæfolia*, Hort. [V. Palo-candela.]  
**DRAGO COLORADO RAYADO DE EUROPA.** [Fernández.] ?  
**DRAGO DE AFRICA.** [Fernández.] V. Drago. [Cordyline fragrans, Planch.]  
**DRAGO DE CANARIAS.** [Fernández.] V. Drago. [Dracæna Draco, Lin.]  
**DRAGO MORADO DE EUROPA.** [Fernández.] ?  
**DRAGO VERDE DE EUROPA.** [Fernández.] V. Palo-candela.  
**DRAGONAL.** s. m. V. Drago.

## E

**ÉBANO AMARILLO.** El *Sideroxylon Mastichodendron*, Jacq., *Jocuma*

- amarilla ó Caguani, *Sapotea* indígena. El *Tecoma leucoxyloides*, Mart., Palo blanco [V.] ó Leño blanco, *Bignoniaceae* silvestre.
- ÉBANO BLANCO. [Fernández.] ?
- ÉBANO CARBONERO. V. Ebano real. [Fernández.] ?
- ÉBANO MULATO. [Fernández.] ?
- ÉBANO VERDE. [Fernández.] ?
- ÉBANO REAL. *Diospyros tetrasperma*, Sw., ó Ebano carbonero, *Ebenaceae* silvestre. [Fernández.] ?
- ECLIPTA BLANCA. [P. R.] No es nombre vulgar, sino traducción del técnico *Eclipta alba*, Hasskarl, Compuesta silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Realmente es una forma de la *Eclipta erecta*, Lin. [*Eclipta longifolia*, Cand. *Eclipta punctata*, Lin.]
- EFÉMERA. s. f. V. Cucaracha.
- EMBELESO. V. Velesa.
- EMBELEZO. [Pichardo.] Viciación de Veleza ó mejor Velesa [V.], y en último caso de Embeleso.
- EMILIA. s. f. [P. R.] El *Senecio Sonchifolius*, Moench [*Emilia Sonchifolia*, Cand.], Compuesta silvestre en ambas islas, careciendo de nombre vulgar cubano.
- ENCANTO. s. m. La *Matthiola annua*, Sweet, ó Cuarentena, *Crucifera* cultivada.
- ENCINA. [Fernández.] V. Encino.
- ENCINA DE ESPAÑA. [Fernández.] La *Catalpa longisiliqua*, Cham., *Bignoniaceae* cultivada.
- ENCINO. s. m. El *Quercus virens*, Ait. [*Quercus cubana*, Rich.], única *Cupulifera* indígena.
- ENOSPE. s. m. La *Rondeletia stellata*, Sauval. [*Rondeletia stellata*, Gris.], ó Hatillo [V.] y Caobilla de sabana [V.]. Es una *Rubiaceae* silvestre.
- ENEA. [Pichardo.] También dicho Anea ó Espadaña [V.].
- ENEBRO CRIOLLO. V. Cedro de Virginia encarnado.
- ENELDO. s. m. *Umbellifera* cultivada, el *Peucedanum graveolens*, Benth. & Hook.
- ENEMOSO. s. f. *Anonaceae* cultivada, la *Monodora Myristica*, Dun. [*Annona*, Gærtner.] Llábase, además, Nuez moscada, pero no hay que confundirla con la *Myristica fragrans*, Houth. [*Myristica Moschata*, Lin.]
- ENREDADERA DEL HACHA. Tres *Polygaleae* silvestres llevan este nombre y el de Flor de la cruz, son: *Securidaca virgata*, Sw.; *S. Lamarckii*, Cand.; y *S. erecta*, Gris.
- ENSALADA DEL OBISPO. Otro nombre del Alcaparro bejuco [V.].
- ERNODEA DE PLAYA. [P. R.] Nombre impuesto. Es el *Hydrophylax species* [*Ernodea littoralis*, Sw.], *Rubiaceae* silvestre, no cubana.
- ESCABIOSA. s. f. La *Capraria biflora*, Lin., variedad  $\beta$ , pilosa. Según otros Esclabiosa ó Majuito. Es una *Scrophularineae* silvestre. [Coloma.] V. Viuda.
- ESCARCHA. s. f. *Aizoaceae* de jardín, el *Mesembryanthemum crystallinum*, Lin., ó Escarchosa y Yerba plata.
- ESCARCHADA. s. f. V. Escarcha.
- ESCARCHOSA. s. f. V. Escarcha.
- ESCAROLA. s. f. Compuesta hortícola, el *Cichorium Endivia*, Lin.
- ESCAVIOSA. V. Escabiosa.
- ESCLAVIOSA. V. Escabiosa.
- ESCOBA. s. f. *Malvaceae* indígena, la *Urena sinuata*, Lin., ó Carapicho. En P. R. le dicen Cadillo pata de perro.
- ESCOBA AMARGA. Compuesta indígena, el *Parthenium hysterophorus*, Lin. [*Argyrocheta bipinnatifida*, Cav.] Llábase, además, Artemisilla y Confitillo, y en P. R., Ajenjo cimarrón.
- ESCOBA CIMARRONA. *Sida triquetra*, Rich., *Malvaceae*.
- ESCOBA DE BRUJA. *Malvaceae* silvestre, la *Bastardia viscosa*, K<sup>th</sup>.



- ESCOBILLA.** s. f. La *Scoparia dulcis*, Lin., Scrophularinea silvestre. El *Eragrostis Poëoides*, Beauv., Graminea.
- ESCOBILLA MORISCA.** V. Viuda.
- ESCOBILLÓN.** s. m. [P. R.] Siempre viva en Cuba. [*Pterocaulon virgatum*, Cand.]
- ESCOBÓN HEMBRA.** [Fernández.] ?
- ESCOBÓN MACHO.** [Fernández.]
- ESCUDO DE LA HABANA.** La *Scutellaria Havanensis*, Jacq. [S. Cubensis, Rich.], Labiada silvestre.
- ESPADANA.** s. f. Nombre con que se designan dos Typhaceas silvestres, dichas también Anea, Enea y Macío; son la *Typha latifolia*, Lin., y la *T. angustifolia*, Lin.
- ESPÁRRAGO.** s. m. El *Asparagus officinalis*, Lin.
- ESPARTILLO.** s. m. *Kyllingia Filiiformis*, Sw.; *K. rigidifolia*, Bekl.; Cyperaceas silvestres. *Aristida scabra*, Kth; *A. purpurascens*, Poir.; *A. dispersa*, Trin.; Gramineas silvestres.
- ESPARTILLO DE AGUA.** *Scirpus capitatus*, Lin., Cyperaceas silvestre.
- ESPEJO DE VÉNUS.** [Coloma.] *Specularia speculum*, Cand.
- ESPIGA DE AGUA.** *Potamogeton lonchitis*, Tuck., Naiadea indígena, dicha también Lino de zanja.
- ESPIGELIA.** s. f. V. Yerba lombricera.
- ESPIJELIA.** [Pichardo.] V. Yerba lombricera. [*Spigelia anthelmia*, Lin.]
- ESPINACA SILVESTRE.** [Pichardo.] ?
- ESPINILLO.** s. m. La *Parkinsonia aculeata*, Lin., Leguminosa indígena, también nombrada Junco marino [?].
- ESPINO.** s. m. La *Machaonia cymosa*, Gris., Rubiacea indígena. La *Yucca gloriosa*, Lin., Liliacea naturalizada, dicha Bayoneta, Cucaracha [V.], Piñón de puñal y Maguey silvestre. [Fernández.] El *Xanthoxylon pterota*, Kth, más comunmente conocido por Limoncillo y Tomeguín: Rutacea silvestre.
- ESPINO DE HOJAS CHICAS.** *Machaonia microphylla*, Gris., Rubiacea silvestre.
- ESPUELA.** s. f. V. Madama.
- ESPUELA CABALLERO, DE COSTA.** *Jacquinia linearis*, Jacq., Myrsinea indígena.
- ESPUELA CABALLERO, DEL PINAR.** *Jacquinia Berterii*, Spreng.
- ESPUELA DE CABALLERO.** El *Podocarpus angustifolius*, Gris., ó *Sabina cimarrona*, Conifera indígena. La *Jacquinia Ruscifolia*, Jacq., Rosetillo ó Espuela de rey. [Fernández.] La *Jacquinia linearis*, Jacq., ó Espuela caballero, de costa, Myrsinea silvestre.
- ESPUELA DE CABALLERO, DE LOS PINARES.** *Rheedia fruticosa*, Wt., Clusiacea endémica.
- ESPUELA DE REY.** V. Espuela de caballero.
- ESTEFANOTIS.** s. m. Aselepiadea cultivada, el *Stephanotis floribunda*, A. Brongniart.
- ESTERCULIA.** No es nombre vulgar. [V. Camaruca.]
- ESTERIA.** [Coloma.] V. Estevia.
- ESTEVIA.** s. f. La *Stevia purpurea*, Willd., Compuesta mejicana, cultivada en nuestros jardines.
- ESTORAQUE.** [Fernández.] ?
- ESTRELLA.** s. f. [Pichardo.] V. Africana.
- ESTRELLA DEL NORTE.** [Balmaseda.] ? Hay una *Apocynae*, de cultivo en Cuba, dicha Estrella del Norte.
- ESTROPAJO.** s. m. La *Luffa acutangula*, Roxb., Cucurbitacea silvestre, llamada Jaboncillo [V.] por algunos. La *Luffa cylindrica*, Roem., cultivada.
- ETERNA.** s. f. Compuesta cultivada, el *Helichrysum Orientale*, Gaertn., ó *Inmortal* [V.] y Siempreviva, [V.]
- ETERNA DE AUSTRALIA.** El *Helichrysum macranthum*, Benth., ó

Inmortal de Australia y Siempre-viva de Australia.

EXTRAÑA. s. f. V. Extraña-rosa.

EXTRAÑA-ROSA. Compuesta cultivada, el *Callistephus hortensis*, Cass. [*Aster Chinensis*, Lin., *Callistephus Chinensis*, Nees.], ó Extraña y Reina Margarita. Presenta numerosas variedades.

F

FALSA PANETELA. Santalacea cultivada, única especie de esa familia que existe en Cuba. Es el *Exocarpos Ceramica*, A. Cand.

FALSO GUACO. [P. R.] V. Guaco. [*Eupatorium reticulosum*, Mol<sup>t</sup> & G.-M.]

FAROLITOS. Sapindacea indígena, el *Cardiospermum Halicacabum*, Lin. También en P. R. le dan aquel nombre.

FAURESTINA. s. f. Leguminosa silvestre, la *Albizzia Lebbeck*, Benth. [Acacia, Willd.] Se dice también Forestina y Cabellos de ángel. En P. R. es la Acacia amarilla.

FERNANDINA. s. f. Scrophularinea indígena, la *Angelonia Salicariæ-folia*, Kth.

FERNANDINA BLANCA. La *Gerardia Domingensis*, Spreng., Scrophularinea silvestre.

FILAO. s. m. V. Pino.

FILIGRANA. s. f. Se aplica este nombre á las siguientes Verbenaceas indígenas: *Lippia Betulifolia*, Kth; *Lantana Camara*, Lin.; *Lantana reticulata*, Pers.; *Lantana odorata*, Lin.; *Callicarpa ferruginea*, Sw.

FILIGRANA CIMARRONA. V. Yerba de la sangre.

FILIGRANA DE COSTA. *Excæcaria Cubensis*, J. Müll., Euphorbiacea endémica.

FILIGRANA DE MAZORCA. Verbenacea indígena, la *Callicarpa Americana*, Lin., ó Filigrana fruto

morado y Filigrana morada, Verbenacea silvestre.

FILIGRANA DE MAZORQUILLA. *Callicarpa reticulata*, Sw.

FILIGRANA DE PIÑA. *Lantana trifolia*, Lin.

FILIGRANA DE SABANA. V. Albaharello.

FILIGRANA DEL PINAR. *Callicarpa acuminata*, Kth, ó Filigrana fruto blanco, Verbenacea silvestre.

FILIGRANA FRUTO BLANCO. V. Filigrana del pinar.

FILIGRANA FRUTO MORADO. V. Filigrana de mazorca.

FILIGRANA MORADA. V. Filigrana de mazorca.

FLAMBOYANT. s. m. Leguminosa cultivada, la *Colvillea racemosa*, Boj.

FLÁMULA. s. f. El *Clematis Flammulastrum*, Gris., Ranunculacea indígena.

FLEBOTENIA. s. f. La *Phlebotænia cuneata*, Gris., Polygalea indígena.

FLECHA DE AGUA. V. Flechera.

FLECHERA. s. f. Dáse este nombre y el de Flecha de agua, á dos Alismaceas indígenas, la *Sagittaria acutifolia*, Lin., y la *S. lancifolia*, Lin.

FLOORING-BOARD. Término inglés, muy usado en carpintería bajo la correspondencia viciosa de Florimbord. Designa diversas suertes de tabloncillos de 1-1¼-1½ pulgadas de grueso por 5-6 de ancho, acepillados, machihembrados, dispuestos para suelos, provenientes de los Estados Unidos Norteamericanos y, generalmente, hechos con madera de Pino tea.

FLOR ADONIS. Este nombre se aplica á dos Ranunculaceas cultivadas, el *Adonis æstivalis*, Lin., y el *A. vernalis*, Lin.

FLOR DE AGUA. V. Nelumbio blanco.

FLOR DE AURA. V. Pasa de negro.

FLOR DE AZUFRE. Leguminosa indí-

- gena, la *Bauhinia megalandra*, Gris.
- FLOR DE BARBERO. V. Jazmín de la tierra.
- FLOR DE CALENTURA. La *Asclepias Curassavica*, Lin., ó Flor de la calentura, encarnada.
- FLOR DE CALENTURA, BLANCA. La *Asclepias nivea*, Lin. [A. perennis, Sauval, non Walter.], *Asclepiadea silvestre*.
- FLOR DE CAMPANA. V. Bijáura.
- FLOR DE CANGREJO. V. Platanillo de monte.
- FLOR DE CERA. *Asclepiadea cultivada*, la *Hoya carnosa*, R. Br.
- FLOR DE CONFITE. V. Manaca. [*Calyptrygyne dulcis*, G.-M.]
- FLOR DE CUPIDO. [Coloma.] V. Yerba Cupido.
- FLOR DE INCIENSO. V. Curujey lengua de vaca.
- FLOR DE LLANTÉN. *Orchidea indígena*, el *Pleurothallis univaginata*, Lindl., ó Curujey hoja de llantén.
- FLOR DE MAYO. [Lachaume.] *Orchidea cultivada*, la *Lælia anceps*, Lindl.
- FLOR DE MUERTO. V. Clavelón.
- FLOR DE PASCUA. La *Euphorbia punicea*, Sw., *Euphorbiacea silvestre*.
- FLOR DE RIPA. ?
- FLOR DE ROMA. El *Chrysanthemum Indicum*, Thunb., non Lin. [*Pyrethrum Sinense*, Sabine.], *Compuesta cultivada*.
- FLOR DE SAN DIEGO. La *Gomphrena lobata*, Boldo, *Chenopodiacea cultivada*. [V. San Diego.]
- FLOR DE SAN JUAN. *Malvacea silvestre*, el *Hibiscus Cannabinus*, Lin. El *Pectis punctata*, Jacq. [*Pectidium punctatum*, Lessing.], *Compuesta indígena*, llamada también Romero cimarrón [V.]. El *Cymbidium ensifolium*, Sw., *Orchidea cultivada*. [Fernández.]?
- FLOR DE SAN PEDRO. *Orchidea indígena*, el *Epidendrum nocturnum*, Lin.
- FLOR DE LA CALENTURA, ENCARNADA. [Colmeiro.] V. Flor de calentura.
- FLOR DE LA CRUZ. V. Enredadera del hacha.
- FLOR DE LA Y. La *Ipomæa bonanox*, Lin. [*Calonyction megalocarpum*, Rich.], *Convolvulacea silvestre*.
- FLOR DEL AIRE. *Bromeliacea indígena*, la *Tillandsia polystachya*, Lin.
- FLOR DEL CÁLIZ. El *Cereus triangularis*, Haw., *Cactea cultivada*. [V. Pitajaya.]
- FLOR DEL CANARIO. El *Tropæolum aduncum*, Smith, *Geraniacea cultivada*, dicha también Canarios.
- FLOR DEL PATO. *Aristolochiacea cultivada*, la *Aristolochia grandiflora*, Sw.
- FLOR DEL SOL. V. Girasol.
- FLORIMBORD. V. Floring-board.
- FLORIPUNDIO BLANCO. V. Bijáura.
- FLOX. Traducción de *Phlox* [V.].
- FORESTINA. V. Faurestina.
- FRAILECILLO. s. m. V. Tuatua.
- FRAILECILLO CIMARRÓN. *Euphorbiacea indígena*, el *Croton lobatus* Lin.
- FRAMBOYANT. [Pichardo.] Corrupción de Flamboyant [V.].
- FRANCESILLA. s. f. *Ranunculacea cultivada*, el *Ranunculus Asiaticus*, Lin., ó Marimoñas.
- FRANGIPANIER. s. m. V. Lirio blanco.
- FRESNO DE AMÉRICA. [Fernández.] V. Fustete.
- FRIEGAPLATOS. [Colmeiro.] El *Solanum paniculatum*, Lin.
- FRIJOL. s. m. La *Vigna unguiculata*, Walp., *Leguminosa*.
- FRIJOL CABALLERO. El *Dolichos Lablab*, Lin. [*Lablab vulgaris*, Sav.], ó Frijol de la tierra. La variedad más común en Cuba es la  $\alpha$ , de Gris., con corola violeta y semilla negra, y dicha Frijol caballero, negro, ó Frijol de la tierra, negro.

FRIJOL CABALLERO, NEGRO. V. Frijol caballero.  
 FRIJOL CHOCHO. V. Chocho.  
 FRIJOL CIMARRÓN. La *Vigna luteola*, Benth., Leguminosa.  
 FRIJOL COLORADO. [Pichardo.]?  
 FRIJOL COMÚN. Leguminosa cultivada, el *Phaseolus vulgaris*, Lin. Recibe además los nombres de Frijol de Veracruz, Frijol negro, Frijol prieto y Judía común. [V. Habichuela.]  
 FRIJOL DE BOLLOS. [Pichardo.]?  
 FRIJOL DE CARIFA. El *Dolichos melanophthalmus*, Cand., ó Judía de careta, Leguminosa cultivada.  
 FRIJOL DE GALLINA. La *Cassia glauca*, Lamk., Leguminosa.  
 FRIJOL DE OLOP. La *Clitoria speciosa*, Cav., Leguminosa.  
 FRIJOL DE VERACRUZ. V. Frijol común.  
 FRIJOL DE LA TIERRA. V. Frijol caballero.  
 FRIJOL DE LA TIERRA, NEGRO. V. Frijol caballero.  
 FRIJOL GRANDE. [Pezuela.] *Dolichos sesquipedalis*, Lin., Leguminosa.  
 FRIJOL ISLEÑO. [Pichardo.]?  
 FRIJOL MARRULLERO. V. Marrullero.  
 FRIJOL NEGRO. V. Frijol común.  
 FRIJOL PRIETO. V. Frijol común.  
 FRIJOLILLO. s. m. V. Jurabáina.  
 FRIJOLILLO AMARILLO. [Fernández.]?  
 FRIJOLILLO BARÍA. [Fernández.]?  
 FRIJOLILLO DE ÑAME. [P. R.] V. Jicama dulce.  
 FRIJOLILLO PRIETO. [Fernández.]?  
 FRIJOLITO. s. m. El *Phaseolus lunatus*, Lin., Leguminosa cultivada.  
 FRÍO-FRÍO. [Pichardo.]?  
 FRUTA BOMBA. V. Papaya.  
 FRUTA DE AURA. Otro nombre del Hicaco prieto, Hicaco peludo, Hicaco de aura ó Palo mulato: *Chrysobalanus mollicoma*, G.-M. [Hirtella, Kth.] Es una Rosacea silvestre.  
 FRUTILLO. s. m. *Apocynum* indígena, la *Rauwolfia ternifolia*, Kth.

FUEGO. s. m. La *Savia sessiliflora*, Willd. [*Phyllanthus Laurifolius*, Rich. P. pubigerus, Rich.], Euphorbiacea indígena. Según Pichardo, en Guantánamo se da ese nombre á una *Bijáguara* [V.], la *Colubrina ferruginea*, Brongn.  
 FULMINANTE. s. m. La *Ruellia geniniflora*, Kth., Acanthacea silvestre.  
 FUSTETE. s. m. Con este nombre, y los de Mora blanca, Mora de loma, Mora del país, se conoce una Urticacea indígena, el *Chlorophora tinctoria*, Gaud. [*Maclura*, Don, non Miq., *Morus*, Lin.] Fernández la llama Fresno de América.

G

GAGÜEY. s. m. V. Jagüey macho.  
 GAITA. s. f. [P. R.] V. Yaicuage.  
 GALÁN DE COSTA. [Fernández.]?  
 GALÁN DE DÍA. El *Cestrum diurnum*, Lin., Solanea indígena, dicha también Jazmín de día.  
 GALÁN DE DÍA, DE SABANA. *Cestrum Laurifolia*, L'Hérit., Solanea silvestre.  
 GALÁN DE NOCHE. *Cestrum nocturnum*, Lin., ó Jazmín de noche: Solanea.  
 GALÁN DE NOCHE ARBUSTO. La *Brunfelsia nitida*, Benth., ó Nabaco [V.]. Es una Solanea indígena.  
 GALÁN DE NOCHE MORADO. V. Lila de las Antillas.  
 GALÁN MORADO. V. Lila de las Antillas.  
 GALANGA. s. f. Parece ser una Aroidea india, la *Colocasia Antiquorum*, Schott. [*Arum Colocasia*, Lin.] [V. Malanga.] En otros países se dice Galanga á diversas plantas.  
 GALLITO. s. m. [P. R.] La *Sesbania grandiflora*, Poir. [Agati, Desv., *Æschynomene*, Lin.], Leguminosa cultivada, á igual que en Cuba, donde carece de nombre vulgar.



- GALLITO COLORADO.** V. Dúctamo real. [*Pedilanthus Tithymaloides*, Poit.]
- GALLITOS.** La *Dicliptera sexangularis*, Juss., *Acanthacea silvestre*.
- GAMBUTERA.** [Pichardo.] V. *Cambustera*.
- GANDASULI DE CORONAS.** V. *Mariposa*.
- GANDÚ.** s. m. [Cuba y P. R.] Leguminosa cultivada; el *Cajanus Indicus*, Spreng. [*C. flavus*, Cand. *C. bicolor*, Cand. *Cytisus Cajan*, Lin.] También le dicen Chícharo [V.], Chícharo de Cumaná y Gandul.
- GANDUL.** s. m. V. *Gandú*.
- GARBANZO.** s. m. *Cicer Arietinum*, Lin., Leguminosa cultivada, poco extendida.
- GARDENIA.** s. f. V. *Jazmín del Cabo*.
- GARRAPATA.** [?] V. *Guizacillo*.
- GARROCHO.** s. m. [P. R.] Malvacea silvestre, la *Myrodia turbinata*, Sw. No la hay en Cuba.
- GATEADO AMARILLO.** [Fernández.]?
- GATEADO NEGRO.** [Fernández.]?
- GENCIANA DE COSTA.** [Sauvalle.] Es la *Genciana* de la tierra, de costa.
- GENCIANA DE LA TIERRA.** La *Voyta uniflora*, Lamk., *Gentiana silvestre*.
- GENCIANA DE LA TIERRA, DE COSTA.** El *Enicostema littorale*, Blume [*Slevogtia Occidentalis*, Gris.], *Gentiana* indígena. Sauvalle la llama *Genciana* de costa.
- GENCIANO DE CUBA.** La *Schultesia heterophylla*, Miq., *Gentiana silvestre*.
- GENCIANO DEL PAÍS.** Dáse este nombre á dos *Gentianeas* indígenas: el *Eustoma exaltatum*, Gris.; y la *Erythraea ramosissima*, Pers.
- GENGIBRE.** s. m. Designación vulgar de una *Scitamínea* naturalizada y originaria de las regiones cálidas de la India. Es el *Zingiber officinale*, Rose. [*Amomum Zingiber*, Lin.]
- GENO-GENO.** [P. R.] V. *Guamá de costa*.
- GEÓFILA.** [P. R., según Stahl.] No es nombre vulgar. Corresponde á una *Rubiacea silvestre* en ambas islas: *Uragoga species* [*Geophila reniformis*, Don.], dicha en Cuba *Bejuco guará* [V.].
- GERANIO DE OLOR.** *Geraniaceae* cultivada, el *Pelargonium capitatum*, Ait., ó *Geranio de rosa*.
- GERANIO DE OLOR DE LIMÓN.** ?
- GERANIO DE ROSA.** V. *Geranio de olor*.
- GERANIO MALVA DE OLOR.** ?
- GERANIO MANZANA.** ?
- GERINGUILLA.** s. f. V. *Celinda*.
- GÍA.** s. f. [P. R.] *Samydea silvestre*, la *Samyda glabrata*, Sw. No existe en Cuba.
- GÍA MANSA.** [P. R.] Es la *Quina* [V.] de Cuba. *Guidonia parvifolia*, G. M., *Samydea silvestre*.
- GÍA VERDE.** [P. R.] *Guacimilla* del pinar [V.] en Cuba.
- GIBÁ.** Mala ortografía de *Jibá*.
- GIGANTÓN.** [Pichardo.]?
- GIGÜE.** [Fernández.] Es *Jigüe* [V.].
- GIMBA.** Mala ortografía de *Güimba*. [V. *Cirio*.]
- GIRAFÁ.** s. f. *Orchidea* indígena, la *Brassia caudata*, Lindl.
- GIRASOL.** s. m. Compuesta cultivada, originaria de la América del Norte, no del Perú como dice la mayoría de los autores. Es el *Helianthus annuus*, Lin. Algunos le llaman *Mirasol*, otros *Copa de Júpiter*; en Santiago de Cuba le dicen *Flor del sol*. Viciosamente se escribe *Jirasol*.
- GLADIOLO.** s. m. Dáse este nombre al *Gladiolus communis*, Lin., *Iridea* cultivada.
- GLORIOSA DEL PAÍS.** Planta indígena, de la fam. *Amaryllideas*: la *Alstremeria edulis*, Juss., ó *Campanillitos* y *Zarzalla* ó, mejor, *Zarcilla*.
- GOLONDRINA.** s. f. *Euphorbiaceas*

- indígenas: la *Euphorbia prostrata*, Ait., ó Yerba de la niña [V.]; y la *Euphorbia pilulifera*, Lin., también nombrada Yerba de la niña y, además, Malecasada.
- GOMA GUTTA DE AMÉRICA. V. Lácre.
- GOMO-RESINA GUTTA, DE AMÉRICA. V. Lácre.
- GONFIA LUSTROSA. [P. R.] V. Guabanilla de monte.
- GONZALEA. [P. R., según Stahl.] No es nombre vulgar. [V. Vinagrera].
- GOTA DE SANGRE. El *Adonis æstivalis*, Lin., Ranunculacea de jardín.
- GRACIA DE DIOS. La *Euphorbia splendens*, Boj., Euphorbiacea cultivada.
- GRACIOLA. s. f. Scrophularinea silvestre, el *Herpestis Monnieria*, Kth.
- GRACIOSA. s. f. [P. R.] Rubiacea silvestre, la *Oldenlandia glomerata*, Michx. [Hedyotis, Cand.] En Cuba existe esta especie, sin nombre vulgar. Además, se encuentran en esta última isla otros seis representantes del vasto género *Oldenlandia*, careciendo todos de nombre vulgar, son: *O. Haley*, A. Gray; *O. herbacea*, Cand.; *O. Callitrichoides*, Gris; *O. capillipes*, Gris; *O. species*, et var. [Hedyotis caerulea, Hook., var. patens, Ell.]; y *O. tuberosa*, Lamk. [Lucya, Cand.] De esas especies la única que hay en P. R. es la *O. herbacea*, Cand., dicha Yerba Oldenlandia, según Stahl.
- GRAJO. s. m. La *Eugenia tuberculata*, Cand?, Myrtacea silvestre.
- GRAMA. s. f. V. Sapé.
- GRAMA DE CABALLO. La *Rottboellia impressa*, Gris., Graminea silvestre.
- GRAMA DE CASTILLA. El *Panicum prostratum*, Lamk., Graminea silvestre.
- GRAMA DE PLAYA. El *Stenotaphrum Americanum*, Schrauk, Graminea indígena.
- GRAMA PINTADA. *Panicum colonum*, Lin.
- GRANA. s. f. Nombre borinqueño de la Palma real [V.].
- GRANADILLA. s. f. [P. R.] V. Pasionaria.
- GRANADILLA DE MONO. *Passiflora silvestre*, la *Passiflora Maliformis* Lin., Es la Parcha cimarrona de P. R.
- GRANADILLO. s. m. La *Brya Ebenus*, Cand., Leguminosa indígena.
- GRANADILLO DE COSTA. Verbenacea silvestre, el *Vitex Illicifolia*, Rich.
- GRANADO. s. m. [Cuba y P. R.] El *Punica Granatum*, Lin., Myrtacea cultivada. Presenta algunas variedades.
- GRANADO BLANCO. El *Hibiscus Syriacus*, Lin., Malvacea.
- GRANADO ENANO. Myrtacea cultivada, el *Punica nana*, Lin.
- GRASILLA. s. f. *Utricularia* endémica, *Pinguicula filifolia*, Wr.
- GREGRÉ. s. m. V. Gringuele.
- GRENGUÉ. [Pichardo.] Es el Gregué. [V. Gringuele.]
- GRÉNGUERE. [Pichardo.] Es el Gregré. [V. Gringuele.]
- GRILLO. [Fernández.] ?
- GRINGUELE. s. m. Malvacea indígena, el *Corchorus olitorius*, Lin., ó Gregré, Grengué y Grénguere.
- GROSELLA. s. f. Euphorbiacea cultivada, el *Phyllanthus acidissimus*, J. Müll. [*Cicca racemosa*, Lour.] En Cuba no se usa el término Grosellero [V.] para indicar toda la planta, sino indistintamente se denomina Grosella al fruto y al árbol que lo produce.
- GROSELLA CIMARRONA. Euphorbiacea silvestre, el *Phyllanthus grandifolius*, Lin.
- GROSELLERO. s. m. Cactea cultivada, la *Pereskia aculeata*, Mill. [V. Grosella.]
- GUABÁ. s. m. [P. R.] La *Inga vera*, Willd., Leguminosa silvestre, no cubana.

- GUABÁN.** El Cabo de hacha. [V. (Trichilia Spondioides, Sw.)]
- GUABANO.** s. m. [Fernández. ]?
- GUABICA.** s. f. V. Cirio.
- GUABICO DE SABANA.** s. f. V. Cirio. [Xylopia glabra, Lin.]
- GUACABACO.** Variedad del Boniato [V.]
- GUACACOA.** s. f. Dos Thymelæaceas indígenas reciben este nombre, son: la «Hargasseria Cubana, Rich.» [Daphnopsis? Cubensis, Meissner. Linodendron Cubense, Gris.]; y el Daphnopsis Guacacoa, Wr.
- GUACALOTE AMARILLO.** Leguminosa indígena, la Cæsalpinia Bonduc, Ait., variedad grande de semillas amarillas [Guilandina Bonduc, Lin.], ó Jayabo. La variedad chica de semillas grises se denomina Guacalote prieto. [Guilandina Bonducella, Lin.]
- GUACALOTE PRIETO.** V. Guacalote amarillo.
- GUACAMARÍ.** s. m. A dos Myrsineas indígenas se aplica tal nombre: la Wallenia Laurifolia, Sw.; y la Wallenia Clusiæfolia, Gris., ó Casmagua y Casmagua.
- GUACAMAYA.** s. f. 1) Leguminosa cultivada en Cuba y P. R., la Cæsalpinia pulcherrima, Sw. [Poinciana, Lin.]; nombrándose, además, Guacamaya nacional en Cuba y Clavellina [V.] en P. R. 2) El Amaranthus tricolor, Lin., ó Papagayo y Tricolor, Chenopodiacea india.
- GUACAMAYA DE COSTA.** La Cæsalpinia bijuga, Sw., Leguminosa silvestre, también llamada Campeche y Palo de Campeche [V.]
- GUACAMAYA FRANCESA.** Leguminosa silvestre, la Cassia alata, Lin., sobrenombrada Guajaba, Yerba de los empeines y Yerba de los herpes.
- GUACAMAYA NACIONAL.** V. Guacamaya.
- GUACAMAYÓN.** [Pichardo. ]?
- GUACANIJO.** s. m. El Phialanthus rigidus, Gris., Rubiaceae silvestre.
- GUACARAICA.** Nombre taino de una variedad de Boniato [V.]
- GUACARAYCA.** [Oviedo.] Es Guacaraica.
- GUÁCIMA.** s. f. La Guazuma Ulmi-folia, Lamk., dicha Guácima del Norte en P. R.; y la Guazuma tomentosa, Sw., ó Guácima común y Majagua macho, Malvaceas silvestres. La última especie se llama Guácima del Sur en P. R.
- GUÁCIMA AMARILLA.** V. Guácima varía.
- GUÁCIMA CEREZO.** V. Capulinas.
- GUÁCIMA COMÚN.** V. Guácima.
- GUÁCIMA DEL NORTE.** [P. R.] V. Guácima.
- GUÁCIMA DEL SUR.** [P. R.] V. Guácima.
- GUÁCIMA VARÍA.** Malvacea indígena, la Luhea platypetala, Rich., ó Guácima amarilla.
- GUACIMILLA.** s. f. La Prockia Crucis, Lid., Malvacea silvestre. También el Trichospermum Mexicanum, H. Bn [Belotia Grewiæfolia, Rich.], ó Majagüilla blanca y Majagüilla macho, planta de la misma fam. que la anterior. [V. Guacimilla cimarrona.]
- GUACIMILLA CIMARRONA.** Urticacea silvestre, la Trema species. [Sponia micrantha, Decsne, forma B; y forma D. (Sponia mollis, Decsne.)] Muchos le dicen simplemente Guacimilla [V.]
- GUACIMILLA DEL PINAR.** Samydea indígena, la Guidonia stipularis, G.-M. [Casearia stipularis, Vent.] En P. R. se le dice Gía verde y Rabojunco, siendo silvestre en esa isla la var.  $\beta$ , serrulata, G.-M. [Casearia serrulata, Sw. C. Ulmi-folia, Vahl.], sin nombre vulgar, y extraña á la Flora de Cuba.
- GUACO.** s. m. Dáse este nombre á las siguientes Compuestas silvestres: 1) Eupatorium Marquezia-

num, G.-M. [*Mikania mollis*, Kth.], cuya especie tengo el gusto de dedicar á mi distinguido amigo Don José de Jesús Márquez. 2) *Eupatorium Cowleyanum*, G.-M. & Molt [*Mikania gonoclada*, Cand., excluyendo var.  $\beta$ , ambigua, que es un *Eupatorium* no cubano.]; especie que dedicamos al Doctor Don Rafael Cowley. En P. R. le dicen también Guaco. 3) *Eupatorium crispiflorum*, Molt & G.-M. [*Mikania crispiflora*, Sauval. M. *Convolvulacea*, Gris., non Cand.]. 4) *Eupatorium reticulosum*, Molt & G.-M. [*Mikania reticulosa*, Sauval. M. *congesta*, Cand.?] En P. R. le dicen Falso guaco. 5) *Eupatorium* species. [*Mikania hastata*, Willd.] 6) *Eupatorium* species. [*Mikania Swartziana*, Gris.] 7) *Eupatorium Houstonis*, Sw. [*Mikania Trinitaria*, Cand.], ó Guaco de cabro en P. R. 8) *Eupatorium Orinocensis*, G.-M. [*Mikania Orinocensis*, Kth.]; también la var.  $\beta$  [*Mikania Batatæfolia*, Cand.], y la 9) [*Mikania Tamoides*, Cand.] 9) *Eupatorium Borregoianum*, G.-M. [\*]. [*Mikania Corydalifolia*, Gris.] 10) *Eupatorium* species [*Mikania Ranunculifolia*, Rich.], ó Guaquillo. En fin, Guaco es otro nombre, en la isla de la Trinidad, de nuestro Bejuco amargo [V.]. En P. R. se llama Guaco al *Eupatorium* species et var. [*Mikania Convolvulacea*, Cand., var.  $\beta$ , *Porto-Ricensis*.], no cubano.

GUACO DE CABRO. [P. R.] V. Guaco. [*Eupatorium Houstonis*, Sw.]

GUAEROS. [Pedro Martir de Anglería.]?

GUAGANAX. Variedad de Boniato [V.].

[\*] Esta especie es otra de las que clasifico con arreglo á las severas leyes de la Nomenclatura botánica. La dedico á mi muy querido amigo Don Indalecio Borrego.

GUAGUACÍ. s. m. 1) *Bixacea silvestre*, la *Lætia Tenstræmioides*, Gris. 2) *Samydea indígena*; la *Guidonia Lætioides*, G.-M. [*Zuelania Lætioides*, Rich. *Lætia longifolia*, Rich. *Zuelania crenata*, Gris. *Lætia crenata*, Rich. *Thiodia Lætioides*, Gris.]

GUAGÜÍ. s. m. Tal vez sea la *Colocasia Antiquorum*, Schott, var. *esculenta*, Schott. [V. *Malanga*.]

GUÁIMARA CLARA. [Fernández.]?

GUÁIMARO. [Sauvalle.]?

GUAIRAGE. s. m. La *Eugenia disticha*, Cand.?, y la *E. Baruensis*, Jacq. [*E. glabrata*, Cand. *E. monticola*, Cand.], *Myrtaceas silvestres*, dicha la última *Guairage macho*.

GUAIRAGE DE HOJAS OVALADAS. *Eugenia Buxifolia*, Willd. [*E. lateriflora*, Gris. *E. sessiliflora*, Rich.], *Myrtacea silvestre*.

GUAIRAGE DE SIERRA. El *Evonymus cuneifolius*, Gris. [*Euonymus*, Gris. *Maytenus*, Gris.], *Celastracea indígena*.

GUAIRAGE MACHO. V. *Guairage*.

GUAIRAJECILLO. s. m. *Myrtacea indígena*, la *Eugenia lineata*, Cand. [*E. Bergiana*, Gris.], ó *Guairajillo*.

GUAIRAJILLO. s. m. V. *Guairajecillo*.

GUAIRO SANTO DE COSTA. La *Egiphila elata*, Sw., *Verbenacea silvestre*. Otro nombre del Vergajo de toro? [*Heteropteris Laurifolia*, Juss.] [V. *Palo guitarra*.]

GUAJABA. s. f. V. *Guacamaya francesa*.

GUAJACA. s. f. La *Tillandsia fasciculata*, Sw., ó *Barba española*, *Bromeliacea silvestre*. [V. *Guajaquillo*.]

GUAJAQUILLO. s. m. *Tillandsia usneoides*, Lin. También se nombra *Barba española*. [V. *Guajaca*.]

GUAJEN. [?] V. *Guajey*.

GUAJEY. [Pichardo.]?, ó *Guajen*.

GUALLAMARA CLARA. [Fernández.]?

- GUALTERIA AMERICANA.** [P. R., según Stahl.] No es nombre vulgar. Es la Malva blanca [V.] en Cuba.
- GUAMÁ.** s. m. [P. R.] La Inga Laurina, Willd., Leguminosa silvestre, no cubana. [Cuba.] V. Guamá bobo y Majagua.
- GUAMÁ BOBO.** Leguminosa indígena, el *Lonchocarpus sericeus*, Kth, ó Guamá [V.].
- GUAMÁ CANDELÓN.** V. Guamá hediondo.
- GUAMÁ DE COSTA.** El *Lonchocarpus latifolius*, Kth, Leguminosa silvestre. Dícese, además, Guamá macho y, en P. R., se nombra Genogeno. [V. Palo hediondo.]
- GUAMÁ DE SAN BARTOLOMÉ.** Leguminosa endémica, el *Lonchocarpus Blainii*, Sauval.
- GUAMÁ DE SOGA.** [Fernández.] ?, ó Majagua de Cuba.
- GUAMÁ HEDIONDO.** Leguminosa silvestre, la *Piscidia erythrina*, Lin., ó Candelón y Guamá candelón.
- GUAMÁ MACHO.** V. Guamá de costa.
- GUAMACA.** [Fernández.] ?
- GUAMACILLO.** s. m. Leguminosa silvestre, la *Ateleia Cubensis*, Gris, [*Pterocarpus gummifer*, Rich.?] Se nombra, además, Guayacancillo bobo.
- GUAMAO.** [Fernández.]?, ó Guámaro.
- GUÁMARO.** V. Guamao.
- GUANA.** s. f. Dos *Thymeleaceas* silvestres reciben este nombre, son: la *Hargasseria Lagetta*, H. Bn [Lindendron Lagetta, Gris.]; y la *Hargasseria Aronifolia*, G.-M. [Lindendron Aronifolium, Gris.].
- GUANÁBANA.** s. f. La *Anona muricata*, Lin., var.  $\alpha$ , Dun.; de fruto agrio ó sub-ácido. Muchos escriben Guanávana. Esta var. es una *Anonacea* indígena. [V. Nabono.]
- GUANÁBANA AMARILLA.** V. Guanábana cimarrona.
- GUANÁBANA CIMARRONA.** La *Anona montana*, Macf. [A. muricata,  $\beta$ , Dum.] También se nombra Guánabana amarilla y Guanábana de loma.
- GUANÁBANA DE LOMA.** V. Guanábana cimarrona.
- GUANÁBANA DE PUERTO RICO.** La *Anona muricata*, Lin., var. *Borinquensis*, Moral.; de fruto azucarado ó dulce. Es indígena en P. R., cultivada en Cuba.
- GUANABANILLA.** s. f. La *Ouratea alternifolia*, G.-M. [*Gomphia*, Rich.] [V. Orilla de arroyo.] y la *Ouratea revoluta*, G.-M. [*Gomphia*, Wr.] *Ochnacea* endémicas.
- GUANABANILLA DE MONTE.** La *Ouratea nitida*, G.-M. [*Gomphia*, Sw.], *Ochnacea* silvestre, lo mismo que en P. R., donde carece de nombre vulgar, puesto que como tal no puede admitirse el de *Gonfia lustrata*.
- GUANABANILLA DE SABANA.** *Ouratea ilicifolia*, H. Bn [*Gomphia*, Cand.], *Ochnacea* silvestre.
- GUANABANILLA DEL PINAR.** La *Ouratea elliptica*, G.-M. [*Gomphia* elliptica, Rich., *Gomphia Pinetorum*, Wr.], *Ochnacea* endémica.
- GUANABIMA.** V. Nabima.
- GUANABONO.** V. Nabono.
- GUANAJAY.** [Fernández.] ?
- GUANANA.** [Bachiller.] ? Según *Brasseur de Bourbon*, también se dice *Uña*.
- GUANANAGAX.** Nombre taino de una variedad de Boniato. [V.].
- GUANANY.** [Fernández.] ?
- GUANARA.** [Bachiller.] ?
- GUANARAIBA.** Nombre taino del Mangle prieto [V.].
- GUANÁVANA.** V. Guanábana.
- GUANÁVANA AMARILLA.** V. Guanábana cimarrona.
- GUANÁVANA CIMARRONA.** V. Guanábana cimarrona.
- GUANÁVANA DE LOMA.** V. Guanábana cimarrona.
- GUANDÚ.** [Pezuela.] Es el Gandul.
- GUANDUL.** [Morales.] Es el Gandul.
- GUANTICHICHE.** s. m. V. Yuraguano.



- GUANICO DE SIERRA. [Fernández.] V. Palma ó Guanico de sierra.
- GUANINA. s. f. La *Cassia obtusifolia*, Lin., ó *Yerba hedionda* [V.]; y la *Cassia sericea*, Lin.; Leguminosas indígenas. Pichardo les dice Yerba guanina.
- GUANIQUEÍ. s. m. Phytolaccacea indígena, la *Rivina octandra*. Lin. [Trichostigma Rivinoides, Rich.], ó Bejuco canasta, Bejuco de canasta y Guaniquiquí.
- GUANIQUEQUE. s. m. Chenopodiacea indígena, la *Chamissoa altissima*, Kth. También la *Celosia argentea* Lin., de la misma familia.
- GUANIQUEQUÍ. s. m. V. Guaniquí.
- GUANO, s. m. V. Jata. [P. R.] Seibón botija [V.] en Cuba.
- GUANO BLANCO. *Thrinax argentea*, Mart., Palma indígena. Se le da, además, el nombre de Miraguano [V.]. Fernández le dice Palma ó Guano blanco y Palma *Thrinax argentea*, nombres erróneos.
- GUANO CANA DE MONTE. Palma indígena, el *Sabal Japa*, Sauval, ó Chagareta, Jaca, Japa y Palma cana de monte.
- GUANO DE COSTA. V. Palma ó Guano de costa.
- GUANO DE LANA. V. Miraguano de lana.
- GUANO ESPINOSO. V. Miraguano espinoso.
- GUANO PRIETO. V. Palma ó Guano prieto.
- GUAO. s. m. Dáse este nombre á las siguientes Anacardiaceas silvestres: *Comocladia dentata*, Jacq., y su var.  $\beta$ , propinqua [C. propinqua, Kth.]; C. platyphylla, Rich.; tal vez, además, C. glabra, Spreng., y C. intermedia, Wr.
- GUAO DE COSTA. Anacardiacea silvestre, el *Metopium Linnæi*, Engler. [Rhus *Metopium*, Lin. Rhus *Oxymetopium*, Gris.]
- GUAQUILLO. s. m. V. Guaco. [Eupatorium species. (*Mikania Ranunculifolia*, Rich.)]
- GUARÁ. s. f. *Cupania Americana*, Lin., Sapindacea de Cuba y P. R. En Cuba también se dice Guará á la *Cupania glabra*, Sw., y Guará ó Guará de costa á la *Cupania glabra*, Sw., var.  $\beta$ , multijuga, Gris.
- GUARÁ BEJUCO. V. Bejuco guará.
- GUARÁ COLORADA. V. Guará macho.
- GUARÁ DE COSTA. V. Guará. [*Cupania glabra*, Sw., var.  $\beta$ , multijuga, Gris.]
- GUARÁ MACHO. *Cupania Cubensis*, G.-M. & Molt. [C. macrophylla, Rich.] También se nombra Guará colorada y Guaraná. Esta especie tiene una var. cubana:  $\beta$ , Richardi, G.-M. [C. Juglandifolia, Rich., p. p. (hojas).]
- GUARACA. Nombre taino de una variedad de Boniato [V.].
- GUARACABUYA. s. f. V. Dibidibí. [*Casalpinia coriaria*, Willd.]
- GUARAGUAILLO. s. m. [P. R.] Meliaceas silvestres, no cubanas: la *Guarea humilis*, Bertero; y la *Guarea ramiflora*, Vent.
- GUARAGUAO. s. m. [P. R.] Meliacea silvestre, la *Guarea Trichilioides*, Lin. [G. Swartzii, Cand. p. p.] En Cuba no existe el tipo genuino de la especie, sino la var.  $\gamma$ , pallida, dicha Yamao.
- GUARAGÜEY. Variedad de Boniato [V.].
- GUARANÁ. s. f. V. Guará macho.
- GUAREMA. ?
- GUARUMA. s. f. Otro nombre de la *Yagrumia hembra* [V.].
- GUASA. ?
- GUASÁBARA. s. f. [P. R.] La *Eugenia tetrasperma*, Bello, Myrtacea endémica.
- GUÁSIMA. s. f. V. Guácima.
- GUÁSIMA AMARILLA. [Fernández.] V. *Malagueta brava*. [Morales.] V. *Guásima baría*.
- GUÁSIMA BARÍA. [Morales.] Este

- nombre y el de Guásima amarilla se aplican á la Malagueta brava [V, y también Guácima amarilla y Guácima varia.]
- GUÁSIMA BOBA. [Fernández.] ?
- GUÁSIMA DE CABALLO. [Fernández.] ?
- GUÁSIMA DE COSTA. [Fernández.] V. Guacimilla. [Prockia Crucis Lin.]
- GUASIMILLA. s. f. V. Guacimilla,
- GUATAMARA. s. f. V. Bálsamo Guatamara de Santa Marta.
- GUATAMARA DE SANTA MARTA. V. Bálsamo Guatamara de Santa Marta.
- GUATAPANÁ. s. m. V. Dibidibí. [Cæsalpinia pinnata, Sauval.]
- GUATEMALA. V. Bálsamo Guatamara de Santa Marta.
- GUAURO. s. m. V. Huevo de toro, bejuco.
- GUAYABA. s. f. [P. R.] V. Guayabo cotorrero.
- GUAYABA-PERA. [P. R.] V. Guayabo cotorrero.
- GUAYABACÓN. s. m. [P. R.] Myrtacea silvestre, no cubana, la Myrcia divaricata, Cand.
- GUAYABILLO. s. m. V. Cuero de hojas grandes. [P. R.] La Eugenia Pseudopsidium, Jacq., Myrtacea silvestre, no cubana.
- GUAYABILLO DE COSTA. [P. R.] Eugenia flavovirens, Berg. [Psidiumstrum dubium, Bello.], Myrtacea silvestre.
- GUAYABITO. s. m. V. Cuero de hojas grandes.
- GUAYABITO SAN ANTONIO. El Psidium parvifolium, Gris., ó Yaya cimarrona, Myrtacea silvestre.
- GUAYABO AGRIO. V. Guayabo cotorrero.
- GUAYABO COTORRERO. El Psidium Guayaba, Raddi, Myrtacea silvestre. Ofrece variedades conocidas vulgarmente por Guayabo agrio y Guayabo del Perú. En P. R. le dicen Guayaba y Guayaba-pera.
- GUAYABO DEL PERÚ. V. Guayabo cotorrero.
- GUAYABO DEL PINAR. Myrtacea silvestre, el Psidium Guayabita, Rich.
- GUAYACÁN. s. m. [Cuba y P. R.] El Guaiacum officinale, Lin., ó Palo santo, en Cuba. Es una Zygophyllea silvestre.
- GUAYACÁN BLANCO. [Fernández.] ?
- GUAYACÁN PRIETO. [Fernández.] El Guayacán.
- GUAYACANCILLO. s. m. [Cuba y P. R.] El Guaiacum Sanctum, Lin., Zygophyllea indígena.
- GUAYACANCILLO BOBO. V. Guamacillo.
- GUAYACANCILLO DE COSTA. La Behaimia Cubensis, Gris., Leguminosa silvestre.
- GUAYACANCILLO DE LOMA. V. Rascabarriga amarillo. [Genipa calophylla, G.-M.]
- GUÁYARA. V. Yuquilla de ratón.
- GUÁYARO. s. m. [P. R.] V. Name cimarrón.
- GUAYEYARO. [Pedro Mártir de Anglería.] ?
- GUÁYIGA. [Pichardo.] V. Guáyiya.
- GUÁYIYA. [Bachiller.] En Santo Domingo, nombre de la Yuquilla de ratón [V.]
- GUAYO. s. m. V. Yanilla.
- GUAYO AMARILLO. [Galtés.] [\*] V. Roble agalla.
- GUAYO BLANCO. [Galtés.] V. Roble blanco.
- GUAYO PRIETO. [Galtés.] V. Roble prieto.
- GUAZUMILLO. s. m. V. Hierro de costa, de sabanas.
- GUERRERO. s. m. [P. R.] El Eupatorium Dalea, Lin., [Critonia, Cand.], Compuesta silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- GUÍA ESPINOSA. [Colmeiro.] Es la Jía espinosa [V.]

[\*] Padre Pio Galtés Memoria sobre unos fósiles vegetales encontrados en el Chorrillo, Puerto Príncipe, 1887.

GUIABARA. s. f. V. Uvero.  
 GUIMBA. s. f. V. Cirio. [*Xylopia glabra*, Lin.]  
 GÜIMBA. s. f. V. Cirio.  
 GUIMGAMBÓ. s. m. [P. R.] V. Quimbombó.  
 Güiquí. [Fernández.] V. Árbol de la vida.  
 GÜIRA. s. f. V. Güira cimarrona.  
 GÜIRA CIMARRONA. *Crescentia cujete*, Lin., ó Güira y Totuma. Es una Gesneracea silvestre.  
 GÜIRA MACHO. Bignoniacea silvestre, el *Tanæcium parasiticum*, Sw. ? [Schlegelia brachyantha, Gris.]  
 GÜRITO. s. m. [Colmeiro.] *Solanum mammosum*, Lin. ? Solanea.  
 GÜRITO DE PASIÓN. *Passiflora silvestre*, la *Passiflora pedata*, Lin.  
 GÜIRO CIMARRÓN. Cucurbitacea cultivada, la *Lagenaria vulgaris*, Ser. En P. R. le dicen Candungo amargo y Marimbo.  
 GUISANTE. s. m. V. Chicharo.  
 GUISANTE DE OLOR. El *Lathyrus odoratus*, Lin. Leguminosa cultivada.  
 GUIZACILLO. s. m. Otro nombre de la *Triumfetta Grossulariæfolia*, Rich., ó Guizado bobo, Malvacea silvestre. El *Cenchrus Tribuloides*, Lin., ó Garrapata [?], Gramínea silvestre. [Sauvalle.] ?  
 GUIZAZO. s. m. El *Cenchrus viridis*, Spreng.; y el *Panicum Cruz-Galli*, Lin. [Oplismenus, Kth.]: Gramíneas silvestres. La *Triumfetta hispida*, Rich.; y la *T. semitriloba*, Lin.: Malvaceas indígenas. [V. Caddillo altea.]  
 GUIZAZO BOBO. V. Guizacillo.  
 GUIZAZO BRAVO. El *Cenchrus distichophyllus*, Gris., Gramínea silvestre.  
 GUIZAZO DE CABALLOS. V. Lampurda.  
 GUIZAZO DE COCHINO. La *Triumfetta rhomboidea*, Jacq., Malvacea silvestre.

GUNDA. s. f. [P. R.] V. Ñame cimarrón.

## H

HABÁ. s. m. Euphorbiacea silvestre, la *Hura crepitans*, Lin. También se denomina Habilla y Salvadera.  
 HABA DE CABALLO. [Bachiller.] ?  
 HABICHUELA. s. f. La legumbre verde del Frijol común.  
 HABICHUELA CHINA. ?  
 HABILLA. s. f. V. Habá.  
 HAIE. [Benzoni.] V. Age.  
 HAJE. [Dr Chanca.] V. Age.  
 HALEY. [Bachiller.] ?  
 HAMAMELINA. s. f. Derivado químico de la *Hamamelis Virginica*, Lin., ó Avellano de hechiceras; Witch-hazel de los norte-americanos. [V. Avellano de hechiceras y Hazelina.]  
 HAMAMELIS VIRGINICA. Nombre científico que empieza á vulgarizarse. Corresponde á una planta dicha vulgarmente Avellano de hechiceras. [V. y Hamamelina.]  
 HANÓN. [Gviedo.] V. Anón.  
 HATILO. s. m. La *Rondeletia angustata*, Sauval., ó Caobilla de sabana, de flor punzó. Es una Rubiacea endémica. [V. Encospe.]  
 HAYABACANÁ. s. f. La *Pera oppositifolia*, Gris., y la *P. Bumelifolia*, Gris. También se llaman Jayabacaná y Yayabacaná. Son Euphorbiaceas silvestres.  
 HAYAJABITO. [Bachiller.] V. Yaya-jabico.  
 HAZELINA. Anglicismo que debe evitarse usando el término Hamamelina. [V. y Avellano de hechiceras.]  
 HELECHO ACUÁTICO. La *Osmunda Regalis*, Lin., ó Helecho real.  
 HELECHO ÁRBOL. La *Cyathea arborea*, Smith, dicha, además, Palmera sin espinas. La *C. Serra*, Willd., Helecho gigante y Palme-

- ra erizada. La *Hemitelia horrida*, R. Br. La *Alsophila aspera*, R. Br., ó Helecho árbol, espinoso. Son *Cyatheaceas* silvestres.
- HELECHO ÁRBOL, ESPINOSO.** V. Helecho árbol.
- HELECHO ÁRBOL, LUSTROSO.** *Alsophila nitens*, J. Sm., ó Helecho liso.
- HELECHO ESPINOSO.** La *Hemitelia calolepis*, Hook., *Cyatheacea* silvestre.
- HELECHO GIGANTE.** V. Helecho árbol.
- HELECHO HEMBRA.** El *Pteris Aquilina*, Lin., y el *Asplenium Filix-Fœmina*, Bernh.
- HELECHO LISO.** V. Helecho árbol, lustroso.
- HELECHO REAL.** V. Helecho acuático.
- HELIOTROPIO DE OLOR DE VAINILLA.** V. Vainilla.
- HENEQUÉN.** [Bachiller.] V. Pita.
- HENQUÉN.** s. m. V. Pita.
- HENNÉ.** s. m. V. Resedá francesa.
- HEPÁTICA DE LAS FUENTES.** *Marchantiacea* naturalizada, la *Marchantia polymorpha*, Lin.
- HÉRCULES.** s. m. [Pichardo.] En Bayamo el Mar Pacífico [V.]
- HERMOSA RAQUEL.** [Coloma.] V. Raquel.
- HI.** [Bachiller.] V. Flor de la Y.
- HIBISCO BLANCO.** Dáse este nombre, y el de *Majagüilla* blanca [V.], á una *Malvacea* silvestre, el *Hibiscus Sosorius*, Lin.
- HIBISCO DE COSTA.** El *Hibiscus cryptocarpus*, Rich., también denominado *Majagüilla* de costa.
- HIBISCO DE LAGUNA.** Con este trivial, y los de *Hibisco* del pinar y *Majagüilla* del pinar, se conoce el *Hibiscus bifurcatus*, Cav., *Malvacea* silvestre.
- HIBISCO DE SABANA.** El *Hibiscus costatus*, Rich.
- HIBISCO DEL PINAR.** V. *Hibisco* de laguna.
- HIBISCO SILVESTRE.** El *Hibiscus Bancroftianus*, Macf.
- HICACO.** s. m. [Pichardo.] El *Chrysobalanus Icaco*, Lin., *Rosacea* indígena. Recibe, además, los nombres de *Hicaco* de costa, *H.* de playa, *H.* dulce, *Icaco*, *I.* de costa y *Jicaco*. En P. R. se dice *Icaco*.
- HICACO CIMARRÓN.** [Pichardo.] ?
- HICACO DE AURA.** Se aplica este nombre á tres *Rosaceas* indígenas, que son: 1) El *Chrysobalanus mollicomia*, G.-M. [Hirtella, Kth.], dicha también *Hicaco* negro, *H.* peludo, *H.* prieto, *Icaco* de aura, *I.* negro, *I.* peludo, *I.* prieto y *Palo mulato*; 2) El *Chrysobalanus triandra*, Moral. [Hirtella, Sw.], ó *Teta* de yegua, *Icaco* de aura ó *Hicaquillo* peludo; en P. R. *Teta* de burra [V.]; 3) El *Chrysobalanus Americana*, Moral. [Hirtella, Aubl.], ó *Teta* de yegua, *Icaco* de aura y *Siguapa* [V.].
- HICACO DE COSTA.** [Morales.] V. *Hicaco*.
- HICACO DE MONTAÑA.** El *Chrysobalanus montana*, G. M. [Parinarium, Aubl.], *Rosacea* cultivada.
- HICACO DE PLAYA.** [Morales.] V. *Hicaco*.
- HICACO DULCE.** [Morales.] V. *Hicaco*.
- HICACO NEGRO.** V. *Hicaco* de aura.
- HICACO PELUDO.** V. *Hicaco* de aura.
- HICACO PRIETO.** V. *Hicaco* de aura.
- HICAQUILLO.** s. m. El *Chrysobalanus incana*, G.-M. [Licania, Aubl.], ó *Icaquillo*, *Rosacea* cultivada. También el *Chione elliptica*, Gris., igualmente dicho *Icaquillo*, *Rubiacea* indígena.
- HICAQUILLO DE LAS POZAS.** La *Quina ternatiflora*, Sauval, ó *Icaquillo* de las Pozas, *Clusiacea* endémica.
- HICAQUILLO PELUDO.** [Morales.] V. *Hicaco* de aura.
- HICKORY.** s. m. Nombre de una planta no existente en Cuba[?], la

- Carya alba*, Nutt., Juglandea norteamericana, cuya madera se emplea en esta isla para diversos usos, especialmente en la confección de bastones para el estudio de la esgrima.
- HIEL DE PERRO.** V. Oviedo amarillo.
- HIERRO DE COSTA.** La *Cordia erythrocoeca*, Wr.; la *C. pedunculosa*, Wr.; la *Beurreria divaricata*, G. Don; Boragineas silvestres. [V. Vomitel blanco.]
- HIERRO DE COSTA, DE SABANA.** Boraginea silvestre, la *Beurreria virgata*, G. Don [Ehretia virgata, Sw.], ó Guazumillo.
- HIERRO DE SABANAS, DE HOJAS MENUDAS.** La *Beurreria Cassinefolia*, Gris., ó Capa rota.
- HIERRO DEL PINAR.** *Miconia species* [Pachyanthus Cubensis, Rich.], Melastomacea endémica.
- HIERRO PELUDO.** La *Beurreria tomentosa*, G. Don, Boraginea silvestre.
- HIGO.** s. m. V. Higuera.
- HIGÓN.** s. m. El *Ficus dimidiata*, Gris., conocido además por Jagüey hembra [V.] y también por Higuerón [V.]. Es una Urticacea silvestre.
- HIGUERA.** s. f. Urticacea cultivada: *Ficus Carica*, Lin. Los receptáculos fructíferos constituyen los llamados Higos.
- HIGUERETA.** s. f. V. Palma-Christi.
- HIGUERETA DEL INFIERNO.** V. Palma-Christi.
- HIGUERETA INFERNAL.** V. Palma-Christi.
- HIGUERÓN.** s. m. V. Higón y Jagüecillo.
- HIMINÍ.** [Bachiller.] Nombre indígena del Aguinaldo blanco [V.]. [Ipomæa Sidæfolia, Choisy.] También se dice Jiminí.
- HINOJO.** s. m. El *Baccharis Scoparioides*, Gris., Compuesta silvestre.
- HINOJO COMÚN.** El *Foeniculum vulgare*, Gært., Umbellifera cultivada.
- HINOJO DE SABANA.** El *Eupatorium Foeniculaceum*, Willd., Compuesta silvestre.
- HIQUÍ.** [Bachiller.] V. Jiquí.
- HIRACA.** s. f. V. Bombonaxa.
- HOAJACÁN.** V. Guayacán.
- HOAXACÁN.** V. Guayacán.
- HOBOS.** [Bachiller.] Una variedad de Boniato. [V. Jobo.]
- HOJA.** [Fernández.]?
- HOJA BRUJA.** V. Prodigiosa.
- HOJA DE COCUYO.** Otro nombre del Cocuyo de fruto chico [V.], en su sinónimo *Bumelia nigra*, Sw.
- HOJA GRANDE.** *Anthurium acaule*, Schott, Aroidea.
- HOJA MENUDA.** [Fernández.]? [P. R.] V. Birijí.
- HOJA PURPURINA.**?
- HORTENSIA.** s. f. Planta cultivada la *Hydrangea Hortensia*, Cand.
- HUCA.** V. Yuca agria.
- HUCAR.** V. Júcaro.
- HUERTEA.** s. f. La *Huertea glandulosa*, R. & Pav. [H. Cubensis, Gris.], Sapindacea silvestre, lo mismo que en el Perú, donde fué recogido el tipo de la especie.
- HUESILLO.** [Fernández.]?
- HUESO.** s. m. Dos Euphorbiaceas indígenas llevan este nombre: el *Drypetes latifolia*, J. Müll.; y el *D. incurva*, J. Müll., ó Maco.
- HUESO DE COSTA.** *Drypetes mucronata*, Wr., Euphorbiacea endémica. *Xylosma Buxifolium*, A. Gray; X. *Shaefferioides*, Gris.; Bixaceas.
- HUESO DE TORTUGA.** [Fernández.]?
- HUESO ESPINOSO.** La *Xylosma infestum*, Gris., Bixacea silvestre.
- HUEVO DE GALLO.** Dáse tal nombre á la *Passiflora pallida*, Lin. [P. minima, Lin. P. angustifolia, Sw. P. Warei, Nutt. P. suberosa, Lin. P. Hederacea, Cav. P. lineariloba, Hook.], Passiflorea silvestre, conocida también por Pasionaria de cerca [V.] y Huevo de gato. En P. R. dicha especie se nombra Pareha angosta, Pareha pálida y



- Parcha yedra. [V. Pendanga.] También se llama Huevo de gallo á la Tabernemontana Citrifolia, Lin. ó Pegojo, Apocynæa silvestre.
- HUEVO DE GATO. V. Huevo de gallo. [P. R.] V. Majaguilla de costa.
- HUEVO DE PERRO. La Erithalis rotundata, Gris., ó Víbona [V.], Rubiacea silvestre.
- HUEVO DE TORO. La Rauwolfia nitida, Lin., Apocynæa silvestre.
- HUEVO DE TORO, BEJUCO. La Fischeria? scandens, Cand., ó Curamagüey de costa [V.] y Guauero. Es una Asclepiadæa silvestre.
- HULE. V. Olí.
- HUMO. s. m. V. Limón café.
- HUMO DE SABANA. El Pithecolobium obovale, Sauval, Leguminosa silvestre. También se dice Cenizo [V.].
- HUMO ESPINOSO. Pithecolobium Lentiseifolium, Sauval.
- HUMUS. [Fernández.]?
- HYENS. El Jugo de la Yuca agria [V.], [V. Naiboa.]

## I

- IAYAJABICO. s. m. [P. R.] El Erithalis fruticosa, Lin., Rubiacea silvestre, dicha Jayajabico [V.] ó Yaya-jabico en Cuba.
- ICACO. [Sauvalle.] V. Hicaco.
- ICACO DE AURA. [Sauvalle.] V. Hicaco de aura.
- ICACO DE COSTA. [Fernández.] V. Hicaco.
- ICACO DE MONTAÑA. [Fernández.] V. Hicaco de montaña.
- ICACO NEGRO. [Fernández.] V. Hicaco de aura. [Chrysobalanus mollicoma, G.-M.]
- ICACO PELUDO. [Sauvalle.] V. Hicaco de aura. [Chrysobalanus mollicoma, G.-M.]
- ICACO PRIETO. [Sauvalle.] V. Hicaco de aura.
- ICAQUILLO. [Fernández.] V. Hicacillo. [Chrysobalanus incana, G.-

- M.] [Sauvalle.] V. Hicacillo. [Chione elliptica, Gris.]
- ICAQUILLO DE LAS POZAS. [Sauvalle.] V. Hicacillo de las Pozas.
- ICICA COPAL. [Fernández.] V. Copal. [Protium Guainense, March.]
- INCIENSO. [Fernández.] El Amyris saussa, Brus., ó Cuabilla [V.] é Incienso de costa. [Pichardo.]? [V. Palo de incienso.]
- INCIENSO-AJENJO. [Pichardo.] V. Ajenjo.
- INCIENSO DE CARACAS. Compuesta cultivada, el Libanothamnus Nerriifolius, Ernst., [Clitbadium, Cand.]
- INCIENSO DE COSTA. V. Incienso.
- INCIENSO DE PLAYA. V. Balsamillo.
- INCIENSO MARINO. [Pichardo.] V. Balsamillo.
- INGA. s. f. Leguminosa indígena, el Pithecolobium Calliandræflorum, Wr.
- INGERTO. s. m. Loranthacea silvestre, el Phoradendron latifolium, Gris.
- INMORTAL. s. f. V. Eterna, Prodigiosa y San Diego.
- INMORTAL DE AUSTRALIA. V. Eterna de Australia.
- IPECACUANA CIMARRONA. El Cephalis muscosa, Cand., Rubiacea. Hoy es una Urugoga.
- IPECACUANA DE MÉJICO. Violacea silvestre, el Ionidium strictum, Vent.
- ITAMO. V. Dúctamo real.
- ITAMO REAL. V. Dúctamo real.
- ITAPEX. Nombre indo-americano, probablemente de una variedad de la Yuca agria.
- IXORA. s. f. Rubiacea cultivada, la Ixora odorata, Hook.

## J

- JABÍ. s. m. Otro nombre de la Quebra-hacha [V.]
- JABILLA. s. f. Dáse este nombre y el de Sécua á la Feuillea cordifo-

- lia, Sw., Cucurbitacea silvestre. Es la Pepita amarga de P. R.
- JABONCILLO. s. m. El Sapindus Saponaria, Lin., Sapindacea silvestre. En P. R. esa especie y el Sapindus inæqualis, Cand., dudoso en Cuba. En algunos puntos de esta isla dicen Jaboncillo á un Estropajo [V.]. [Luffa acutangula, Roxb.,]
- JABONCILLO BEJUCO. V. Bejuco leñatero.
- JABORANDI. s. m. Rutacea cultivada, el Pilocarpus pinnatifolius, Lem. Sus hojas encierran un alcaloide, dicho Pilocarpina—C<sup>11</sup> H<sup>16</sup> Az<sup>2</sup> O<sup>2</sup>—muy empleado modernamente. El único ejemplar que, hasta la fecha, se cultiva en Cuba existe en el Jardín Botánico, donde fué llevado por el Doctor Don Rafael Cowley.
- JACA. s. f. V. Guano cana de monte.
- JACINTO. s. m. El Hyacinthus Orientalis, Lin., Liliacea cultivada. Recibe, además, el nombre de Jacinto legítimo, y, en España, el de Bretaña.
- JACINTO DEL PERÚ. La Scilla Peruviana, Lin., planta cultivada.
- JACINTO LEGÍTIMO. V. Jacinto.
- JAGUA. s. f. [Cuba y P. R.] Rubiacea silvestre, la Genipa Americana. [V. Jagüilla.]
- JAGUA AMARILLA. V. Pera de la mar.
- JAGUA DE COSTA. V. Pera de la mar.
- JAGUA-JAGÜITO. V. Jagua-yagüita.
- JAGUA-YAGÜITA. Otro nombre de la Agalla [V.]. [Beurreria calophylla, Gris.], ó Jagua-jagüito.
- JAGÜECILLO. s. m. El Ficus pertusa, Lin., Urticacea silvestre, dicha también Jagüey hembra [V.] ó Higuierón [V.].
- JAGÜEY. s. m. Urticacea endémica, el Ficus membranacea, Sauval.
- JAGÜEY HEMBRA. V. Higuierón, Jagüecillo y Pinipini.
- JAGÜEY MACHO. Urticacea indígena, el Ficus crassinervia, Desf., ó Gagüey.
- JAGÜILLA. s. f. La Genipa caruto, Kth, Rubiacea silvestre, sobrenombrada Jagua [V.].
- JAIMIQUI. s. m. Sapotea endémica, el Mimusops Jaimiqui, Wr.
- JAIREL. s. m. La Mucuna urens, Cand., Leguminosa silvestre. También le dicen Bejuco jaiREL, Ojo de borrico y Ojo de buey.
- JAMAGUEY. s. m. La Belairia mucronata, Gris., Leguminosa silvestre. Otros le llaman Jamaquey y Yamaquey.
- JAMAGUEY DE LOMA. La Belairia spinosa, Rich., ó Alfiler y Jamaquey de loma.
- JAMAGUEY DE TRES HOJAS. Leguminosa indígena, la Pictetia ternata, Cand., ó Jamaquey de tres hojas y Yamaquey de tres hojas.
- JAMAQUEY. V. Jamaquey.
- JAMAQUEY DE LOMA. V. Jamaquey de loma.
- JAMAQUEY DE TRES HOJAS. V. Jamaquey de tres hojas.
- JAMASÍ. [Fernández.]?
- JAPA. s. f. V. Guano cana de monte.
- JARAGUA. s. f. Nombre de dos Rubiaceas indígenas: el Phialanthus stillans, Gris.; y el P. Myrtilloides, Gris. Cerca de estas especies se coloca otra Rubiacea endémica y sin nombre: el Ceratopyxis Verbenacea, Hook. f. [Rondeletia? Verbenacea, Gris. Phialanthus spicatus, Sauval.]
- JARDINES. V. Madama.
- JATA. s. f. Palma indígena, la Copernicia hospita, Mart., ó Guano.
- JATA DE GUANABACOA. Copernicia macroglossa, Gris. & Wendl.
- JAYABACANÁ. s. f. V. Hayabacaná.
- JAYABITO. [Pezuela.] V. Jayajabico.
- JAYABO. s. m. V. Guacalote amarillo.
- JAYAJABICO. s. m. Dos Rhamneas indígenas llevan este nombre: la Colubrina reclinata, Brongn., ó Bijáguara [V. y Mabí.]; y la C. acu-

- minata, Gris. Además, se dice Jayajabico y Yayajabico á dos Rubiaceas silvestres: el *Erithalis fruticosa*, Lin. [V. *Jayajabico*.]; y el *E. angustifolia*, Cand. Pezuela les dice Jayabito.
- JAZMÍN AMARILLO.** *Jasminum revolutum*, Sims, Oleacea cultivada.
- JAZMÍN AZUL.** V. *Velesa*.
- JAZMÍN CAFÉ.** El *Jasminum gracile*, Andr., Oleacea cultivada.
- JAZMÍN DE ARABIA.** V. *Diamela*.
- JAZMÍN DE DÍA.** En Santiago de Cuba, el Galán de día.
- JAZMÍN DE ESPAÑA.** Oleacea introducida, abundante en jardines y huertas, de donde escapada se ha hecho silvestre. Es el *Jasminum pubescens*, Willd. [V. *Jazmín de Francia* y *Jazmín de la tierra*.]
- JAZMÍN DE FRANCIA.** Oleacea introducida y no tan abundante como la *Diamela* [V.]. Es el *Jasminum Sambac*, Ait., variedad  $\alpha$ , *verum*, Cand. Esta variedad es realmente el tránsito entre la especie *J. Sambac*, Ait. y la *J. pubescens*, Willd., ó *Jazmín de España* [V.].
- JAZMÍN DE ITALIA.** El *Solanum Bolboense*, A. Cand., *Solanea* silvestre; y el *S. Jasminoides*, Paxt., cultivada.
- JAZMÍN DE NOCHE.** En Santiago de Cuba, el Galán de noche.
- JAZMÍN DE LA TIERRA.** *Apocynaea* silvestre, la *Allamanda cathartica*, Lin., ó *Barbero* y *Flor de barbero*. Oleacea introducida, abundante en los jardines: el *Jasminum grandiflorum*, Lin., ó *Jazmín oloroso* y *Jazmín de España* [V.].
- JAZMÍN DE LAS AZORES.** Oleacea introducida, el *Jasminum Azoricum*, Lin.
- JAZMÍN DEL CABO.** Rubiaceae cultivada, *Genipa speciosa*. [Gardenia florida, Lin.] También se le dice *Gardenia*.
- JAZMÍN TROMPETA.** Bignoniaceae silvestre, el *Tecoma radicans*, Juss.
- JAZMÍN CILLO.** V. *Mala-cara*.
- JENGIBRE.** V. *Gengibre*.
- JENQUÉN.** Mala pronunciación de *Heniquén*. [V. *Pita*.]
- JEQUÍ ESPINOSO.** V. *Sapote espinoso*.
- JEQUICILLO DE COSTA.** [Sauvalle.]?
- JEQUIRITY.** Nombre brasileño, algo usado entre los médicos habaneros, de la *Peonía* de *Saint-Thomas* [V.].
- JERINGUILLA.** s. f. V. *Celinda*.
- JÍA.** s. f. V. *Catesbaea*.
- JÍA BLANCA.** *Samydea* indígena, la *Guidonia alba*, G.-M. [Casearia, Rich.]
- JÍA BRAVA.** *Samydea* indígena, la *Guidonia ramiflora*, G.-M. [Casearia, Vahl.] En P. R. le dicen *Cambrón*.
- JÍA DE FLOR GRANDE.** *Samydea* endémica, la *Samyda grandiflora*, Gris.
- JÍA ESPINOSA.** Euphorbiaceae indígena, la *Ricinella pedunculosa*, J. Müll. [Adelia *Ricinella*, Lin.], ó *Jía macho*.
- JÍA MACHO.** V. *Jía espinosa*.
- JÍA MANZANILLO.** Olacinea silvestre, la *Ximenea Americana*, Lin., ó *Ciruelo cimarrón* y *Yaná*. [V. *Ababuy*.]
- JÍA PELUDA.** La *Guidonia hirta*, G.-M. [Casearia, Sw.], *Samydea* indígena.
- JÍA PRIETA.** *Samydea* indígena, la *Guidonia spinescens*, Gris. [Casearia, Gris.]
- JÍA SIN HOJAS.** La *Catesbaea Phyllacantha*, Gris., Rubiaceae silvestre.
- JIBÁ.** s. m. El *Erythroxyllon alternifolium*, Rich.; el *E. obtusum*, Cand.; el *E. lineolatum*, Cand.; y el *E. Havanense*, Jacq.: Linaceas silvestres. [P. R.] El *E. brevipes*, Cand., común á Cuba, donde no tiene nombre vulgar; el *E. obtusum*, Cand. [E. *Havanense*, Kth.]; y tal vez el *E. obovatum*, Macf., que nombrado en Cuba Arabo colorado [V.].

- JICACO.** Pronunciación defectuosa de Hicaco [V].
- JÍCAMA.** s. f. [P. R.] V. Jícama cimarrona.
- JÍCAMA CIMARRONA.** El *Calopogonium caruleum*, Benth., Leguminosa silvestre, como en P. R., donde le dicen Jícama.
- JÍCAMA DULCE.** El *Pachyrhizus angulatus*, Rich., Leguminosa indígena. Es dicho Frijolillo de ñame en P. R.
- JICAQUILLO.** Pronunciación defectuosa de Hicaquillo [V].
- JIGÜE.** s. m. V. Sábicu.
- JIGÜF.** [Richard.] V. Cocuyo de fruto chico.
- JIJIRÁ.** s. m. Cactea indígena, el *Cereus pellucidus*, Pfeiff.
- JIJÓN.** [Fernández.]?
- JIMINÍ.** V. Himiní.
- JIPIJAPA.** s. f. Paja procedente de la Bombonaxa [V], y que sirve para fabricar los sombreros de Panamá ó de Jipijapa.
- JÍQUÍ ESPINOSO.** V. Sapote espinoso.
- JIQUELETE.** s. m. Chenopodiacea silvestre, el *Iresine flavescens*, Moq. [V. Añil cimarrón.]
- JIRASOL.** Ortografía errónea de Girasol [V].
- JOBILLO.** s. m. [P. R.] El *Triceros paniculata*, G.-M. [Turpinia, Vent.], Sapindacea extraña á la Flora de Cuba.
- JOBO.** s. m. Anacardiacea silvestre: la *Spondias lutea*, Lin. [S. graveolens, Macf.], ó Ciruela agria, Ciruela amarilla y Ciruela loca. [V. Citero.]
- JOBO DE ÁFRICA.** [Jardín Botánico.] Verbenacea cultivada, la *Gmelina arborea*, Roxb. Probablemente esta especie ó la llamada Jobo de Asia [V.] es en realidad la *Gmelina parvifolia*, Roxb.
- JOBO DE ASIA.** [Jardín Botánico.] Verbenacea cultivada, la *Gmelina Asiatica*, Roxb. [V. Jobo de Africa.]
- JOCUMA AMARILLA.** El *Dipholis salicifolia*, A. Cand. Dícese igualmente Carolina y Cuyá. Es una Sapotea indígena. [V. Ébano amarillo.]
- JOCUMA BLANCA.** [Fernández.] Es el *Jocuma prieto*.
- JOCUMA PRIETO.** [Fernández.] V. Ébano amarillo. [*Sideroxylon Mastichodendron*, Jacq.]
- JUAN CALIENTE.** [P. R.] Nombre de dos *Connareas* silvestres, la *Rourea glabra*, Kth, dicha Mata negro [V.] en Cuba; y la *Rourea frutescens*, Aubl., sin nombre vulgar cubano.
- JUAN DE LA CRUZ.** [Fernández.]?
- JUANITA.** s. f. V. Narciso poético.
- JUBABÁN.** s. m. V. Cabo de hacha.
- JUBÍ.** [Fernández.] Errata de Jabí [V].
- JÚCARO AMARILLO.** La *Terminalia capitata*, Sauval., Combretacea indígena.
- JÚCARO BRAVO.** V. Júcaro espinoso.
- JÚCARO DE PLAYA.** Combretacea silvestre, la *Terminalia Buceras*, H. Bn [Bucida Buceras, Lin., Bucida angustifolia, Cand.], ó Arará.
- JÚCARO ESPINOSO.** *Terminalia Molinei*, G.-M. [Bucida angustifolia Rich., non Cand. *Terminalia angustifolia*, Sauval., non Jacq.], Combretacea silvestre, dicha, además, Arará de hojas angostas, Júcaro bravo y Júcaro prieto.
- JÚCARO PRIETO.** V. Júcaro espinoso.
- JUDÍA COMÚN.** V. Frijol común.
- JUDÍA DE CARETA.** V. Frijol de carita.
- JÚJANO.** s. m. V. Café cimarrón. [Cousseara odoratissima, G.-M.]
- JULIANA.** s. f. Crucifera cultivada, el *Hesperis Matronalis*, Lin., ó Juliana común, y, en España, más que en Cuba, Matronal.
- JULIANA COMÚN.** V. Juliana.
- JUNCO.** s. m. Única Juncacea silvestre, el *Juncus repens*, Michx. Cyperacea silvestre, el *Scirpus Plantagineus*, Sw.

**JUNCO AMARILLO.** Nombre más propio que el de Junco marino [V.]?  
**JUNCO MARINO.** [?] V. Espinillo, Junco amarillo y Palo de rayo.  
**JÚPITER.** s. m. Lythracea china, la Lagerstroemia Indica, Lin. Se cultiva en Cuba, lo mismo que en P. R., donde le dicen Astromeda.  
**JURABÁINA.** s. f. La Gliciridia platycarpa, ó Cucharillo y Frijolillo.  
**JUSTICIA.** s. f. Acanthacea cultivada, la Justicia Adhatoda, Lin. ?

## K

**KARATA.** [Bachiller.] Nombre taino de la Piñuela. [Karatás species.] No es, pues, el Maguey.  
**KOLA.** V. Cola.  
**KOUSO.** Órganos de la Hagenia Abyssinica, Willd., planta desconocida en Cuba.

## L

**LACRÉ.** s. m. [Fernández.] Hypericaceae cultivada, la Vismia Guianensis, Pers. Suministra una goma-resina dicha goma-gutta de América ó Gomo-resina gutta de América. Los brasileños llaman al árbol Pao de lacre.  
**LAGAÑA DE AURA.** Aplícase este nombre á cuatro Compuestas indígenas: la Vernonia Hieracioides, Gris, ó Rompezaragüelles morado; la V. Sagraana, Cand.; la V. remotiflora, Rich., ó Rompezaragüelles y Rompezaragüey, dicho Tapa-camino [V.] en P. R.; y la V. membranacea, Gris, llamado también Rompezaragüelles y Rompezaragüey.  
**LAGAÑA DE AURA, DE PAREDÓN.** Vernonia inaequiserrata, Schult.  
**LÁGRIMAS DE AMOR.** La Russellia juncea, Zucc., Scrophularinea cultivada, también llamada Lágrimas de Júpiter.

**LÁGRIMAS DE JOB.** El Coix lachryma, Lin., ó Lágrimas de Moisés, Graminea cultivada.  
**LÁGRIMAS DE JÚPITER.** V. Lágrimas de amor.  
**LÁGRIMAS DE MOISÉS.** V. Lágrimas de Job.  
**LAIRÉN.** V. Yerén.  
**LAMBE-LAMBE.** [Pichardo.]?, ó Lame-lame.  
**LAME-LAME.** V. Lambe-lambe.  
**LAMINARIA DIGITADA.** Planta solamente conocida en Cuba preparada para usos médicos, sobre todo en Tocología. Es la Laminaria digitata, Lamour, Alga.  
**LAMPURDA.** s. f. El Xanthium strumarium, Lin. Compuesta dicha también Guizado de caballos.  
**LANERO.** s. m. V. Seibón botija.  
**LANILLA BLANCA.** [Fernández.]?  
**LANILLA PRIETA.** [Fernández.]?  
**LANUDO.** [Fernández.]?  
**LATANIA.** [?] Nombre poco aceptable de una Palma cultivada, la Livistona Australis, R. Br.  
**LAUREL.** s. m. Laurinea endémica, el Acroclidium Wrightii, Meissner.  
**LAUREL BLANCO.** V. Leviza.  
**LAUREL BLANCO DE CUBA.** V. Leviza.  
**LAUREL CANELERO.** V. Canelero.  
**LAUREL COMÚN.** Laurinea cultivada, el Laurus nobilis, Lin.  
**LAUREL DE CUABAL.** Anonacea silvestre, la Anona bullata, Rich., ó Anoncillo [V].  
**LAUREL DE LOMA.** La Beilschmiedia pendula, G. - M. [Hufelandia, Nees.]  
**LAUREL DE SABANA.** V. Anoncillo de Cuba.  
**LAUREL DE LA INDIA.** Urticaceae cultivada, el Ficus religiosa, Lin., ó Álamo-jagüey.  
**LAUREL PICO DE GALLO.** V. Cirio.  
**LAUREL SÁSAFRÁS.** [Fernández.] V. Cuabá blanca.  
**LAYA.** [Fernández.]?



- LEBISA.** Nombre erróneo. [V. Levisa.]
- LEBIZA.** Nombre erróneo. [V. Levisa.]
- LEBRERO.** s. m. La Mouriria Valenzuelana, Gris, ó Palo torcido, Mano de pilón y Yaya macho. Le dicen también Mastuerzo [? V.]. Es una Melastomacea silvestre.
- LECHE DE VÉNUS.** [Pichardo.] Nombre de la variedad albiflora del *Hibiscus Rosa-Sinensis*, Lin. [V. Mar-Pacífico.]
- LECHERA.** s. f. La *Euphorbia serpens*, Kth, ó Yerba lechera [V.], Euphorbiacea silvestre.
- LECHERA MARINA.** La *Euphorbia trichotoma*, Kth, Euphorbiacea silvestre.
- LECHERO.** s. m. Euphorbiacea silvestre, la *Excacaria Lautocerasus*, J. Müll. [V. Palo de leche.]
- LECHOSA.** s. f. Euphorbiacea silvestre, la *Euphorbia heterophylla*, Lin. [P. R.] La Papaya [V.] de Cuba.
- LECHOSO.** s. m. V. Palo lechoso.
- LECHUGA.** s. f. [Fernández.] Es el Piñipiñi.
- LECHUGA ARREPOLLADA.** La *Lactuca capitata*, Cand., Compuesta cultivada. La hay blanca y morada.
- LECHUGA CIMARRONA.** La *Pistia Occidentalis*, Blume [P. commutata, Schleiden.], Aroidea silvestre. Se le dice también Lechuguilla.
- LECHUGUILLA.** s. f. V. Lechuga cimarrona.
- LECHUGUILLA DE AGUA.** La *Salvinia hispida*, Kth, Salviniacea indígena.
- LEGÍA.** [Fernández.] ?
- LEGUMBRE.** s. f. Vulgarmente designa las hojas de muchas plantas alimenticias; científicamente es el nombre de una suerte de fruto, característico de la familia de las Leguminosas: cuando adquiere un gran desarrollo, como en el *Flamboyant*, se dice Vaina.
- LEMONIA.** s. f. Rutacea silvestre, la *Ravenia spectabilis*, Planch.
- LENGUA DE LOBO.** [Pichardo.] V. Pepú.
- LENGUA DE VACA.** Nombre vulgar de las siguientes plantas: 1) *Ixora floribunda*, Gris; 2) *Ixora ferrea*, Benth., llamada Palo de hierro [V.] en P. R., y perteneciente á la fam. Rubiaceas; 3) Diversas especies del género *Psychotria*, hoy día incluido en el vasto género *Urugga*. Entre esas especies merecen citarse la *Psychotria coronata*, Gris, ó Taburete, y la *Psychotria costivenia*, Gris; todas son Rubiaceas, se nombran además Tapacamino y muchas se conocen en P. R. con el nombre de Palo moro [V.]; 4) *Elephantopus tomentosus*, Lin. [E. mollis, Kth.], Lengua de vaca en P. R.; 5) *Elephantopus spicatus*, Juss. [Distreptus, Cass.], Yerba de burro en P. R.; 6) *Elephantopus pratensis*, Sauval; todos de la fam. Compuestas; 7) *Kuhnia Rosmarinifolia*, Vent., Compuesta dudosa en Cuba; 8) *Aegiphila Martinicensis*, Lin., Verbenacea silvestre; 9) *Sansevieria Guineensis*, Willd., ó Piel de majá, Hemodoracea cultivada, magnífico textil. [V. Pasa de negro.]
- LENTEJA.** s. f. Leguminosa exótica, el *Ervum Lens*, Lin.
- LENTEJA DE AGUA.** La *Lemna paucicostata*, Hegelm., Lemnacea silvestre.
- LEÑATERO BEJUCO.** V. Bejuco leñatero.
- LEÑO BLANCO.** V. Ébano amarillo.
- LERÉN.** V. Yerén.
- LEVIZA.** s. f. El *Acrodielidium Jamaicense*, Nees, [Symphysodaphne Cubensis, Rich. Ayndendron? Cubense, Rich.], Laurinea silvestre, dicha también Laurel blanco.
- LIBISA.** Nombre erróneo. [V. Levisa.]
- LICHÍ.** s. m. Sapindacea originaria de la India y China: el *Nephelium*

- Lit-chi, Camb. Algunos le dicen Li-tschi.
- LICOPODIO. s. m. Nombre de las siguientes Lycopodiaceas silvestres: *Lycopodium reflexum*, Lamk; *L. Linifolium*, Lin.; *L. Taxifolium*, Sw.; *L. Dichotomum*, Jacq.; *L. verticillatum*, Lin.; *L. funiforme*, Bory.; *L. Carolinianum*, Lin.; y *L. complanatum*, Lin.
- LIGA. s. f. V. Liria.
- LILA. s. f. La *Syringa vulgaris*. Lin.
- LILA DE LAS ANTILLAS. *Solanea in-dígena*, la *Brunfelsia Cestroides* Rich., ó Galán de noche morado y Galán morado.
- LILÁILA. s. f. [P. R.] Cinamomo [V.] en Cuba.
- LIMA. s. f. *Citrus Limetta*, Risso.
- LIMON. s. m. Rutacea silvestre, el *Citrus Limonum*, Cand.
- LIMÓN-CAFÉ. El *Xanthoxylon stenopterum*, Sauval, ó Chivo, Humo, Limoncillo [V.] y Tomeguín [V.].
- LIMÓN DULCE. ?
- LIMÓN FRANCÉS, DULCE. ?
- LIMONCILLO. s. m. V. Cañuela santa, Limón-café y Tomeguín.
- LIMONCITO. s. m. Rutacea cultivada, la *Limonia trifoliata*, Lin. [Triphasia, Cand.]
- LIMONERO SILVESTRE. [Fernández.] Es el Limón [V.].
- LINAZA. s. f. Las semillas del Lino [V.].
- LINO. s. m. El *Linum usitatissimum*, Lin., planta cultivada. [V. Linaza.] [Fernández.] ?
- LINO BLANCO SILVESTRE. [Fernández.] ?
- LINO DE RÍO. El *Potamogeton lucens*, Lin., Naiadea indígena.
- LINO DE ZANJA. V. Espiga de agua.
- LIRÉN. [Oviedo.] V. Yerén.
- LIRIA. s. f. Producto mucilaginoso constituido por el latex de varias plantas y destinado á la aprehensión de las Aves. Otros le dicen Liga.
- LIRIO. s. m. El *Crinum Americanum*, Lin. [*C. erubescens*, Ait.], Amaryllideas silvestre, también llamada Lirio de San Pedro. Tres Apocyneas silvestres: *Plumiera emarginata*, Gris.; *P. Clusioides*, Gris.; *P. filifolia*, Gris. [Pichardo]?, dada como sinónimo de *Clavellina*. [V. Lirio blanco.]
- LIRIO AMARILLO. La *Plumiera obtusa*, Lin., ó Alelí y Lirio de playa.
- LIRIO AZOTADO. El *Iris variegata*, Lin., Iridea cultivada.
- LIRIO BLANCO. Apocynea silvestre, la *Plumiera alba*, Lin., ó Alelí blanco, Atabaiba, Lirio [V.], *Frangipanier* y *Súchel*. En España, el *Lilium candidum*, Lin., ó Azucena.
- LIRIO BULBOSO. El *Iris xiphium*, Lin., ó Lirio común, Iridea cultivada.
- LIRIO CÁRDENO. *Iris Germanica*, Lin., Iridea cultivada.
- LIRIO CHUCHO. V. Lirio tricolor.
- LIRIO COMÚN. V. Lirio bulboso.
- LIRIO DE CINTA. ?
- LIRIO DE COSTA. Apocynea silvestre, la *Rauwolfia Cubana*, A. Cand.
- LIRIO DE DULCE. V. Lirio tricolor.
- LIRIO DE FLORENCIA. El *Iris Florentina*, Lin., Iridea cultivada.
- LIRIO DE MÉJICO. Apocynea cultivada, *Plumiera species*.
- LIRIO DE PAREDÓN. La *Rauwolfia Salicifolia*, Gris., Apocynea silvestre.
- LIRIO DE PERSIA. El *Iris Persica*, Lin., Iridea cultivada.
- LIRIO DE PIEL DE TIGRE. El *Iris Suisiana*, Lin., ó Lirio enlutado.
- LIRIO DE PLAYA. V. Lirio amarillo.
- LIRIO DE SAN JUAN. Con este nombre y el de Lirio sanjuanero, se conoce una Amaryllidea indígena, el *Paneratium Caribæum*, Lin.
- LIRIO DE SAN PEDRO. V. Lirio.
- LIRIO ENANO. El *Iris pumila*, Lin., Iridea cultivada.

LIRIO ENLUTADO. V. Lirio de piel de tigre.

LIRIO MORADO. Otro otro nombre del Lirio amarillo [V.].

LIRIO SANJUANERO. V. Lirio de San Juan.

LIRIO TRICOLOR. Apocynæa silvestre, la Plumieria rubra, Lin., ó Lirio chucho y Lirio de dulce.

LIRIO TURCO. Liliacea cultivada, el Hemerocallis fulva, Lin.

LIS. s. m. Hemodoraceas indígenas: el Xiphidium floribundum; Sw., y el X. xanthorhizon, Wr.

LI-TSCHI. V. Lichí.

LLAIGUA. [Fernández.]?

LLAMA. [Fernández.]?

LLANTÉN. s. m. El Plantago major, Lin., Plantaginea silvestre.

LLANTÉN CIMARRÓN. El Echinodorus cordifolius, Gris.

LLANTÉN DE AGUA. Alismacea indígena, el Echinodorus intermedius, Gris.

LLERÉN. V. Yerén.

LLERENES. V. Yerén.

LLORÓN. s. m. Rubiaceæ silvestre, la Guettarda lucida, Pers. [Stenostomum lucidum, Gaertn.], ó Vera y, en Cuba y P. R., Palo llorón. [V. Rompe-hueso y Sáuce llorón.]

LLORONA. s. f. La Cyrilla Antillana, Michx., Cyrillea indígena.

LOBELIA. s. f. Lobelia indígena, la Lobelia Cliffortiana, Willd.

LOBO. [Pichardo.] V. Pepú.

LOMBRICERO. s. m. Aroideas silvestres: el Anthurium cordifolium, Kth; el A. venosum, Gris.; y el A. gymnopus, Gris. También se les dice Bejuco lombrices.

LOMBRICERO DE GUANO-CANA. Nombre vulgar de una Aroidea indígena, el Philodendron lacerum, Schott.

LONGÁN. V. Mamoncillo de China.

LOTONERO. [Pichardo.]?

LUSA. [Pichardo.]?, ó Auvernia.

LUNANIA. s. f. Samydeas indígenas:

la Lunania Grayi, Gris.; la L. Sauvalle, Gris.; la L. dodecandra, Wr.; y la L. divaricata, Benth., con su variedad  $\beta$ , pentandra, Wr.

LÚPULO. s. m. Urticaceæ cultivada, el Humulus Lupulus, Lin.

## M

MABÍ. s. m. [P. R.] Un Jayajabico [V.] de Cuba, la Colubrina reclinata, Brongn.

MABOA. s. f. Apocynæa indígena, la Cameraria latifolia, Lin.

MABOA DE SABANA. La Cameraria retusa, Gris., planta silvestre.

MACAGUA. s. f. Urticaceæ silvestre, la Pseudolmedia spuria, Gris., ó Macagua amarilla.

MACAGUA AMARILLA. V. Macagua.

MACAGUA DE COSTA. El Exostema [ó Exostemma] Caribæum, Roem. & Schult., Rubiaceæ silvestre, lo mismo que en P. R., donde se llama Cuero de sapo [V.]; en Cuba, además de Macagua de costa, se le dice Cerillo.

MACANABO. ?

MACÍO. s. m. V. Espadaña.

MACO. s. m. V. Aretillo y Hueso.

MACUÁ. s. m. Otro nombre del Canistel [V.].

MACURIGE. s. m. 1) Cupania apetala, Macf. [Ratonia apetala, Gris. Cupania oppositifolia, Rich. Cupania Juglandifolia, Rich. p. p. (fruto).], ó Mañengue; 2) Cupania spathulata, G.-M. [Ratonia spathulata, Gris.]: Sapindaceas silvestres.

MACUSEY. s. m. Aroidea indígena, el Anthurium palmatum, Kth.

MACUSEY DE CLEMENTE. El Philodendron Clementis, Wr., Aroidea endémica.

MADAMA. s. f. Geraniaceæ cultivada, el Impatiens Balsamina, Lin. [Balsamina hortensis, Desp.] pre-

- presenta muchas variedades, conociéndose en Santa Clara con el nombre de Jardines y, en Trinidad y Bayamo, con el de Espuela. [V. Miramelindo y Nicaragua.]
- MADRESELVA.** s. f. La *Lonicera Caprifolium*, Lin., *Caprifoliacea* cultivada, muy rara.
- MAGAR.** s. m. [P. R.] *Malvacea* silvestre, no cubana, la *Thespesia grandiflora*, Corr.
- MAGNOLIA.** s. f. Nombre de dos *Magnoliaceas*: una silvestre, la *Magnolia Plumieri*, Sw. [*Talauma Plumieri*, Cand. *Talauma longifolia*, Cand.]; otra cultivada, la *Magnolia grandiflora*, Lin.
- MAGUEY.** s. m. El *Agave Americana*, Lin.; y el *Agave spicata*, Cav.; *Amaryllideas* silvestres. [V. Maguey de cocuy y Cocuy.]
- MAGUEY DE COCÚ.** V. Maguey de cocuy.
- MAGUEY DE COCÚ.** Realmente es el Maguey [*Agave Americana*, Lin.], siendo *Cocuia* el nombre venezolano de la Pita; pero en Cuba se emplea el nombre de Maguey de cocuy exclusivamente para designar la Pita [V.]. Muchos escriben Maguey de cocú.
- MAGUEY DE COSTA.** El *Agave Antillarum*, Desc., *Amaryllidea* silvestre?
- MAGUEY SILVESTRE.** [Pichardo.] V. Espino.
- MAGÜIRA.** s. f. *Gesneracea* silvestre, la *Crescentia Cucurbitina*, Lin. Algunos autores la colocan entre las *Bignoniaceas*.
- MAÍ.** s. m. *Graminea* cultivada, el *Zea Mays*, Lin. Presenta numerosas variedades, y sus hojas, cuando adquieren gran desarrollo á expensa de la atrofia de los órganos reproductores, constituyen la Maloja.
- MAJAGUA AZUL.** V. Majagua común.
- MAJAGUA BLANCA.** Nombre impuesto to á una *Guacimilla* [V.]. [*Trichospermum Mexicanum*, H. Bn.]
- MAJAGUA COMÚN.** El *Hibiscus Tiliaceus*, Lin., [*Paritium Tiliaceum*, Juss. P. *elatum*, G. Don.], *Malvacea* indígena, dicha, además, *Demajagua*, *Majagua azul* y *Majagua macho* [V.].
- MAJAGUA DE COSTA.** V. *Majagua de pinar*.
- MAJAGUA DE CUBA.** V. *Guamá de sogá*.
- MAJAGUA DE FLORIDA.** La *Thespesia populnea*, Corr., *Malvacea* silvestre. [V. Palo de jaqueca.]
- MAJAGUA DE PINAR.** *Malvacea* endémica, la *Berrya?* species [*Carpodiptera Cubensis*, Gris.], ó *Majagua de costa*.
- MAJAGUA HEMBRA.** [Fernández.] Nombre impuesto á una *Guacimilla* [V.]. [*Trichospermum Mexicanum*, H. Bn.]
- MAJAGUA MACHO.** V. *Guácima* y *Majagua común*.
- MAJAGÜILLA.** s. f. *Malvaceas* silvestres: la *Pavonia Achanoides*, Gris.; y la P. *racemosa*, Sw., dicha *Cadillo de ciénaga* en P. R.
- MAJAGÜILLA BLANCA.** V. *Guacimilla* é *Hibisco blanco*.
- MAJAGÜILLA DE CIÉNAGA.** [Fernández.]?
- MAJAGÜILLA DE COSTA.** Dáse este nombre á la *Malvacea* silvestre siguiente: *Helicteres trapezifolia*, Rich., dicha *Cuernecillo* [V.] y *Huevo de gato* [V.] en P. R. [V. *Hibisco de costa*.]
- MAJAGÜILLA DE COSTA, ESPINOSA.** La *Pavonia spinifex*, Cav., ó *Cadillo espinoso* en P. R. Es una *Malvacea* silvestre.
- MAJAGÜILLA DEL PINAR.** V. *Hibisco de laguna*.
- MAJAGÜILLA MACHO.** V. *Guacimilla*. [*Trichospermum Mexicanum*, H. B.]
- MAJAGÜILLA SUELTA.** [Fernández.]?
- MAJAGÜILLO.** s. m. V. *Malvavisco*.

MAJAGÜÍN. s. m. Pavonia subpan-  
durata, Wr.; Pavonia cordifolia,  
Wr.; Malvaceas endémicas.

MAJUGUA. [Colmeiro.] Es el Guamá  
bobo [V.].

MAJUITO. s. m. V. Escabiosa.

MALA-CARA. s. f. Plumbaginea sil-  
vestre, el Plumbago scandens, Lin.  
ó Jazmincillo.

MALAGUETA. s. f. [P. R.] Myrtacea  
silvestre?, extraña á la Flora de  
Cuba, la Pimenta acris, W. &  
Arn.

MALAGUETA BRAVA. Anonacea sil-  
vestre, la Xylopia grandiflora, St-  
Hil. [X. Cubensis, Rich.] Dícese  
también Malagueta de cuabal y,  
según Morales, Guásima amarilla  
y Guásima baría [V.].

MALAGUETA DE CUABAL. V. Mala-  
gueta brava.

MALAMBO. Nombre impropio de la  
Canella alba, Murr., ó Canela  
blanca y Cúrbana. Es una Bixa-  
cea silvestre.

MALANGA. s. f. Sirve este término  
para designar diversas Aroideas,  
de las cuales sólo es indígena el  
Xanthosoma sagittifolium, Schott.  
Las cultivadas son: 1) Colocasia  
Antiquorum, Schott, var. esculen-  
ta [Colocasia esculenta, Schott.]  
[V. Galanga y Guagüí.]; 2) Cala-  
dium bicolor, Vent., ó Papagayo.  
[V. Corazón de cabrito.]

MALANGA BLANCA. [Pichardo.]?

MALANGA CIMARRONA. [Pichardo.]?

MALANGA TREPADORA. El Syngo-  
nium auritum, Schott, Aroidea  
cultivada.

MALANGUILLA. s. f. Aroidea indíge-  
na, el Xanthosoma Cubense, Eng-  
ler. [Andromycia Cubensis,  
Rich. Acontias Cubensis, Schott.  
Arisema atrorubens, Gris., Pl.  
Wright., 560; Cat. pl. Cub., 220; non  
Blume.] Son también nombres de  
la Malanguilla los siguientes: Sa-  
humaya, Sajumaya, Saumalla y  
Saumaya.

MAL-CASADA. s. f. [Fernández.]?

MALOJA. s. f. V. Maíz.

MALUCO. s. m. [P. R.]. Compuesta  
silvestre, extraña á la Flora de  
Cuba: el Spilanthus [ó Spilantes]  
uliginosa, Sw.

MALVA. s. f. [Fernández.]?

MALVA ACORAZONADA. Malvacea du-  
dosa en P. R., y no cubana, la  
Malachra cordata, Poir.

MALVA BLANCA. La Waltheria Indica,  
Lin. [W. Americana, Lin. W.  
elliptica, Cav.], común á P. R.  
[V. Gualteria americana.], y su  
var.  $\beta$ , prostata, G. M. [W. Ameri-  
cana, Lin., var. Sauval. W. micro-  
phylla, Cav.], Malvacea extraña á  
la Flora puertorriqueña? [P. R.] Es  
una Malva mulata [V.] en Cuba.

MALVA CIMARRONA. V. Malva co-  
mún.

MALVA COLORADA. La Melochia no-  
diflora, Sw., Malvacea silvestre.

MALVA COMÚN. La Melochia pyra-  
midata, Lin., ó Malva cimarrona  
y Malva de caballo [V.].

MALVA DE CABALLO. La Sida Carpi-  
nifolia, Lin. [S. lanceolata, Roxb.  
S. acuta, Burm.], y su var. brevi-  
cuspidata, Gris., Pl. Wright., 163;  
y la Sida spinosa, Lin. [Pichardo.]  
La Malva común [V.]. [P. R.]. 1)  
La Malachra palmata, Moench,  
sin nombre vulgar cubano; 2) una  
Malva mulata [V.] de Cuba. Todas  
son Malvaceas.

MALVA DE CASTILLA. [Pichardo.]?

MALVA DE CHINA. [Pichardo.] V.  
Mar-Pacífico.

MALVA DE COCHINO. La Sida rhom-  
bifolia, Lin., Malvacea silvestre.

MALVA LOCA. [Pichardo.]?

MALVA MULATA. Malvaceas indíge-  
nas: la Malachra capitata, Lin.,  
Malva de caballo [V.] en P. R.; y  
la Malachra radiata, Lin., Malva  
blanca [V.] en P. R. De la prime-  
ra especie existe en Cuba una var.  
Alceifolia, Gris.

MALVA PELUDA. Designación vulgar



- de una Malvacea rústica, la *Sida urens*, Lin.
- MALVA PESTANOSA.** [P. R.] Malvacea silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar: la *Malachra urens*, Poiret. [M. ciliata, Poiret.]
- MALVA RIZADA.** V. Malvavisco.
- MALVA ROSA.** [Pichardo.] ?
- MALVA TÉ.** [Cuba y P. R.] Malvacea silvestre, el *Corchorus siliquosus*, Lin., dicho en Cuba, además, Té de la tierra. También en P. R. es Malvaté el *C. hirtus*, Lin., no cubano.
- MALVA TÉ DE LA PLAYA.** [P. R.] El *Corchorus hirsutus*, Lin. En Cuba no tiene nombre vulgar.
- MALVAVISCO.** s. m. El *Malvaviscus Drummondii*, Torr. & Gray; y el *M. arboreus*, Cav., ó Majagüillo. [P. R.] La *Malva spicata*, Lin. [Malvastrum spicatum, A. Gray.]; y la *Malva tricuspidata*, Ait. [Malvastrum tricuspidatum, A. Gray.] Todas son Malvaceas rústicas, las cuatro en Cuba, donde la última solamente tiene nombre vulgar, Malva rizada; las dos últimas son las únicas especies silvestres en P. R.
- MALVAVISCO AFELPADO.** [P. R.] El *Hibiscus tomentosus*, Stahl, Malvacea endémica.
- MALVAVISCO PURPÚREO.** [P. R.] V. Peregrina.
- MALVIRA.** s. f. Leguminosa silvestre, la *Bauhinia megalandra*, Gris.
- MAMEY.** s. m. [P. R.] V. Mamey de Santo Domingo.
- MAMEY AMARILLO.** V. Mamey de Santo Domingo.
- MAMEY COLORADO.** Sapotea cultivada, el *Lucuma Mammosa*, Geertn., ó Mamey sapote.
- MAMEY DE SANTO DOMINGO.** Clusiacea cultivada, la *Mammea Americana*, Lin., ó Mamey amarillo. En P. R. le dicen simplemente Mamey.
- MAMEY DEL CURA.** [P. R.] Ternstroemiacea silvestre, la *Ternstroemia elliptica*, Sw. En Cuba es rústica y carece de nombre vulgar.
- MAMEY SAPOTE.** V. Mamey colorado.
- MAMOA.** Fernández, *Arboricultura cubana*, núm. 460, trae este nombre; además, en el Museo de Historia Natural de la Universidad hay una muestra de la madera de esta planta enigmática.
- MAMÓN.** s. m. La *Anona reticulata*, Lin., planta cultivada. En Cuba no le llaman Anona.
- MAMONCILLO.** s. m. Sapindacea silvestre, el *Melicocca bijuga*, Lin., Quenepas en P. R. Parece erróneo el nombre de Anoncillo dado por algunos autores á esta planta.
- MAMONCILLO DE CHINA.** Sapindacea cultivada, la *Euphoria Longana*, Lamk [Dimocarpus Longan, Lour.]; es el Longán de la Indochina.
- MANACA.** s. f. Palma indígena, el *Calyptrogine dulcis*, G.-M. [Geonoma dulcis, Wr.] Sobrenómbrese Flor de confite y Palma manaca.
- MANAJÚ.** s. m. Clusiacea indígena, la *Rheedia aristata*, Gris., ó Cabija.
- MANAJÚ DE COSTA.** *Rheedia elliptica*, Sauval, planta endémica.
- MANAJUCILLO.** s. m. *Rheedia Ruscifolia*, Gris., Clusiacea silvestre.
- MANATÍ.** s. m. V. Uvero macho.
- MANCA-MONTERO.** s. m. 1) Leguminosa silvestre, el *Pithelocobium Unguis-Cati*, Benth., ó Aromo uña de gato y, simplemente, Uña de gato; 2) *Loganica indígena*, el *Strychnos Grayi*, Gris., ó Matamontero.
- MANGA.** s. f. V. Mango.
- MANGLE AMARILLO.** ?
- MANGLE BLANCO.** Verbenacea indígena, la *Avicennia tomentosa*, Jacq. [P. R.] V. Patabán.
- MANGLE BOBO.** V. Patabán.

- MANGLE BOTÓN.** [Cuba y P. R.] Combretacea silvestre, la *Terminalia erecta*, H. B.,  $\beta$  procumbens, G.-M. [Conocarpus procumbens, Jacq.] [V. Yana.]
- MANGLE COLORADO.** El Mangle de de uña [V.]. Según Fernández, la *Kandelia Rheedii*, W. & Arn., Rhizophoracea introducida?
- MANGLE DE UÑA.** Rhizophoracea silvestre, el *Rhizophora Mangle*, Lin., ó Mangle colorado [V.]. En P. R. le dan este último nombre.
- MANGLE NEGRO.** La *Avicennia nitida*, Jacq., ó Mangle prieto, Verbenaceae silvestre.
- MANGLE PRIETO.** V. Mangle negro.
- MANGO.** s. m. [Cuba y P. R.] Anacardiacea cultivada, la *Mangifera Indica*, Lin. Ofrece variedades, entre las cuales se cuenta la Manga.
- MANGOSTÁN.** s. m. Clusiacea cultivada, originaria de las Molucas, la *Garcinia Mangostana*, Lin., ó Mangustán.
- MANGUSTÁN.** s. m. V. Mangostán.
- MANÍ.** s. m. [Cuba y P. R.] Leguminosa cultivada, el *Arachis hypogæa*, Lin.
- MANINGE.** [Fernández.] Otro nombre del Yaicuage de costa?
- MANO DE PILÓN.** V. Lebrero.
- MANTEQUILLA.** s. f. El *Tetracera cuspidata*, Meyer [Doliocarpus seiaidentatus, Garcke.], Dilleniaceae silvestre, sobrenombrada Bejuco de bastones y Mata-negro.
- MANTEQUILLERA.** s. f. La Moya [V.] de flores amarillas.
- MANTO DE LA VIRGEN.** Labiada cultivada, el *Coleus Blumei*, Benth. Ofrece numerosas variedades é híbridos. [V. Aguinaldo azul claro.]
- MANTO REAL.** Ranunculacea cultivada, la *Aquilegia vulgaris*, Lin., ó Pajarillas.
- MANZANILLA DE COSTA.** [P. R.] Compuesta silvestre, extraña á la Flora de Cuba: la *Verbesina* *Bu-*  
*phthalmoides*, G.-M. [Wedelia, Gris.]
- MANZANILLA DE MONTE.** [P. R.] Se llama Carcicillo de monte [V.] en Cuba.
- MANZANILLA DE LA PLAYA.** [P. R.] Compuesta silvestre, sin nombre vulgar cubano. Es *Verbesina* species. [Wedelia carnosa, Rich.]
- MANZANILLA DEL PAÍS.** Compuestas silvestres, *Grangea* species [Egletes Domingensis, Cass.]; y *Chrysanthellum procumbens*, Rich. [P. R.] V. Romerillo.
- MANZANILLA NEGRA.** [P. R.] V. Romerillo de loma.
- MANZANILLA TREPADORA.** [P. R.] V. Romerillo de costa.
- MANZANILLO.** s. m. El *Hippomane Mancinella*, Lin., ó Arbol del diablo, Manzanillo de costa, Penipeniche y Pinipeniche. Es una *Euphorbiacea* silvestre.
- MANZANILLO DE COSTA.** V. Manzanillo.
- MANZANILLO DE MONTE.** [Fernández.]?
- MANZANILLO DEL MORRILLO.** *Euphorbiacea* indigena, la *Excœcaria Sagrei*, J. Müll.
- MAÑENGUE.** s. m. V. Macurige.
- MARAGASIMAR.** ?
- MARAÑÓN.** s. m. Anacardiacea cultivada, el *Anacardium Occidentale*, Lin. En P. R., además de Marañón, le dicen Pajuil. [V. Acajú.]
- MARAÑUELA.** s. f. Geraniaceae cultivada, el *Tropæolum majus*, Lin. Son también nombres suyos: Capuchina grande, C. común, C. mayor, Martuerzo de Indias y Espuela de galán. Los tres últimos nombres se le aplican en España.
- MARAVEDÍ.** s. m. [P. R.] Las siguientes *Celastraceas* silvestres: 1) *Rhacoma* species [Myginda Uragoga, Jacq.]. Yerva maravedí en Cuba; 2) *Rhacoma* species [Myginda *Rhacoma*, Sw.]; silvestre y sin nombre vulgar en Cuba, du-

- dosa en P. R.; 3) *Rhacoma species* [*Myginda pallens*, Smith.], silvestre y sin nombre vulgar en Cuba. En ambas islas, careciendo de nombre vulgar, es silvestre el *Rhacoma species*. [*Myginda latifolia*, Sw.]
- MARAVILLA.** s. f. *Nyctaginea silvestre*, el *Mirabilis Jalapa*, Lin.; aunque en España le dicen Don Diego de noche [V.], no hay que confundirla con la planta que en Cuba se nombra así, que es la *Allionia incarnata*, Lin. [V. *Suspiros*.] *Acanthacea* indígena, el *Stemonacanthus microphyllus*, Nees. [P. R.] El *Hibiscus mutabilis*, Lin., *Malvacea* cultivada, extraña á la *Silvia cubana*.
- MARAY-MARAY.** [P. R.] V. *Péndola*.
- MARFIL VEGETAL.** V. *Cabeza de negro*.
- MARGARITA.** s. f. [P. R.] El *Bidens Berteriana*, Spreng. [*Cosmos caudatus*, K<sup>th</sup>. *Cosmos sulfureus*, Cav.], *Compuesta* silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- MARIALVA ELÍPTICA.** [P. R., según Stahl.] No es nombre vulgar, correspondiendo á una *Clusiacea* endémica, la *Marialva elíptica*, Stahl. Hoy es *Toxomita species*.
- MARICAO.** s. m. [P. R.] V. *Peralejo de pinares*.
- MARIGONCILLO.** s. m. *Simarubea* indígena, el *Tariri reticulata*, G. M. [*Picramnia reticulata*, Gris.]
- MARI-LOPE.** s. f. *Bixacea* silvestre, la *Turnera Ulmifolia*, Lin. En P. R. esta especie se llama *Mari-López*, lo mismo que la *T. pumilea*, Lin., que en Cuba carece de nombre vulgar.
- MARI-LÓPEZ.** s. f. [P. R.] V. *Mari-Lope*.
- MARIMBO.** s. m. [P. R.] V. *Guiro cimarrón*.
- MARIMENA.** s. f. V. *Maromera*.
- MARIMOÑAS.** V. *Francesilla*.
- MARIPOSA.** s. f. 1) *Geraniacea* silvestre, el *Oxalis frutescens*, Lin. [V. *Vimagrera*.]; 2) *Scitaminea* india, cultivada en Cuba, el *Hedychium coronarium*, Koen., y Blume, cuyo legítimo nombre es *Gandasuli* de coronas. [Pichardo.] V. *Bejuco de perdiz*.
- MAROMERA.** s. f. *Leguminosas* silvestres: *Crotalaria retusa*, Lin., ó *Marimena*, dicha *Cascabelillo grande* en P. R.; *C. pterocaula*, Desv., ó *Marimena*; *C. Vilaroi*, G.-M. & Molt (\*) ó *Marimena*. [V. *Canario*.]
- MAR-PACÍFICO.** s. m. *Malvacea* cultivada, el *Hibiscus Rosa-Sinensis*, Lin., var. de flor roja, dicha *Pavona* en P. R. [V. *Amapola*, *Hércules*, *Leche de Venus* y *Sangre de Adonis*.]

(\*) Hojas 3-folioladas. Racimos opositifoliolados ó terminales. Estípulas setaceas ó nulas.

C. Vilaroi, G.-M. & Molt. Flores amarillas, en racimos opositifoliolados ó terminales, largamente pedunculados y paucifloros [1-4-7 flores]. Brácteas calicinales diminutas, estipuliformes. Cáliz manifestamente 2-labiado y 5-dentado, persistente; segmentos triangulares, puntiagudos. Corola triple mayor que el cáliz; hundimientos ó depresiones de las alas apenas perceptibles; estandarte redondeado, de color amarillo-sub-ocraceo y con una nervura central púrpura-oscuro; quilla doblada en forma de hoz, lampiña. Estambres 10, monadelfos, alternando en longitud. Estilo filiforme, soliendo persistir en el ápice de las legumbres jóvenes. Legumbre bien pedunculada, continua, oblonga, subcilíndrica, pubescente, deprimida en el rate, apiculada, hueca y 7-8 semillas acorazonado arriñonadas y amarillentas. Yerba anual, sub-leñosa y desparramado-procumbente. Hojas 3-folioladas, con los foliolos tan largos como el peciolo, ob-oválo-acorazonados, nada carnosos, pecioliolados, superiormente lampiños y con pelos comprimidos en la cara inferior. Estipulillas diminutas, lineares, no caducas. C. pumila, Ort., *Dec.*, II, 23; Cand., *Prodr.*, II, 132, n. 94. C. Lupulina, Cand.?, *loc. cit.*, 133, n. 110 [Méjico]. C. littoralis, K<sup>th</sup> in H. B. & K<sup>th</sup>, *Nov. Gen. et Sp.*, VI, 401; Cand., *loc. cit.*, 134, n. 114. Planta completa 30-40 cent., un foliolo 5 mil., legumbre con su pedúnculo 1 1/2 cent. Flor. y fruct. en Feb., Marzo y Abril.

α, racimos opositifoliolados.

β, terminales.

Cuba: Habana, sitios pedregosos de Los Uveros [Marianao], Canteras de Medina [Vedado.]; cult. en el Jardín Botánico. Méjico.

- MARRAYA.** Nombre erróneo. [V. Mu-rraya.]
- MARRULLERO.** s. m. Leguminosa silvestre, la *Vigna vexillata*, Rich., ó *Bejuco marrullero* [V.] y *Caracolillo* de cerca. [V. *Aguinaldo rosado*.]
- MARTAGÓN.** s. m. Liliacea cultivada, el *Lilium Martagon*, Lin., ó *Azucena silvestre*.
- MARTÍN-ÁVILA.** [P. R.] Rubiacea silvestre, no cubana, el *Chione glabra*, Cand.
- MARTINIA.** s. f. V. *Araña-gato*.
- MARTINICA.** s. f. V. *Yerba hedionda*.
- MARUGA.** s. f. La *Crotalaria Anagyroides*, Kth?, Leguminosa silvestre.
- MASA.** s. f. [P. R.] Es el *Azucarero* [V.] de Cuba.
- MASACUYA.** ?
- MASTUERZO.** s. m. [Sauvalle.] El *Lebrero* [V.]. [P. R.] V. *Sabelección*.
- MASTUERZO DE INDIAS.** V. *Marañuela*.
- MATA-MONTERO.** s. m. V. *Manca-montero*.
- MATA-NEGRO.** s. m. *Condarea silvestre*, la *Rourea glabra*, Kth. [V. *Juan Caliente* y *Mantequilla*.]
- MATA-PAVO.** s. m. La *Boerhaavia paniculata*, Rich., y la *B. hirsuta*, Willd.; *Nyctagineas silvestres*.
- MATE.** s. m. La *Canavali* [ó *Canalia*] *Cubensis*, Gris., Leguminosa silvestre.
- MATE ÁRBOL.** El *Xanthoxylon ternatum*, Sw., *Rutacea rústica*.
- MATE DE GOSTA.** La *Canavali obtusifolia*, Cand., ó *Cayajabo*. Es una Leguminosa silvestre, como en P. R., donde le dicen *Mato de la playa*.
- MATO AMARILLO.** [P. R.] Es el *Guacalote amarillo* [V.] ó *Jayabo* de Cuba.
- MATO AZUL.** [P. R.] Es el *Guacalote prieto* [V.] de Cuba.
- MATO DE LA PLAYA.** [P. R.] V. *Mate de costa*.
- MATOS COLORADOS.** [P. R.] V. *Soplillo*.
- MATRONAL.** s. m. V. *Juliana*.
- MAURICIO.** s. m. [P. R.] *Magnoliacea* endémica, la *Magnolia Portoricensis*, Bello.
- MAYA.** s. f. V. *Piña de ratón*.
- MAZAMORRA.** [Sauvalle.] ?
- MAZORQUILLA.** s. f. *Acanthacea silvestre*, el *Blechnum Brownii*, Juss.
- MAZORQUILLA DE CASTA.** *Hypericacea silvestre*, el *Hypericum Arenarioides*, Rich.
- MELAMBO.** Es *Malambo* [V.].
- MELÓN BANGAÑO.** [Pichardo.] ?
- MELÓN DE AGUA.** El *Cytrullus vulgaris*, Schrad. [Cucumis *Citrullus*, Ser.], *Sandia* ó *Zandía*, *Cucurbitacea* cultivada. En P. R. lo llaman *Patilla*.
- MELÓN DE CASTILLA.** *Cucurbitacea* cultivada, el *Cucumis Melo*, Lin., ó *Melón moscatel*.
- MELÓN DE COSTA.** [P. R.] Nombre del *Cardón* [V.] ó *Tuna cabezuda*.
- MELÓN DE OLOR.** [Pichardo.] ?
- MELÓN DE VALENCIA.** ?
- MELÓN MOSCATEL.** V. *Melón de Castilla*.
- MEMIZO.** s. m. Otro nombre cubano de las *Capulinas* [V.].
- MENTA INGLESA.** Labiada cultivada, la *Mentha Piperita*, Lin., ó *Yerba buena* de olor de pimienta.
- MENTA SILVESTRE.** La *Mentha sylvestris*, Lin., ó *Yerba buena silvestre*, planta cultivada.
- MENTRASTO.** s. m. [P. R.] *Compuesta silvestre* en ambas islas, sin nombre vulgar en Cuba. Es el *Ageratum Conyzoides*, Lin.
- MERCADELA.** s. f. *Compuesta* cultivada, la *Calendula officinalis*, Lin.
- MERCADERA.** [Pezuela.] Es la *Mercadela* [V.].
- M..... DE GALLINA.** La *Ateleia* *apetala*, Gris., Leguminosa silvestre. [V. *Yerba de la sangre*.]
- MIJE.** s. m. *Myrtacea* indígena, el *Calyptanthus rigida*, Sw.

- MISO.** V. Miso.
- MILLO.** V. Miso.
- MIL-FLORES.** V. Mil-rosas.
- MIL-ROSAS.** Verbenacea que crece en Cuba, el *Clerodendron species*, ó Mil-flores y Cógelo-todo. [Pichardo.] Además de dicha especie cita otra? En Cuba se cultiva el *Clerodendron Ligustrinum*. R. Br., pero no nos atrevemos á afirmar que sea la Mil-rosas.
- MIMOS.** V. Banderilla.
- MIRAGUANO.** s. m. V. Guano blanco y YRAGUANO.
- MIRAGUANO DE LANA.** Palma indígena, el *Thrinax parviflora*, Sw. [T. Martii, Gris, & Wendl. *Poro-thrinax pumilio*, Wendl.] ó Guano de costa, Guano de lana, Palma Campeche y Palma miraguano de lana.
- MIRAGUANO ESPINOSO.** Palma indígena, la *Copernicia Wrightii*, Gris, & Wendl., ó Guano espinoso y Palma guano espinoso.
- MIRAMELINDO.** s. m. [Coloma.] Otro nombre vulgar de la Madama [V.].
- MIRASOL.** s. m. V. Girasol.
- MIRTO DE RIO.** *Calyptanthus szygium*, Sw., Myrtaceae silvestre.
- MIRTO DEL PAÍS.** Melastomaceae indígena, la *Mouriria spathulata*, Gris. [Aulacocarpus Wrightii, Gris.]
- MISO.** s. m. Gramínea cultivada, el  *Panicum Miliaceum*, Lin., ó Miso y Millo.
- MOCA.** s. f. [Cuba y P. R.] V. Yaba.
- MOCO DE PAVO.** Dos *Chenopodiaceae* reciben este nombre: la *Celosia nitida*, Vahl [V. *Siempreviva*.]; y la *C. cristata*, Lin., ó Cresta de gallo. La primera especie es silvestre; la segunda cultivada.
- MONIATO.** Es el Boniato.
- MONIGOTE.** s. m. V. Boca de dragón.
- MONTEZUMA.** [Coloma.] V. Motezuma.
- MORA BLANCA.** V. Fustete.
- MORA DE LOMA.** V. Fustete.
- MORA DE PIEDRAS.** *Urticaceae* silvestre, la *Boehmeria cylindrica*, Willd.
- MORA DEL PAÍS.** V. Fustete.
- MORA ESPINOSA.** Otro nombre del Fustete.
- MORERA.** s. f. *Urticaceae* cultivada, el *Morus multicaulis*, Perrot.
- MORIVIVÍ.** s. m. [P. R.] V. Vergonzosa.
- MORURO ABEY.** V. Palo de rayo.
- MORURO DE COSTA.** *Leguminosae* silvestre, la *Calliandra Porto-Riccensis*, Benth. [Acacia littoralis, Rich.] En P. R. le dicen Acacia puertorriqueña.
- MORURO PRIETO.** *Leguminosae* silvestre en ambas islas, el *Pithecolobium Filicifolium*, Benth.; *Cojóbana* [V.] en P. R.
- MOSQUITO.** s. m. *Orchidea* indígena, el *Leochilus* [ó *Leochilus*] *salvus*, Gris. [Oncidium *salvus*, Reich, f.]
- MOSTACILLA DEL MAR.** [P. R.] Es el Berro de costa [V.] en Cuba. [Cakile maritima, Scop. (*C. æqualis*, L' Hérit. *C. Cubensis*, Kth.), *Crucifera* silvestre en ambas islas.]
- MOSTAZA.** s. f. [Cuba y P. R.] *Crucifera* indígena, la *Brassica lanceolata*, Sauval. [Sinapis *Brassicata*, Lin.? *S. lanceolata*, Cand. *S. integrifolia*, Willd.? West.? *S. nigra*, Desc. non Lin. *Raphanus lanceolatus*, Willd.; non Macf. (Sinonimia oscura.)] [V. P. .... de perro.]
- MOSTAZA NEGRA.** *Crucifera* cultivada, la *Brassica nigra*, Koch. [Sinapis, Lin.]
- MOTEZUMA.** Otro nombre de la Oreja de oso [V.] ó Montezuma.
- MOYA.** s. f. *Compuesta* cultivada, el *Chrysanthemum coronarium*, Lin. Presenta algunas variedades. [V. Mantequillera.]
- MUERMERA.** V. Yerba de pordioseiros.
- MULATO.** [Pichardo.]?
- MUNDILLO.** s. m. V. Bola de nieve.



- MURALLA. V. Murraya.  
 MURAYA. V. Murraya.  
 MURICHI. [Fernández.]?  
 MURRAYA. s. f. Rutacea cultivada, la Murraya exotica, Lin., ó Boj de Persia en Santiago de Cuba y Café de la India en P. R. Son nombres erróneos Muralla y Muraya.  
 MURTA. [Coloma.] Errata, por Mirto. En catalán designa el Myrtus communis, Lin., ó Arrayán [V.]. [P. R.] La Mouriria Domingensis, Walp., Melastomacea cultivada, extraña á la Flora de Cuba.  
 MURTIÑOS. V. Arrayán.  
 MURUCUYA. s. f. V. Pasionaria vejigosa.

N

- NABACO. s. m. La Coussarea vaginata, G.-M. [Farama ? vaginata, Gris.], Rubiaceae silvestre. [V. Café cimarrón y Galán de noche.]  
 NABIMA. Fruto del Gastrococos armentalis, Moral. Dicese también Guanabima. [V. Corajo.]  
 NABO. s. m. La Brassica Napus esculenta, Cand., Crucifera cultivada.  
 NABONO. Con este nombre, y el de Guanabono, conocían los aborígenes la Guanábana [V.].  
 NAIBOA. s. f. Jugo de la Yuca agria [V.] y también de la Yuca blanca [V.]. En el primer caso es sinónimo de Yare [V.].  
 NAJESÍ. s. m. [Pichardo.]?  
 NARANJA DE CAJEL. El Citrus vulgaris, Risso, var. pulpa-dulci.  
 NARANJA DE CHINA. Citrus Aurantium, Risso, ó Naranjo dulce, Rutacea cultivada.  
 NARANJA-LIMA. ?  
 NARANJA MOREIRA. Citrus nobilis, Lour.  
 NARANJITA DE SAN JOSÉ. Citrus vulgaris, Risso, var. Myrtifolia, ó Naranjito del Obispo.

- NARANJITO DEL OBISPO. V. Naranjita de San José.  
 NARANJO AGRIO. Rutacea silvestre, el Citrus Aurantium, Lin., non Risso.  
 NARANJO DE MALTA. Rutacea cultivada, el Citrus Aurantium melitense, Risso, ó Naranjo de sangre.  
 NARANJO DE SANGRE. V. Naranjo de Malta.  
 NARANJO DULCE. V. Naranja de China.  
 NARCISO DE MANOJO. [Coloma.] Narcissus Tacetta, Lin.  
 NARCISO FALSO. [Coloma.] Narcissus Pseudo-Narcissus, Lin.  
 NARCISO POÉTICO. [Coloma.] Narcissus Poeticus, Lin. Algunos le dicen Juanita.  
 NARDO OLOROSO. [Coloma.] V. Susana.  
 NAZARENO. s. m. El Celastrus lineatus, G.-M. [Maytenus, Wr.], Celastraceae endémica.  
 NAZARENO AMARILLO. [Fernández.] Leguminosa cultivada?, la Hymenaea floribunda, Kth.  
 NAZARENO MORADO. [Fernández.] V. Nazareno.  
 NEA. [Pichardo.] Corrupción de Anea ó Enca [V.].  
 NEGRACUBA. [Pichardo.]?  
 NELUMBIO. s. m. El Nelumbium speciosum, Willd., var. tamara, Cand. Nymphaeaceae cultivada.  
 NELUMBO AMARILLO. Nymphaeaceae silvestre, el Nelumbium luteum, Willd. [Morales.] V. Ninfea.  
 NELUMBIO BLANCO. La Nymphaea ampla, Cand., ó Flor de agua.  
 NENÚFAR. s. f. V. Ninfea.  
 NENÚFAR AZUL. La Nymphaea caerulea, Nymphaeaceae egipcia.  
 NENÚFAR BLANCO. Nymphaea odorata, Ait.  
 NEPENTES. s. m. Planta de Ceylán, apenas cultivada en Cuba, el Nepenthes distillatoria, Lin.  
 NICARAGUA. s. f. La Madama [V.], recibe también el nombre verná-

cular de Madama de Nicaragua ó Nicaragua, sobre todo en España.

NIEVE s. f. [Pichardo.] ? [V. Escarcha.]

NIGUA s. f. Dáse este nombre á siete Boragineas indígenas: la Tournefortia hirsutissima, Lin., ó Cayaya; la T. cymosa, Lin.; la T. angustifolia, Rœm. & Schult.; la T. scabra, Lamk.; la T. volubilis, Lin.; la T. polychros, Spreng.; y la T. incana, Lamk.

NIGUA DE PAREDÓN. La Tournefortia Laurifolia, Vent.

NINFEA s. f. La Nymphæa Rugeana, Mey., Nelumbio amarillo [V.] según Morales; y la N. alba, Lin., ó Nenúfar: Nymphæaceas.

NIQUEBÁ [Pichardo.] ?

NÍSPERO s. m. V. Sapote. [Achras Sapote, Lin.]

NÍSPERO DEL JAPÓN. Rosacea de escao cultivo, la Eriobotrya Japonica, Lãndl.

NO ME OLVIDES. El Myosotis palustris, With., Boraginea de jardines.

NOGAL CENICIENTO. [Fernández.] V. Nogal del país. [Juglans cinerea, Lin.]

NOGAL COMÚN. V. Nuez.

NOGAL DE CUBA. [Fernández.] El Juglans Fraxinifolia, Lamk., Juglandea cultivada?

NOGAL DE LA AMÉRICA. [Fernández.] V. Nogal del país. [Juglans cinerea, Lin.]

NOGAL DE LA INDIA. Euphorbiacea naturalizada en Cuba, el Aleurites Molluccana, Willd. [A. triloba, Forst.]

NOGAL DEL PAÍS. El Juglans cinerea, Lin., dicho también Nogal de la América ó N. ceniciento; y el J. Insularum, Gris.

NOGAL NEGRO. [Fernández.] V. Nogal de la India.

NOGAL PELUDO. [Fernández.] V. Nogal de la India.

NUBAGA. Probablemente variedad de la Yuca agria [V.]

NUEZ s. f. Fruto del Nogal común: Juglans regia, Lin., Juglandea cultivada ?

NUEZ MOSCADA. V. Enemoso. [Monodora Myristica, Dun.]

NUEZ VÓMICA CUBANA. [Pichardo.] V. Piñón vómico.

## Ñ

ÑAME s. m. Nombre vulgar genérico de varias Dioscoreas y principalmente de sus raíces. A este término no corresponde, como suponen algunos autores, el de Age [V.]

ÑAME AMARILLO. También llamado Ñ. de Guinea, Ñ. pelado, y, por otros, Ñ. morado [V.]; la Dioscorea alata, Lin. [Ubiom alatum, Desf.]

ÑAME BLANCO. Dioscorea sativa, Lin. [D. Cliffortiana, Lamk.]

ÑAME BOBO. [Pichardo.] Probablemente error por Ñ. bombo. [V. Ñ. de cimarrón.]

ÑAME BOMBO. V. Ñame de cimarrón.

ÑAME CIMARRÓN. Cuatro Dioscoreas indígenas tienen este nombre: la Dioscorea scorpioidea, Sauval; la Rajania hastata, Lin.; la R. mucronata, Willd.; y la R. angustifolia, Sw., dichas las tres últimas Voladores y, en Puerto Rico, Guáyaros. Además se llama Ñ. cimarrón ó Ñ. de monte á la Dioscorea tuberculifera, Lin., ó Gunda de los puerto-riqueños.

ÑAME DE CIMARRÓN. La Dioscorea bulbifera, Lin., ó Ñame bombo y Ñ. morado [V.]

ÑAME DE GUINEA. V. Ñame amarillo.

ÑAME DE MONTE. V. Ñame cimarrón.

ÑAME MORADO. V. Ñ. de cimarrón y Ñ. amarillo.

ÑAME PELADO. V. Ñame amarillo.

ÑANGUÉ s. m. Solanea indígena, la

Datusa fastuosa, Lin., ó Túnica de Cristo, Chamico de la tierra? y Chamico de la Judea?

O

- OCUJE. s. m. Clusiacea indígena, el *Calophyllum Calaba*, Jacq.  
 OCUJE HEMBRA. [Fernández.]?  
 OCUJE MACHO. [Fernández.]?  
 OFÓN CRIOLLO. El *Vitex divaricata*, Sw., ó Roble güiro [V.], *Verbena-cea silvestre*.  
 OGIERA. s. f. [P. R.] La *Eleutheranthera ovalifolia* Poit., [Ogiera triplinervis, Cass.;  $\gamma$ , Porto-Ricensis, Cand.] Es una Compuesta silvestre. No existe en Cuba, donde se encuentra otra especie del género: *Eleutheranthera ruderalis*, G.-M., [Ogiera ruderalis, Gris. Ogiera triplinervis, Cass.;  $\beta$ , leio-carpa, Cand.], sin nombre vulgar. [\*]  
 OJANCHA. [Fernández.]?  
 OJO DE CUCUYO. [Richard.] V. Cucuyo de fruto chico [*Lucuma dicyoneura*, G.-M.]  
 OJO DE BORRICO. V. Jairol.  
 OJO DE BUEY, DE COSTA. La *Canavali* [ó *Canavallia*] *reflexa*, Hook. f.  
 OJO DE CANGREJO. El *Pitheco]obium obovale*, Sauval., Leguminosa indígena.  
 OJO DE POETA. V. Anteojo de poeta.  
 OJO DE RATÓN. *Phytolaccacea* indígena, la *Rivina lævis*, Lin., [R. humilis, Lin.] ó Coralitos.  
 OLCUAJOUILT. s. m. V. Olí.  
 OLEO-RESINA DE COPAÍVA. V. Bál-samo de Copaíva.

[\*] El gén, *Eleutheranthera* se completa con la E. species [Ogiera triplinervis, Cass. ( $\alpha$ .)], de la Guayana. La *Wedelia discoidea* Schlecht., in *Linnaea* [1831], 728 [Cand., *Prodr.*, V, 543 núm. 34.], es una de las tres *Eleutheranthera* citadas.

- OLÍ. s. m. Nombre del cautchuc que suministra la *Castilloa* el *sticca*, Cerv., *Urticacea* cultivada, poco extendida en la isla, y dicha *Olcujouilt* en Méjico. [V. Hule y Ule.]  
 OLIVO. s. m. Arbol asiático, aclimatado en Europa y cultivado en Cuba, donde parece que no florece. Es el *Olea Europea*, Lin. Sus frutos se llaman Aceitunas.  
 OMBLIGO DE VENUS. V. Quitasolillo.  
 ONOTO. V. Bija.  
 ORÉGANO. s. m. El *Hyptis gonocephala*, Wr., *Labiada* indígena.  
 ORÉGANO CIMARRÓN. *Hyptis suaveolens*, Poit.  
 ORÉGANO FRANCÉS. *Labiada* cultivada, *Monarda punctata*, Lin.  
 ORÉGANO DE CARTAGENA. Erróneamente se aplica este nombre ora al Orégano francés [V.], ora al Culantro de Cartagena, *Culantro cimarrón* [V.] *Culantro* de Cartagena, *Yerba del sapo* ó *Culantro sabanero*.  
 OREJA DE JUDÍO. Leguminosa cultivada [Jardín Botánico], el *Enteolobium cyclocarpum*, Gris., ó Arbol de las orejas.  
 OREJA DE LA MADERA. V. Oreja de palo.  
 OREJA DE OSO. *Primulacea* cultivada, *Primula auricula*, Lin., ó *Aurícula*. [V. Motezuma.]  
 OREJA DE PALO. Nombre dado á diversos *Hymenomycetos*, particularmente de la tribu *Polyporeos*. También se les dice Oreja de la madera.  
 OREJA DE PALO, CARMESÍ. El *Glaeoporus conchoides*, Mont., *Hymenomyceto* indígena.  
 ORILLA DE ARROYO. Nombre inusitado. Es una *Guanabanilla* [V.], la *Ouratea alaternifolia*, G.-M., *Ochnacea* endémica.  
 ORIZA. Nombre viciado, correspondiente al generico del Arroz: *Oryza*. [V. Arroz.]

OROZÚZ. s. m. [Pichardo.] V. Orozús de la tierra.

OROZÚZ DE LA TIERRA. *Lippia dulcis*, Trev., Verbenacea silvestre.

ORTIGA. s. f. *La Urtica urens*, Lin.

ORTIGÓN. [Pichardo.]?

ORTIGÜILLA. s. f. *Urticacea* indígena, la *Pilea lucida*, Blume.

OSAA. [Bachiller.]?

OUATE. V. Yerba acolchada.

OVA. s. f. *Nymphaeacea* silvestre, el *Nuphar Advena*, Ait. [*Nymphaea*, Michx.]

OVIEDO AMARILLO. El *Clerodendron Cubense*, Schauer, Verbenacea indígena, dicha también Hiel de perro.

OVIEDO DE FLOR BLANCA. El *Clerodendron Sagræi*, Schauer.

## P

PACANA. s. f. Fruto importado de una *Juglandea* norte-americana, no cubana, la *Carya Olivæformis*, Nutt. [*Juglans Olivæformis*, Michx.]

PACHULÍ. Ortografía errónea de Patchouly [V.]

PADERO. s. m. La *Yagruma macho-Didymopanax undulatum*, Decsne & Planch. [*Panax speciosum*, Willd.].—*Araliea* indígena.

PAJARILLAS. V. Manto real.

PAJICÁ. s. m. V. Coco macaco.

PAJUÁ. Nombre erróneo; adulteración de Pajicá. [V. Coco macaco.]

PAJUÍL. s. m. [P. R.] V. Marañón.

PALISANDRO. s. m. [Pichardo.]?

PALISANDRO OCCIDENTAL DE VIRGINIA. [Fernández.]?

PALMA. s. f. [Fernández.] Nombre de cuatro Palmas cultivadas, son: *Caryota urens*, Lin.; 6 *Caryota*, que en Costa Rica llaman Cocollol; *Caryota mitis*, Lour.; *Caryota Sobolifera*, Wall.; y *Caryota Martiniensis*.

PALMA ACROCOMIA HORRIDA. Nom-

bre erróneo de una Palma cultivada, caso de encontrarse en Cuba: la *Acrocomia horrida*.

PALMA AFORRADA. [Fernández.]?

PALMA ALCANFOR. [Fernández.] Nombre impropio, lo mismo que el de Palma de sagú [Fernández.], de una *Cycadea* cultivada, *Cycas revoluta*, Thunb., mejor llamada Alcanfor [V.].

PALMA ARECA CATECHU. [Fernández.] Nombre falso del *Areca Catechu*, Lin.

PALMA ATTÁLEA FUNIFORÆ. [Fernández.] Es la *Attalea funigera*, Mart. También le llaman Brasil de sogá.

PALMA BAMBÚ. [Fernández.]?

PALMA BARRIGONA. [Fernández, n. 550.] V. Palma barrigona de Vuelta Abajo.

PALMA BARRIGONA DE SIERRA. [Saulvalle. Fernández.] Palma indígena, la *Goussia princeps*, Wendl.

PALMA BARRIGONA DE VUELTA ABAJO. El *Colpothrinax Wrightii*, Gris. & Wendl., Palma indígena.

PALMA CALAMUS AFRICANUS. [Fernández.]?

PALMA CAMPECHE. [Fernández.] V. Miraguano de lana.

PALMA CANA. El *Sabal umbraculifera*, Mart. También se nombra Palmeto.

PALMA CAÑA DE MONTE. [Fernández.] V. Guano caña de monte.

PALMA CAÑA DE INDIA. [Fernández.] V. Caña de India.

PALMA CAULE. *Hemithrinax species* [*Trithrinax compacta*, Gris. & Wendl.], Palma indígena.

PALMA CHAMEROPS ACAULIS. [Fernández.]?

PALMA CHAMEDORIA ELEGANS DEL JORDÁN. [Fernández.] Nombre erróneo de una Palma cultivada, caso de existir en Cuba; es la *Chamedorea elegans*, Mart.

PALMA CHAMEDORIA MEXICANA. [Fernández.]?

- PALMA CHINENSIS.** [Fernández.] ?
- PALMA CHRISTI.** Nombre vulgar del *Ricinus communis*, Lin., Euphorbiacea silvestre, sub-arbórea en Cuba. Dícese también Higuiereta y Ricino, y suministra el Aceite de Palma Christi ó Aceite de Ricino. [V. Carrapa.]
- PALMA CIMARRONA.** Es un nombre impropio, pues no designa una Palma sino una Filicina indígena, de la familia Cyatheaaceas, la *Cyathea insignis*, Eaton.
- PALMA COPERNICIA HOSPITA.** [Fernández.] V. Jata.
- PALMA COROJO DE JAMAICA.** [Fernández.] V. Corojo de Jamaica.
- PALMA COROZO DEL ORINOÇO.** [Fernández.] V. Corojo del Orinoco.
- PALMA CRIOLLA.** Es la Palma real [V.], *Oreodoxea regia*, Kth, degenerada.
- PALMA DÁTIL.** Este nombre es más empleado en Cuba que el de Datilera. Designa una Palma cultivada, el *Phœnix dactylifera*, Lin. Su fruto se llama Dátil.
- PALMA DE AUSTRALIA.** [Fernández.] ?
- PALMA DE AZÚCAR.** Palma india, cultivada en Cuba? Es la *Arenga saccharifera*, Labill.
- PALMA DE CARACOL, MACHO Y HEMBRA.** Nombre erróneo del *Pandanus odoratissimus*, Lin. [V. Pandano-caracolillo.] No es Palma, sino una Pandanea.
- PALMA DE COCOS.** V. Coco.
- PALMA DE COROJO DE GUINEA.** [Fernández.] V. Corojo de Guinea.
- PALMA DE COROJO INDÍGENA.** [Fernández.] V. Corojo.
- PALMA DE DRAGO.** [Fernández.] El *Calamus Draco*, Willd.
- PALMA DE LOMÁ.** [Fernández.] ?
- PALMA DE MONTE.** V. Palma silvestre ó de monte.
- PALMA DE SAGÚ.** [Fernández.] V. Palma alcanfor.
- PALMA DE SIERRA.** [Fernández.] ?
- PALMA DE LA NUEVA-GRANADA.** [Fernández.] ?
- PALMA DE LAS MOLUCAS.** [Fernández.] ?
- PALMA DE LAS ROCAS.** [Fernández.] ?
- PALMA DEL PERÚ.** [Fernández.] El *Chamærops fragrans*.
- PALMA ENANA.** Dos Palmas reciben este nombre, la una indígena, *Calyptrogyne species*, [Geonoma Swartzii, Gris. & Wendl.]; y la otra cultivada: *Chamærops humilis*, Lin. [V. Palma gata.]
- PALMA EQUISITIFOLIA.** [Fernández.] ?
- PALMA EUTERPE MANAELE.** [Fernández.] Nombre erróneo. Es la *Euterpe Manale*, Gris. & Wendl.
- PALMA EUTERPE OLERACEA EDULIS.** [Fernández.] Nombre erróneo. Es la *Euterpe edulis*, Mart. [Areca oleracea, Lin.]
- PALMA GATA.** [Fernández.] Es una Palma enana [V.], el *Chamærops humilis*, Lin.
- PALMA GUANO ESPINOSO.** [Fernández.] V. Miraguano espinoso.
- PALMA GUANO HEDIONDO.** [Fernández.] ?
- PALMA JAPA.** [Fernández.] *Sabal Palmeto*, Lodd.
- PALMA JIPIJAPA DEL PERÚ EXÓTICA.** [Fernández.] Nombre disparatado de una planta cultivada en Cuba, llamada en su país *Bombonaxa* [V.] é *Hiraca*.
- PALMA JUSTA.** *Calyptrogyne species*, [Geonoma intermedia, Gris. & Wendl.]
- PALMA LATANIA RUBRA.** [Fernández.] Palma cultivada, la *Latania rubra*, Jacq.
- PALMA LIVISTONIA YOCONCIDIS DE GUINEA.** [Fernández.] ?
- PALMA LYAYUES BUTROFA.** [Fernández.] ?
- PALMA MANACA.** [Fernández.] V. *Manaca*. [Calyptrogyne dulcis, G.-M.]
- PALMA MARFIL.** [Fernández.] Es el *Phytelephas macrocarpa*, R. & Pav. [Elephantusia macrocarpa,



- Willd.], planta cultivada, dicha también Tagua. Suministra el Marfil vegetal. [V. Cabeza de negro.]
- PALMA MAURICIA:** [Fernández.] La *Mauritia flexuosa* y la *Mauritia setifera*, Palmas cultivadas?
- PALMA MIRAGUANO DE LANA.** [Fernández.] V. Miraguano de lana.
- PALMA Ó GUANICO DE SIERRA.** [Fernández.]?
- PALMA Ó GUANO BLANCO.** [Fernández.] Y también Palma *Thrinax argentea* [Fernández.]; es el Guano blanco.
- PALMA Ó GUANO DE COSTA.** [Fernández.] Es el Miraguano de lana.
- PALMA Ó GUANO PRIETO.** [Fernández.]?
- PALMA PANDANUS TRICOLOR.** [Fernández.]? El nombre es erróneo.
- PALMA PETATE.** [Fernández.]?
- PALMA POROTHRINAX PUMILIO.** [Fernández.] Es el Miraguano de lana.
- PALMA REAL.** Palma indígena, la *Oreodoxea regia*, Kth. [V. Palma criolla.]
- PALMA ROSA.** [Fernández.]?
- PALMA SILVESTRE Ó DE MONTE.** [Fernández.]?
- PALMA THINAX ARGENTEA.** [Fernández.] Y también Palma ó guano blanco. Es el Guano blanco.
- PALMA THINAX MARTII.** [Fernández.] Es el Miraguano de lana.
- PALMA THINAX MULTIFLORA.** [Fernández.] Es el *Thrinax multiflora*, Mart.
- PALMA THINAX PARVIFLORA.** [Fernández.] V. Miraguano de lana.
- PALMA THINAX RIGIDA.** [Fernández.] El *Thrinax rigida*, Gris, & Wendl.
- PALMA THINAX SEPEYE.** [Fernández.]?
- PALMA TRONCO ALTO.** [Fernández.]?
- PALMA URANIA.** Nombre erróneo que, cómo el de Rabaneta, aplica Fernández al Árbol del viajero [V.] ó *Ravenala*.
- PALMA URENGA SACARIFERA.** [Fernández.] Nombre disparatado. V. Palma de azúcar.
- PALMA YAREY.** [Fernández n. 578 y 611.] V. Yarey.
- PALMA YEIRA Ó COCO DE GUINEA.** [Fernández.]?
- PALMA YUMA.** [Fernández.]?
- PALMA YURAGUANO.** [Fernández.] El *Thrinax radiata*, Lodd. Dáse, además, ese nombre y el Guanichiche [Fernández.] al Yuraguano [V.].
- PALMERA ERIZADA.** V. Helecho árbol.
- PALMERA SIN ESPINAS.** V. Helecho árbol.
- PALMETO.** [Fernández.] V. Palma caña.
- PALMICHE.** s. m. Fruto de diversas Palmas, notablemente de la Palma real y del Coco macaco.
- PALMILLA.** s. f. V. Coco macaco.
- PALMITO.** s. m. Cogollo de diversas Palmas.
- PALO AMARGO.** V. Palo amarillo.
- PALO AMARILLO.** *Papaveracea* indígena, el *Bocconia frutescens*, Lin. Se dice también Palo amargo, y en P. R. lo nombran Palo de pan cimarrón.
- PALO BERRACO.** [Fernández.]?
- PALO BLANCO.** La *Simaruba glauca*, Cand., *Simarubea* indígena. [V. Albano amarillo. (*Tecoma leucoxylog*, Mart.)] [Morales, *Repertorio*.] El Palo geringa. [V. Ben.]
- PALO BOBO DE CUBA.** V. Bagá.
- PALO BONIATO.** Dáse este nombre á las tres *Apocynas* indígenas que siguen: *Rauwolfia canescens*, Lin., dicha Palo de leche [V.] en P. R.; *Rauwolfia*? *Strepelioides*, Gris; y «*Vallesia glabra*, Cav.»
- PALO BRONCE.** [Fernández.]?
- PALO BRONCO.** La *Malpighia urens*, Lin., la *Malpighia enida* Spreng. y la *Malpighia setosa*, Spreng. En P. R. se da dicho nombre á la primera especie.

**PALO BRONCO DE MONTE.** La *Malpighia oxycocca*, Gris.  
**PALO BRONCO DEL PINAR.** La *Malpighia coccigera*, Lin.  
**PALO CABRA.** La *Genipa nigrescens*, G.-M. [*Randia*, Gris.], Rubiaceae silvestre.  
**PALO CACAO.** La *Miconia elata*, Cand., Melastomacea indígena.  
**PALO CACHIMBA.** V. *Vibona*.  
**PALO CACHUMBA.** [P. R.] V. *Vibona*.  
**PALO CAFÉ.** [Fernández.] V. *Pitajoni cimarrón*.  
**PALO CAMPECHE.** V. Palo de Campeche.  
**PALO CANDELA.** El *Cordyline reflexa*, Planch. [*Draecena reflexa*, Lam<sup>k</sup>.], Liliacea cultivada, dicha además Drago verde de Europa.  
**PALO COCHINO.** V. Azucarero.  
**PALO COTORRA.** V. Rompe-hueso. [*Guidonia sylvestris*, G.-M.]  
**PALO CRUZ.** [Fernández.]?  
**PALO DE BOMBA.** V. Cirio. [*Xylopia glabra*, Lin.]  
**PALO DE BRASILETE.** [P. R.] El *Ecastaphyllum monétaria*, Cand. [V. *Péndola*.]  
**PALO DE BURRO.** [P. R.] Se da ese nombre á tres *Capparideas* silvestres: el *Capparis latifolia*, Gris.; el *Capparis verrucosa*, Jacq.; y el *Capparis frondosa*, Jacq. La última especie es silvestre en Cuba, donde no tiene nombre vulgar.  
**PALO DE CAJA.** Dos *Sapindaceas* llevan este nombre, la *Schmidelia Occidentalis*, Sw., y la *Schmidelia Cominia*, Sw. La primera se nombra Quiebra-hachas en P. R., y la segunda Yanilla [V.] en Cuba.  
**PALO DE CAMPECHE.** Dase este nombre á dos *Leguminosas*, una indígena, la *Cesalpinia bijuga*, Sw., conocida además por Guacamaya de costa y Campeche, y otra cultivada, el *Hamatoxylon Campechianum*, Lin. Esta especie es el verdadero Palo de Campeche.  
**PALO DE CLAVO.** [Fernández.] La

*Eugenia aromatica*, H. Bn [*Caryophyllus aromaticus*, Lin.], Myrtaceae cultivada.

**PALO DE COCHINO.** V. Azucarero.  
**PALO DE CORAL.** V. Ponasí.  
**PALO DE CUCUBANO.** [P. R.] La *Guettarda scabra*, Lam<sup>k</sup>, Rubiaceae silvestre. Es uno de los tantos vegetales que en Cuba se llaman Cuero [V.]  
**PALO DE DONCELLA.** [P. R.] Designa la *Byrsonima lucida*, Cand., 6 Sangre de doncella [V.]. Es la Carne de doncella en Cuba.  
**PALO DE GALLINA.** Tres plantas indígenas reciben tal nombre; 1) una *Solanea*; el *Lycium Aenistoides*, Gris., ó Arbol de la gallina y *Belladonna* de la tierra; 2) la *Byrsonima cinerea*, Cand., ó Peralejo blanco; y 3) la *Malpighia glabra*, Lin., ó Cerezo. Las dos últimas son *Malpighiaceas*.  
**PALO DE HIERRO.** [Cuba.] V. Cojoba, Lengua de vaca y Quiebra-hacha. [P. R.] La *Condalia ferrea*, Gris., *Rhamnea indígena*. (\*)  
**PALO DE HOZ.** [P. R.] El *Drepanocarpus lunatus*, Mey., *Leguminosa*. No se encuentra en Cuba.  
**PALO DE INCIENSO.** El *Amyris maritima*, Jacq., *Rutacea* indígena, nombrada también Cuabá de costa y Palo de resina. A esta especie se refiere el Incienso [V.] que cita Fernández.  
**PALO DE JAQUECA.** [P. R.] La *Majagua* de Florida en Cuba.  
**PALO DE LANZA.** La *Uvaria Richardia*, Moral, [*Asimina rhombifolia*, Gris.], ó Yaya [V.]  
**PALO DE LECHE.** Según Colmeiro, *Dicc. de nombres vulgares*, es plan-

(\*) En Cuba no existe esta especie, estando representado el género *Condalia* por la *C. species* [*Reynosia latifolia*, Gris.]; la *C. species* [*R. mucronata*, Gris.] y la *C. species* [*R. retusa*, Gris.], sin nombre vulgar ninguna.

- ta cubana, pero Sauvalle, *Flora cubana*, no la cita. Tal vez sea una mala denominación de nuestro Lechero: *Excæcaria Laurocerasus*. J. Müll. Es una Euphorbiacea. [P. R.] V. Palo boniato.
- PALO DE MARÍA.** [P. R.] El Ocuje de Cuba.
- PALO DE MATOS.** [P. R.] La *Ormosia dasycarpa*, Jacks, Leguminosa. No la hay en Cuba.
- PALO DE OREJA.** [P. R.] Rhizophoracea silvestre, lo mismo que en Cuba, donde no tiene nombre vulgar: es la *Cassipourea Guianensis*, Aubl.; β, elíptica, G.-M. (\*) [*Cassipourea*, Poir. *Legnostis*, Sw.]
- PALO DE PAN CIMARRÓN.** [P. R.] V. Palo amarillo.
- PALO DE PERONÍAS.** [P. R.] Leguminosa cultivada, lo mismo que en Cuba; es la *Adenanthera Pavonina*, Lin. En aquella isla se le dice, además, Coralitos, y en la segunda Coralillo [V.]
- PALO DE POLLO.** [P. R.] El *Pterocarpus Draco*, Lin., Leguminosa. No la hay en Cuba.
- PALO DE RAYO.** La *Cæsalpinia adnata*, G.-M. [*Peltophorum adnatum*, Gris.], ó *Moruro abey*, Leguminosa indígena. [P. R.] La *Parkinsonia aculeata*, Lin. ó *Espinillo* [V.] y *Junco marino* [V.] de Cuba.
- PALO DE RESINA.** V. Palo de incienso.
- PALO DE ROBLE.** V. Cuabá blanca. [*Amytis balsamifera*, Lin.]
- PALO DE ROSA.** [Fernández.]
- PALO DE ROSA DEL PAÍS.** V. Varía.
- PALO DE TORO.** [Cuba y P. R.] V. Café cimarrón.
- PALO DE YAIGUAJE.** [Colmeiro.] V. Yaicuaje.
- PALO DEL PAN.** [Fernández.] V. Arbol del pan.
- PALO DIABLO.** V. P..... de perro.
- PALO GERINGA.** V. Ben.
- PALO GUITARRA.** Dos Verbenaceas llevan este nombre: el *Citharexylon Berterii*, Spreng., ó *Roble amarillo* [V.]; y el *C. lucidum*, Cham., ó *Guáiro santo de costa* [V.]
- PALO HEDIONDO.** Leguminosa silvestre, la *Cassia emarginata*, Lin. En P. R. es el *Lonchocarpus latifolius*, Kth, Guamá de costa en Cuba.
- PALO JERINGA.** V. Ben.
- PALO LECHOSO.** La «*Tabernæmontana Berterii*, A. Cand.» *Apocynæa* silvestre?, también dicha *Lechoso*.
- PALO LLORÓN.** [P. R.] La *Guettarda species* [*Malanea macrophylla*, Bartl.], Rubiaceae silvestre. No existe en Cuba. [V. Llorón.]
- PALO MABÍ.** Otro nombre de una *Bijáguara* [V.], la *Colubrina Cubensis*, Brongn.
- PALO MORO.** Nombre de dos Rubiaceas indígenas: la *Psychotria Brownii*, Spreng., y la *Psychotria obovatis*, Rich. Ambas especies se incluyen modernamente, como las que siguen en el género *Uragoga*. En P. R. se aplica aquel nombre vulgar á las especies siguientes: *Psychotria grandis*, Sw.; *Psychotria undata*, Jacq.; *Psychotria brachiata*, Sw.; *Psychotria nutans*, Sw.; las cuales se encuentran en Cuba [V. Lengua de vaca.]; y en fin, á la *Uragoga pedunculata*, G.-M. (\*), y á la *U. Pseudopavetta*, G.-M. [V. pág. 85 (\*\*)], extrañas á la Flora de Cuba.

(\*) Hojas elípticas, comunmente acuminadas, enterísimas. Flores distintamente pediceladas; pétalos sub-palmado-fimbriados. Arbusto. Jamaica y otras Antillas.

(\*) Gén. *Uragoga*, Lin. = Sección *Euragoga*, H. B. = Sub-sección *Psychotria*. = ‡ *Psychotria*. = \* *Pedunculata*. = U. *pedunculata*, G.-M. [*Psychotria*, Sw. P. *atenuata*, Willd.] Mata lampiña ó pubescente. Tallo superíormente 4-gono. Hojas opuestas, largamente pecioladas, elíptico-oblongas, enteras, cartáceas, arquivenosas, agudas en am-

**PALO MONIATO.** V. Palo boniato.  
**PALO MULATO.** V. Hicaco de aura.  
**PALO NEFRÍTICO.** Leño medicinal, desusado actualmente, y suministrado por el *Moringa pterygosperma*, Gaertn. [V. Ben.]  
**PALO NEGRO.** ?

bas extremidades, lampiñas, pubescentes sobre las nervuras salientes en la cara inferior; estípulas deltoideas, agudas, unidas al principio, separadas después y cortas. Flores pequeñas, en grandes cimbras apanojadas, piramidales, densas, muy ramosas, terminales, de igual longitud que las hojas; bracteolas lanceolado-aleznadas al pié de las divisiones y 1 ó 2 al pié de las flores que son sentadas y axilares, las otras flores laterales y pediceladas tienen cada una 3 bracteolas óvalo-lanceoladas, mitad del largo del fruto y dispuestas de un solo lado; pedúnculo regularmente 5-surcado á lo largo. Corola pubescente en la garganta, lóbulos  $\frac{1}{2}$  del largo del tubo cilíndrico. Anteras oblongas. Fruto globoso, sub-comprimido lateralmente; pirenas con 5 crestas. Puerto-Rico, Jamaica y Barbadas. [Stahl, *Fl. P. R.*, V, 73: *Psychotria*, Sw.]

(\*\*) Gén. Uragoga, Lin., = Sección *Strempeha*, H. B., *Hist. pl.*, VII, 284. [Estípula ciliadas, truncadas en el ápice y sub-cartilaginosas. Cimbras florales umbeliformes. Pirenas separadas en el eje; contracciones interpirénicas profundas; crestas 3-5, á veces algo borradas.] = U. *Pseudo-Pavetta*, G.-M., [*Psychotria*, Bello.] Arbusto lampiño. Hojas opuestas, pecioladas, membranosas, elípticas ó elíptico-oblongas, agudas en ambas extremidades, arquivenosas, lampiñas; estípulas axilares, oblongas, aplicadas al tallo. Flores blancas; botones rosados en el ápice; pedicelos cortos y ternados en la punta de las divisiones de las panojas tricótomas, terminales, más cortas que las hojas, el pedúnculo más largo que el peciolo; pedicelos sin bracteolas ó éstas son rudimentarias. Cáliz pequeño, cilíndrico; campanulado, irregularmente dentado, siendo los 4 ó 5 dientes lanceolados, agudos. Corola hipocraterimorfa; tubo largo y delgado, ligeramente arqueado, muy poco dilatado en la garganta; limbo 5-partido, divisiones valvares, lanceoladas, engrosadas en el ápice Estambres 5, sub-sentados, lineares en la base, azaetados, insertos en la garganta de la corola y nada exsertos. Ovario bilocular, celdas 1-ovuladas: estilo al canza á las anteras; estigma con 2 divisiones ovales. Baya globosa, comprimida lateralmente y surcada á lo largo, tiene persistente al cáliz y se muestra estrechada en la comisura; las dos pirenas son plano-convexas, con 3-5 crestas pronunciadas. Puerto-Rico. [Stahl, *loc. cit.*, 76: *Psychotria*, Bello.]

**PALO SANTO.** El *Jatropha peltata*, Sauval, Euphorbiaceae endémica. [V. Guayaacán.]

**PALO TORCIDO.** V. Lebrero.

**PAN DE MONO.** V. Baobab.

**PAN PORCINO.** Primulaceae cultivada, el *Cyclamen Europæum*, Lin., dicho también *Solitaria*.

**PÁNDANO.** s. m. El *Pandanus gracilis*, Blanco planta cultivada, originaria de Filipinas.

**PÁNDANO-CARACOLILLO.** Se da en Cuba tal nombre á una *Pandanea* malgache, dicha en su país *Bacquoás*, *Vaquoás* ó *Vaquoás*. Es una planta dioica, lo que explica el nombre de Palma de caracol, macho y hembra, con que se denomina esta especie en Fernández; el primer nombre corresponde al individuo de flores estaminadas y el segundo al de flores pistiladas.

**PANETELA.** s. f. Euphorbiaceae indígenas; el *Phyllanthus angustifolius*, Sw., y el *Phyllanthus*, *Epiphyllanthus*, Lin.

**PANETELA-PANAMÁ.** Polygonacea cultivada, la *Muehlenbeckia platyclada*, Meissner. [*Coccoloba platyclada*, J. Müll.]

**PANTOMIMA.** s. f. V. *Vejiga de Perro*. [*Physalis pubescens*, Lin.]

**PAO DE LACRE.** V. Lacre.

**PAPA.** s. f. *Solanea* cultivada, el *Solanum tuberosum*, Lin.

**PAPAGAYO.** s. m. V. Guacamaya y Malanga.

**PAPAYA.** s. f. [Cuba y P. R.] *Bixa silvestre*, la *Papaya Carica*, Gaertn. [*Carica Papaya*, Lin.], dicha también Fruta bomba. Es planta dioica, por lo que muchos llaman *Papaya macho* al individuo de flores estaminadas y *Papaya hembra* al de flores pistiladas. En P. R. le dicen, además, *Lechosa* [V.].

**PAPAYA CIMARRONA.** La *Papaya Prosoposa*. [*Carica Prosoposa*, Lin.]

- PAPAYA HEMBRA.** V. Papaya.
- PAPAYA MACHO.** V. Papaya.
- PAPAYINA.** s. f. Es el látex de la Papaya.
- PAPELERA.** s. f. V. Bejuco de perdiz.
- PAPITO DE LA REINA.** V. Papo de la reina.
- PAPO DE YEGUA.** *Herpyza grandiflora*, Sauval.
- PAPO DE LA REINA.** La *Fagelia bituminosa*, Cand., ó Papito de la reina. Es una Leguminosa cultivada.
- PARAISO.** s. m. La *Melia Azederach*, Lin., Meliacea cultivada. No debe confundirse esta especie con la *Melia sempervirens*, Sw., ó Cinnamon. El Paraíso se llama también Prusiana, y presenta una variedad enana.
- PARAISO DE MÉJICO.** V. Ateje amarillo.
- PARAISO ENANO.** V. Paraíso.
- PARAISO FRANCÉS.** V. Ben.
- PARCHA.** s. f. [P. R.] *Passiflora* no cubana, la *Passiflora Laurifolia*, Lin.
- PARCHA ANGOSTA.** [P. R.] V. Huevo de gallo.
- PARCHA CIMARRONA.** [P. R.] V. Granadilla de mono.
- PARCHA COLORADA.** [P. R.] V. Pasionaria de cerca.
- PARCHA DE GAJOS.** [P. R.] La *Passiflora serrata*, Lin., especie no cubana.
- PARCHA OJILLOSA.** [P. R.] V. Pasionaria vejigosa.
- PARCHA PÁLIDA.** [P. R.] V. Huevo de gallo.
- PARCHA PELITESA.** [P. R.] La *Passiflora hirsuta*, Lin., especie no cubana.
- PARCHA YEDRA.** [P. R.] V. Huevo de gallo.
- PARREIRA BRAVA.** El *Cissampelos Pareira*, Lin., *Menispermia* silvestre. También su variedad  $\gamma$ , Gris, [*Cissampelos Caapeba*, Lin.] [V. Bejuco de mona.]
- PARIETARIA.** s. f. Urticacea indígena, la *Pilea glomerata*, Gris. [*Pilea Parietaria*, Gris, non Blume.]
- PARRA CIMARRONA.** El *Vitis Labrusca*, Lin., y el *Vitis Caribæa*, Cand., llamado Bejuco de agua en P. R., y también Parra cimarrona.
- PARRITA CIMARRONA.** V. Bejuco ubí macho. [*Parthenocissus quinquefolia*, Planchon.]
- PARRITA DE PLAYA.** *Vitea* indígena, el *Ampelopsis bipinnata*, Michx. [*Vitis bipinnata*, Torr. & Gray.]
- PARTHENICINA.** s. f. V. Parthenina.
- PARTHENINA.** s. f. Derivado químico, tal vez alcalóide, de la Escoba amarga. Posteriormente, su mismo descubridor, Dr. Ulrici, le ha nombrado Parthenicina.
- PASA DE NEGRO.** Con este nombre, y los de Flor de aura y Lengua de vaca [V.], se conoce una Aroidea indígena, el *Anthurium crassinervium*, Schott. También se llama Pasa de negro á una Filicinea de la familia Polypodiaceas: el *Asplenium* [ó *Asplenium*] *Plantagineum*, Lin.
- PASCUETA.** s. f. [P. R.] *Achicoria* silvestre en Cuba.
- PASCUETA AMARILLA.** [P. R.] El *Eriogon rivularis*, Sw., Compuesta silvestre en ambas islas, careciendo de nombre vulgar en Cuba.
- PASIONARIA.** s. f. Este nombre se aplica á la *Passiflora reticulata*, Sauval., *Passiflora* endémica. También designa cuatro especies cultivadas: *Passiflora quadrangularis*, Lin., silvestre en P. R., donde le dicen Granadilla; *Passiflora alata*, H. K.; *Passiflora Brasiliana*, H. P., y *Passiflora amabilis*, Hook.
- PASIONARIA DE CERCA.** La *Passiflora Berteriana*, Balb.; la *Passiflora sexiflora*, Juss.; y la *Passiflora rubra*, Lin. En P. R. existe esta última especie, nombrándose Parcha colorada. [V. Huevo de gallo y Pasionaria vainilla.]



- PASIONARIA DE LA CANDELARIA.** La *Passiflora ciliata*, Ait.
- PASIONARIA DE LAS POZAS.** La *Passiflora stipulata*, Aubl. ?
- PASIONARIA HEDIONDA.** V. *Pasionaria vejigosa*.
- PASIONARIA HEDIONDA, FLOR CARMÍN.** V. *Pasionaria vejigosa*.
- PASIONARIA VAINILLA.** La *Passiflora multiflora*, Lin., ó *Pasionaria* de cerca [V.].
- PASIONARIA VEJIGOSA.** La *Passiflora foetida*, Lin. [V. *Tagua-tagua*.], y la *Passiflora penduliflora*, Berter, dichas, además, *Pasionaria hedionda*. Iguales nombres se dan á la *Passiflora oblongata*, Sw., y á la *Passiflora Murucuja*, Lin., dichas también *Pasionaria hedionda*, flor carmín. La última especie se nombra *Murucuya* en Cuba y *Parcha-ojillosa* en P. R.
- PATA DE GALLINA.** Dáse este nombre á las siguientes Gramineas silvestres: *Eragrostis nitida*, Chapm.; *Leptochloa virgata*, Beauv.; y *Eleusine Indica*, Gærtn.
- PATA DE PICHÓN.** [Sauvalle. ] ?
- PATABÁN.** s. m. Combretacea silvestre, la *Laguncularia racemosa*, Gærtn. Nómbrase, además, *Mangle bobo*. En P. R. le dicen *Mangle blanco* [V.].
- PATANA.** s. f. Cactea indigena, el *Cereus eriophorus*, Link & Otto. [V. *Patanco*.]
- PATANCO.** [Pichardo.] Especie enigmática, dicha también *Saetilla* y *Patana*, pero hay otra *Patana* [V.], de la cual quizá deba distinguirse.
- PATCHOULY.** s. m. En Cuba no existe la planta que tiene este nombre vulgar en la India; en cambio, es conocida la esencia que suministra. La indicada planta es el *Pogostemon Patchouly*, Pell., de la familia Labiadas.
- PATILLA.** s. f. [P. R.] V. *Melón de agua*.
- PAVONA.** s. f. [P. R.] *Mar Pacifico* en Cuba.
- PAVONA ENCENDIDA.** [P. R.] Es el *Hibiscus radiatus*, Cav., Malvacea no cubana.
- PEDO DE CHINO.** El *Agdestis Clematidea*, Moç. & Sess., Phytolacceacea cultivada, también llamada *Yedra* [V.].
- PEGA-PALMA.** [P. R.] *Ternstroemia* silvestre, la *Maregravia umbellata*, Lin. En Cuba no tiene nombre vulgar.
- PEGA-PEGA.** El *Desmodium Cubense*, Gris. [V. *Amor seco*.]
- PEGOJO.** s. m. V. *Huevo de gallo*.
- PENDA.** s. f. *Verbenacea* silvestre, el *Citharexylon caudatum*, Lin.
- PENDANGA.** s. f. Nombre villaclareño del fruto de diversas *Pasionarias*.
- PENDEJERA.** s. f. El *Solanum torvum*, Sw. Es más aceptable el otro nombre que tiene, *Prendedera*.
- PENDEJERA MACHO.** Este y los nombres de *Prendedera macho* [V.], *Prendedera hedionda* y *Tabaco cimarrón* [V.], se usan para designar el *Solanum verbascifolium*, Lin.
- PENDEJO DE PERRO.** [Pichardo.] Otro nombre del *Tostón* ? [Boerhaavia viscosa, Lagasca.]
- PÉNDOLA.** s. f. El *Ecastaphyllum Brownii*, Pers., *Maray-maray* en P. R.; el *Ecastaphyllum monetaria*, Cand.; la *Dalbergia amerimnum*, Benth. [Pichardo.] V. *Bejuco seriná*. [V. *Palo de Brasilete*.]
- PENIPENICHE.** s. m. V. *Manzanillo*.
- PEONÍA.** s. f. La *Rhynchosia parvifolia*, Lin., Leguminosa silvestre.
- PEONÍA BLANCA.** *Rhynchosia reticulata*, Cand.
- PEONÍA CHICA.** *Rhynchosia minima*, Cand.
- PEONÍA CRIOLLA.** *Rhynchosia Phaeoloides*, Cand.
- PEONÍA DE SABANA.** *Rhynchosia Caribæa*, Cand.
- PEONÍA DE SAINT-THOMAS.** Legumino-

- sa silvestre, El *Abrus precatorius*, Lin., ó *Jequirity*. En P. R. le dicen Peronía.
- PEPINILLO. s. m. [P. R.] La *Melothria Fluminensis*, Gardn., Cucurbitacea. En Cuba carece de nombre vulgar.
- PEPINO. s. m. *Cucumis sativus*, Lin., Cucurbitaceas.
- PEPINO ANGOLO. [P. R.] La *Sicana odorifera*, Naud., Cucurbitacea no cubana.
- PEPINO CIMARRÓN. *Cucumis Anguria*, Lin., Cucurbitacea cultivada, lo mismo que en P. R., donde le dicen Concombro.
- PEPITA AMARGA. [P. R.] V. Jabilla. [*Feuillea cordifolia*, Sw.]
- PEPÚ. [Pichardo.]? Se dice también Colonia, Boca de lobo, Lengua de lobo y Lobo.
- PERA DE LA MAR. La *Genipa Clusiafolia*, Gris., ó *Jagua amarilla* y *Jagua de costa*, Rubiaceae silvestre.
- PERALEJO, s. m. La *Byrsonima crassifolia*, K<sup>th</sup> [*Byrsonima Pine-netorum*, Wt.], Malpighiaceae indígena.
- PERALEJO BLANCO. V. Palo de gallina.
- PERALEJO DE MONTE. La *Byrsonima Cubensis*, Juss.
- PERALEJO DE PINARES. Malpighiaceae silvestre, como en P. R., donde le dicen *Maricao*: es la *Byrsonima spicata*, Rich.
- PERALEJO VELLUDO. [P. R.] El *Heteropteris Laurifolia*, Juss., Malpighiaceae.
- PEREGIL. s. m. Umbellifera cultivada, el *Carum Petroselinum*, Benth. & Hook.
- PEREGIL DE COSTA. Chenopodiaceae indígena, la *Iresine vermicularis*, Moq., ó *Verdolaguilla blanca*.
- PEREGIL ISLEÑO? El *Cenante Peucedanifolia*, Poll., Umbellifera cultivada.
- PEREGRINA. s. f. Dáse este nombre á las siguientes Euphorbiaceas indígenas: 1) *Jatropha diversifolia*, Rich. [*Jatropha hastata*, Gris., non Jacq., *Jatropha integerrima*, Jacq.] 2) *Jatropha panduræfolia*, Andr. [*Jatropha hastata*, Jacq.] 3) *Jatropha pauciflora*, Gris., 4) *Jatropha Tupifolia*, Gris. [Colmeiro.] El *Hibiscus Phæniceus*, Jacq., Malvaceae silvestre, como en P. R., donde le dicen *Malvavisco purpúreo*.
- PEREGRINA DEL PINAR. Este nombre se aplica á una Euphorbiaceae indígena, que posee dos variedades; es el *Jatropha angustifolia*, J. Müll.;  $\alpha$ , *spathulata* [*Jatropha glauca*, Gris.]; y  $\beta$  genuina. [*Jatropha angustifolia*, Gris.]
- PEREJIL DE COSTA. [Pichardo.] V. Perejil de costa.
- PERGIL DE LA PLAYA. [Pichardo.] Es el *Peregil de costa* [V.]
- PERLAS? V. Viznaga.
- PERLITAS. Rubiaceae silvestres, la *Uragoga acuífolia*, G. M. (\*)
- PERONÍA. s. f. [P. R.] V. Peonía de Saint-Thomas.
- PETREA. s. f. Verbenaceae cultivada, la *Petrea volubilis*, Jacq.
- PETUNIA. s. f. La *Petunia Nyctaginiflora*, Juss., Solanaceae cultivada. Ofrece híbridos con una especie vecina.

(\*) Gén. *Uragoga*, Lin. — Sección *Margaritopsis*, H. B., *Hist. pl.*, VII, 286. [Gén. *Margaritopsis*, Sauval, *Fl. cub.*, 68.] Cáliz de tubo oboval, prolongado encima del ovario; limbo 4-fido, de segmentos aleznados. Corola tubuloso-campanuda, 4-lobada, valvar; lóbulos ovales, curvos en el ápice; tubo peludo interiormente. Estambres 4, insertos en la mitad del tubo; anteras oblongas. Disco epigino, saliente. Estigmas 2, oblongos, exsertos. Ovario 2-locular; celdas 1-ovuladas; óvulo bicular, erguido ó ascendente hacia el ángulo interno de la celda. Drupa con dos pirnas plano-convexas, cartilaginosas, escabrosas. Embrión diminuto; embriobroma ó albumen, corneo. Sub-arbusto. Hojas chicas ovales, apenas pecioladas, estipuladas. Flores solitarias, axilares y terminales. Especie 1, de Cuba.] = *U. acuífolia*, G. M. [*Margaris nodiflora*, Gris., *Cat. pl. Cub.*, 134; non Cand., *Margaritopsis acuífolia*, Sauval, *loc. cit.* (Wt., *exsicata* n. 251.)] Caracteres de la sección.

- PHLOX.** s. m. Polemoniacea cultivada, el *Phlox Drummondii*, Hook. Presenta variedades crómicas.
- PICA-PICA.** La *Mucuna pruriens*, Cand., Leguminosa silvestre.
- P..... DE PERRO.** Nombre vulgar y obsceno de una Capparideá indígena, el *Capparis Cynophallophora*, Lin. También se llama Mostaza [V.] y Palo diablo, cuyos nombres deben preferirse. [V. Bejuco inglés.]
- PICHANA.** s. f. [P. R.] Malvacea silvestre, la *Wissadula rostrata*, Planch. [ó Benth. ?] [*Sida Periplocifolia*, Lin. *Abutilon Periplocifolium*, G. Don. *Wissadula Periplocifolia*, Thw.; Gris.]; var.  $\beta$ , *Caribæa*, G.-M. [*Sida Periplocifolia*, Lin.;  $\delta$ , *Caribæa*, Cand. *Sida Caribæa*, Sloan.], común á Cuba, donde carece de nombre vulgar. En esta última isla hay, además, la var.  $\delta$ , *Wrightiana*, G.-M. [*Wissadula Periplocifolia*, Gris.; var. *Wrightiana*, Gris.]; y la  $\epsilon$ , *Hernandioides*, G.-M. [*Sida*, L' Hérit. *Wissadula Periplocifolia*, Gris.; var. *Hernandioides*, Gris.] (\*)
- PICHANA MOCHA.** [P. R.] El *Abutilon leiostemum*, Gris., Malvacea no cubana. Debe ser una especie de *Wissadula*.
- PICO DE GALLO.** *Cynometra Cubensis*, Rich., Leguminosa silvestre.
- PICO DE GALLO LAUREL.** V. Cirio.
- PIEL DE MAJÁ.** V. Lengua de vaca.
- PILOCARPINA.** s. f. V. *Jaborandi*.
- PIMIENTA DE COSTA.** El *Piper sphaerocarpum*, C. Cand. y el *Piper Cubense*, C. Cand., Piperaceas silvestres.
- PIMIENTA DE GUINEA.** Anonacea cultivada, la *Xylopia Æthiopica*, Rich.
- PIMIENTA DE JAMÁICA.** V. Ausú.
- PIMIENTA DE PLAYA.** *Piper Richardsonum*, C. Cand., ó Chotillo.
- PIMIENTA MALAGUETA.** La *Uvaria Moralesi*, G.-M. [*Asimina neglecta*, Rich.] Es una Anonacea endémica.
- PIMIENTO.** s. m. El *Capsicum annuum*, Lin.
- PIMIENTO CIMARRÓN.** Myrtacea indígena, el *Myrtus leriocarpa*, Sauval. [*Ananomis ferruginea*, Gris.]
- PIMIENTO CIMARRÓN, DE ARROYO.** *Myrtus Guayabillo*, Sauval. [*Eugenia Guayabillo*, Rich. *Ananomis Guayabillo*, Gris.]
- PIMIENTO DE COSTA.** La *Eugenia cincta*, Gris., Myrtacea.
- PIMIENTO DE MONTE.** Myrtacea silvestre, la *Myrcia coriacea*, Cand. Se dice, además, Pimiento malagueta.
- PIMIENTO MALAGUETA.** V. Pimiento de monte.
- PINEDO.** s. m. Compuesta indígena, el *Melampodium humile*, Sw. [*Acanthospermum humile*, Cand.]
- PINEDO BLANCO.** La *Alternanthera spinosa*, Rœm. & Schult., Chenopodiacea silvestre.
- P..... DE GATO.** Nombre vulgar y obsceno de una Chenopodiacea indígena, el *Achyranthes aspera*, Lin. [*Achyranthes argentea*, Lam. *Achyranthes obtusifolia*, Lam.]
- P..... DE NEGRO.** Nombre vulgar y obsceno, poco usado, de una Aroidéa cultivada, la *Dieffenbachia seguina*, Schott. [*Caladium seguinum*, Vent.]
- PINIPINI.** s. m. El *Ficus lævigata*, Vahl, Urticacea silvestre, nombrada también Jagüey hembra [V.]
- PINIPINICHE.** s. m. V. Manzanillo.

(\*) Las var.  $\alpha$  [*Wissadula Zeylanica*, Medik.] y  $\gamma$  no son cubanas ni puerto-riqueñas. Queda por fijar si son sinónimos de la *Wissadula rostrata*, Planch., las especies nombradas *Abutilon laxiflorum*, Guil.; *A. parviflorum*, S. -Hil.; *Sida excelsior*, Cav.; *S. heterosperma*, Hochst.; *Wissadula excelsior*, Presl. En Cuba existe otra especie además de la de Planch.; la *W. spicata*, Presl, extraña á la Flora de P. R.

- PINTO DE FLOR.** V. Zarapico.
- PINO.** s. m., Casuarinea naturalizada, la Casuarina Equisetifolia, Lin. Le dicen también Pino-Chipre, Pino de Australia, Pino de la Nueva Holanda y Casuarina. En Nueva Zelandia le llaman Filao. Igualmente se dice Pino á una Conifera dudosa en Cuba, el Pinus Occidentalis, Sw.
- PINO-CHIPRE.** [Morales, *Repertorio.*] V. Pino.
- PINO DE AUSTRALIA.** V. Pino.
- PINO DE MONTE.** V. Cirio. [Xylopia glabra, Lin.]
- PINO DE LA NUEVA HOLANDA.** V. Pino.
- PINO TEA.** Conifera cultivada, el Pinus Tæda, Ait. Su madera sirve en la Florida para confeccionar una de las suertes de tablas ó tabloncillos llamados Flooring-board [V.]
- PINO TEA DE FIBRA RECTA.** [Repertorio.] Pinus Serotina, Michx., Conifera cultivada?
- PINO TEA NUDOSO.** ?
- PIÑA BLANCA.** Bromeliacea cultivada, la Ananassa sativa, Lindl. También se llama Piña criolla, Piña de la Habana, y Piña de la tierra. Actualmente es Ananas species.
- PIÑA CIMARRONA.** [Lachaume, *Téxtiles.*]?
- PIÑA CRIOLLA.** [Bachiller.] V. Piña blanca.
- PIÑA CUBANA.** V. Piña morada.
- PIÑA DE CERCA.** [Morales.] V. Piña de ratón. [Bromelia Pinguin, Lin.]
- PIÑA DE CUBA.** V. Piña morada.
- PIÑA DE RATÓN.** La Bromelia Pinguin, Lin., Bromeliacea indígena, dicha además Maya y Piña de cerca.
- PIÑA DE LA HABANA.** V. Piña blanca.
- PIÑA DE LA TIERRA.** [Pichardo.] V. Piña blanca.
- PIÑA MORADA.** Bromeliacea indígena, erróneamente considerada como de cultivo, la Ananas Cubense, G.-M. [Ananassa sativa, Lindl.; Cubense, Moral.] Se dice además Piña cubana ó Piña de Cuba, y es á élla á quien corresponde con propiedad el nombre indo-americano de Anana. [V. Boniama, Yayagua y Yayama.]
- PIÑA RATÓN.** V. Piña de ratón.
- PIÑA RATÓN, ARBUSTO.** Rubiacea indígena, la Morinda Royoc, Lin., ó Raíz de indio. [V. Ruibarbo de la tierra.]
- PIÑIPIÑI.** s. m., Celastracea indígena, el Elaodendron attenuatum, Rich. En P. R. le dicen Cocorroncito.
- PIÑIPIÑI DE SABANA.** V. Almendrillo de costa.
- PIÑÓN BOTIJA.** El Jatropha Curcas, Lin. [Curcas purgans, Adans.], Euphorbiacea, dicha también Piñón purgante.
- PIÑÓN DE COSTA.** La Erythrina Corallodendron, Lin., Leguminosa indígena. Se nombra, además, Búcare espinoso y Piñón espinoso.
- PIÑÓN DE CUBA.** [Colmeiro.] «Erythrina mitis, Jacq.» Leguminosa.
- PIÑÓN DE PUÑAL.** [Pichardo.] Otro nombre de la Yucca gloriosa, Lin. [V. Espino.]
- PIÑÓN DE SIERRA.** Leguminosa endémica, la Erythrina Cubensis, Sauval. [Erythrina Corallodendron, Gris; non Lin. Erythrina enneandra, Cand.?]
- PIÑÓN ESPINOSO.** V. Piñón de costa.
- PIÑÓN FRANCÉS.** La Erythrina Crista-Galli, Lin., Leguminosa.
- PIÑÓN INGLÉS.** V. Piñón real.
- PIÑÓN PLUMAGO.** La Gliciridia Cubensis, G.-M. & Molt [Robinia? Cubensis, Kth. Gliciridia Cubensis, Sauval. Lonchocarpus Cubense, Rich.], Leguminosa indígena, dicha también Piñón violento.
- PIÑÓN PURGANTE.** V. Piñón botija.

- PIÑÓN REAL. La *Erythrina velutina*, Willd., ó Piñón inglés. Es una Leguminosa.
- PIÑÓN VIOLENTO, V. Piñón plumago.
- PIÑÓN VÓMICO. [Pichardo.] Euphorbiacea cultivada, el *Jatropha multifida*, Lin., ó Chayo, Don Tomás y Nuez vómica cubana.
- PIÑUELA. s. f. Bromeliacea indígena, el «*Nidularium Karatas*, Lem.» ó Piñuela santa. Hoy es Karatas species. Su nombre tainó es Carata ó Karata.
- PIÑUELA SANTA. [Morales.] V. Piñuela.
- PIPA DE TURCO. ?
- PIRIQUETA. s. f. [P. R.] Bixacea silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es la *Turnera Cistoides*, Lin. [Piriqueta Cistoides, Mey.]
- PISCUALA. Corrupción del término *Quisqualis* [V.]
- PITA. s. f. Amaryllidea indígena, la *Fourcroya Cubensis*, Haw. [Agave Cubensis, Jacq.], ó Heniquén, Jeniquén, Cocuisa, Cocuy y Maguey de cocuy [V.]
- PITAHAYA. s. f. Cactea indígena, el *Cereus Pitajaya*, Cand., ó Pitajaya [V.]. [V. Agoreros.]
- PITAJAYA. s. f. V. Pitahaya. En P. R. se da ese nombre al «*Cereus triangularis*, Haw.» cultivado en Cuba, donde se llama Flor del cáliz [V.]
- PITAJONI. s. m. [Fernández, n. 509.] V. Pitajoni cimarrón y Pitajoni hembra.
- PITAJONI BRAVO. V. Agalla de costa.
- PITAJONI CIMARRÓN. Rubiaceae indígena, la *Amaioua fagifolia*, Desf., ó Palo café y Pitajoni macho.
- PITAJONI ESPINOSO. V. Agalla de costa.
- PITAJONI HEMBRA. Rubiaceae indígena, la *Amaioua edulis*, H. Ba [Alibertia edulis, Rich.], ó Pitajoni [V.]
- PITAJONI MACHO. V. Pitajoni cimarrón.
- PITANGUEIRA. s. f. [P. R.] La *Eugenia Porto-Riccensis*, Cand., Myrtaceae no cubana.
- PITILLO. s. m. V. Cañutillo.
- PITO. s. m. V. Cresta de gallo [Sloanea Curatellifolia, Gris.] y Bambú.
- PLATANILLO. s. m. Leguminosa indígena, la *Cassia lineata*, Sw. La *Cassia hirsuta*, Lin. f., y la *Cassia Occidentalis*, Lin., no se llaman Platanillo, como dice Colmeiro, sino la primera Yerba hedionda velluda y la segunda Yerba hedionda [V.] y Brusca.
- PLATANILLO DE CUBA. *Piper geniculatum*, Sw.; *Piper hirsutum*, Sw.; *Piper angustifolium*, R. & Pav.; y *Piper obtusum*, C. Cand.; Piperaceas silvestres. [V. Platanillo de monte y Bayuyo.
- PLATANILLO DE CUBA, DE HOJAS OVALADAS. *Piper Swartzianum*, C. Cand., Piperaceae indígena.
- PLATANILLO DE MONTE. La *Canna coccinea*, Ait., y la *Canna Indica*, Lin., Scitamineas silvestres. La primera especie se dice también Platanillo de monte, de flor colorada y Platanillo de Cuba [V.]. La segunda especie suele sobrenombrarse Platanillo de Cuba [V.] y Flor de cangrejo.
- PLATANILLO DE MONTE, DE FLOR COLORADA. V. Platanillo de monte.
- PLATANILLO DE LA ISLA DE PINOS. Piperaceae silvestre, el *Piper tuberculatum*, Jacq.
- PLÁTANO. s. m. Scitaminea cultivada, la *Musa Paradisiaca*, Lin. Ofrece numerosas variedades. [V. Banano.]
- PLÁTANO BOBO. ?
- PLÁTANO CONGO. La *Musa regia*, Rumph., Scitaminea cultivada. Se dice también Plátano dátil, Plátano domínico, Plátano hembra y Plátano manchado.



- PLÁTANO CRIOLLO, HEMBRA.** *Musa Paradisiaca*, Lin.; variedad microcarpa.
- PLÁTANO CRIOLLO, MACHO.** *Musa Paradisiaca*, Lin.; variedad macrocarpa.
- PLÁTANO DÁTIL.** V. Plátano congo.
- PLÁTANO DEL ORINOCO.** *Musa roseacea*, Jacq. [*Musa discolor*, Hort.], *Scitaminea* cultivada.
- PLÁTANO DOMÍNICO.** V. Plátano congo.
- PLÁTANO GUINEO.** *Musa Paradisiaca*, Lin.; variedad orthocarpa. [*Musa Sapientium*, Lin.]
- PLÁTANO HEMBRITA.** V. Plátano congo.
- PLÁTANO MANCHADO.** V. Plátano congo.
- PLÁTANO OCCIDENTAL Ó DE VIRGINIA.** *Platanea* cultivada, el *Platanus vulgaris*, Spach; variedad *Occidentalis*, Spach.
- PLÁTANO ORIENTAL.** *Platanea* cultivada, el *Platanus vulgaris*, Spach; variedad *Vitifolia*, Spach.
- PLÁTANO SALVAJE.** *Scitaminea* cultivada, la *Musa Troglodytarum*, Lin.
- PLÁTANO SILVESTRE.** *Scitaminea* indígena, la *Heliconia Bihai*, Lin. [V. Bihaos.]
- PLUMA.** s. f. [Pichardo.] ?
- PLUMA DE ORO.** [Pezuela.] V. Vara de oro.
- PLUMA DE SANTA TERESA.** *Cactea* cultivada, el *Epiphyllum speciosum*, Haw. [*Cereus Phyllanthoides*, Cand.]
- PLUMERITO.** s. m. La *Polygala globulidiata*, Kth, *Polygala* indígena, y *Solidago virgata*, Michx., Compueta.
- POAYA.** s. f. [P. R.] El *Spermacece Porto-Riccensis*, Cand., *Rubiacea* no cubana.
- POBLADORA.** s. f. Nombre de diversas variedades de *Verbenas* hortícolas.
- POJA.** [Pichardo.] ?
- POLÍGALA.** s. f. *Polygalea* indígena, la *Polygala longicaulis*, Kth.
- PÓLIPO HERBACEO.** V. Prodigiosa.
- POLIPOBIO COLGANTE.** El *Polypodium suspensum*, Lin.; variedad *brachilobum*, Gris, ó *Polipodio* de playa. Es una *Filicinea* de la familia de las *Polyodiaceas*.
- POLIPODIO DE PLAYA.** V. *Polipodio* colgante.
- POMA ROSA.** s. f. La *Eugenia Jambos*, Lin. [*Jambosa vulgaris*, Cand.], *Myrtacea* silvestre.
- POMA ROSA CIMARRONA.** La *Eugenia Jambosoides*, Wr., *Myrtacea* endémica.
- PONASÍ.** s. m. La *Hamelia patens*, Jacq., *Rubiacea* indígena, que se dice también *Bonasí*, Coral y Palo de coral. En P. R. le dicen Bálamo colorado.
- PONASÍ AMARILLO.** La *Hamelia lutea*, Rohr. En P. R. le dicen Bálamo amarillo.
- PRENDEDERA.** s. f. V. Pendejera.
- PRENDEDERA HEDIONDA.** V. Pendejera macho.
- PRENDEDERA MACHO.** El *Solanum Callicarpæfolium*, Kth & Bouché. [V. Pendejera macho.]
- PRINGA-MOZA.** El *Platygyne pruriens*, H. Bk. [*Platygyne hexandra*, J. Müll., *Platygyne urens*, Mercier. *Tragia pruriens*, Willd., *Euphorbiacea* indígena.]
- PRODIGIOSA.** s. f. *Crassulacea* silvestre, el *Bryophyllum calycinum*, Salisb. Esta planta recibe, además, los nombres de Hoja bruja, Inmortal [V.], Pólipo herbáceo, Siempreviva [V.] y Vívora. En P. R. se llama Bruja [V.]
- PRUSIANA.** s. f. V. Paraíso.
- PUERRO COMÚN.** V. Ajo porro.
- PURIO.** s. m. La *Óxandra Laurifolia*, Rich. [V. Yaya.] El *Ampelocera Cubensis*, Gris.
- PURÍSIMA.** s. f. V. Vicaria.

Q

- QUASI. V. Quasia.
- QUASIA. s. f. Nombre de la Quassia amara, Lin., Simarubea cultivada.
- QUENEPAS. [P. R.] Mamoncillo en Cuba [V.].
- QUIBEY. s. m. V. Revienta caballos.
- QUIEBRA HACHA. Leguminosa indígena, la Copaifera Hymenæfolia, Moric. [Hymenæa Courbaril, Gris.] Recibe, además, los nombres de Jabí, Caguairán, Cojoba [V.] y Palo de hierro. [V. Caquirau.]
- QUIEBRA HACHAS. [P. R.] V. Palo de caja.
- QUIMBOMBÓ. s. m. Malvacea cultivada, el Hibiscus esculentus, Lin. Algunos dicen Bombó. En P. R. le nombran Guingambó. Su fruto es el Nafé de los árabes, los que dan á la planta el nombre de Katmyeh.
- QUINA. s. f. Samydea indígena, la Guidonia parvifolia, G.-M. (\*) [Casearia parvifolia, Willd.; Casearia parviflora, Rich.; non Jacq.; non Lamk.; non Willd.; non Macf. Casearia decandra, Jacq. Casearia punctata, Spreng. Samyda parviflora, Lin.] En P. R. le llaman Gía mansa. También en Cuba se dice Quina á una Rubiacea silvestre, que otros nombran Vigueta [V.] y que es la Exoste-

(\*) Sección Iroucana, G.-M. [Casearia, sección Iroucana, Benth. & Hook., Gen. pl., 1, 796. Guidonia, secciones Euguidonia ó Iroucana, H. B., Hist. pl., IV, 307.] Estambres 8, raramente 10. Estilo indiviso. Fruto pulposo.

♀. Decantheras. Estambres fértiles 10.  
 ♂. parvifolia, G.-M. Arbusto lampiño. Hojas alternas, cortamente pecioladas, ovales, lanceoladas ó lanceolado-elípticas, lampifias, finamente dentadas ó aserradas, algo alargadas en el ápice y en la base, alguna vez con puntos traslúcidos; estípulas linear-oblon-

ma [ó Exostemma] floribundum, Roem. & Schult., ó Quina y Boje en P. R.

- QUINA DE LA TIERRA. V. Quina del país. [Tariri pentandra, H. Bn.]
- QUINA DEL PAÍS. La Galipea Ossana, Cand. Rutacea indígena. También el Tariri pentandra, H. Bn [Picramnia pentandra, Sw.], dicha Aguedita y Quina de la tierra, siendo una Simarubea indígena.
- QUINA PITÓN. V. Vigueta. [Exostemma floribundum, Roem. & Schult.]
- QUISQUALIS. s. m. Combretacea cultivada, el Quisqualis Indica, Lin. Muchos dicen Piscuala.
- QUITA-MERIENDAS. s. f. V. Villorita.
- QUITARÁN. s. m. [P. R.] Este nombre, y el de Abelluelo, se aplican á una Bijáguara [V.] cubana, la Colubrina ferruginea, Brongn.
- QUITASOLILLO. s. m. Umbellifera indígena, el Hydrocotyle umbellata, Lin., ú Ombliigo de Venus. En P. R. se nombra Yerba de cuarto [V.].

R

- RABANELA. [Fernández.] Ortografía errónea de Ravénala. Es la mal llamada Palma urania ó sea el Arbol del viajero [V.].
- RÁBANO DE AGUA. Crucifera silves-

gas, caducas. Flores 5 partidas, pequeñas blancas, cuyo olor recuerda el de la miel de abejas, reunidas en grupos multifloros axilares y alguna vez laterales; pedúnculo articulado cerca de la base. Estambres 10; filamentos pubescentes, acompañados de apéndices un tercio más cortos; anteras biloculares. Ovario simple; estilo sub-encorvado; estigma abotonado. Baya globosa, de regular tamaño, blanco amarillenta; mesocarpio amarillo ó anaranjado; semillas pocas; sabor agradable. Cuba, Puerto-Rico, Guadalupe, Saint-Thomas, Martinica.

- tre, el *Nasturtium palustre*, Cand.
- RABITO PELUDO.** Gramínea silvestre, la *Setaria glauca*, Beauv., ó *Almorejo*.
- RABO DE GATO.** Gramínea silvestre, el *Lappago racemosa*, Willd., [L. aliena, Spreng.] [V. Cola de caballo.]
- RABO DE ZORRA.** Gramínea cultivada, el *Erianthus Ravenna*, Beauv., [Saccharum, Lin.], ó *Torolico*. Gramínea silvestre, el *Panicum grossarium*, Lin. [V. Cola de caballo.]
- RABOJUNCO.** s. m. [P. R.] *Guacimilla del pinar* [V.] en Cuba.
- RACIMO DE RUBÍES.** Anacardiacea cultivada, el *Schinus Therebinthifolius*, Raddi.
- RAIZ AMERICANA.** V. Yuquilla.
- RAIZ DE CHINA.** Tres Liliaceas indígenas: el *Smilax Havanaensis*, Jacq.;  $\alpha$ , vulgaris, forma dentata y forma ovata; el *S. oblongata*, Sw., dichas las dos *Zarzaparrilla*; y el *S. Domingensis*, Willd., con su var.  $\beta$ , *Sagraana*.
- RAIZ DE INDIO.** V. Piña ratón, arbusto.
- RAIZ DE MADRÁS.** V. Yuquilla.
- RAMBUSTÁN.** s. m. El *Nephelium Lappaceum*, Lin., Sapindacea originaria de la India oriental y cultivada en Cuba.
- RAMIÉ.** s. m. Urticacea cultivada, la *Boehmeria nivea*, Hook. & Arn.; var. *candicans*.
- RAMO DE ORO.** V. Alelí amarillo.
- RAMÓN.** s. m. Urticacea silvestre, el *Trophis Americana*, Lin., ó *Ramón de caballos*.
- RAMÓN DE CABALLOS.** V. Ramón.
- RAMÓN DE COSTA.** El *Celtis trinervia*, Lam., ó *Ramón de playa*, Urticacea indígena.
- RAMÓN DE PLAYA.** V. Ramón de costa.
- RAMÓN DE VACA.** Nombre bayamés de una *Viboná* [V.].
- RANA.** s. f. Otro nombre del *Guayacancillo de costa* [V.].
- RAQUEL.** s. f. El *Nerine Sarniensis*, Herb. [Amaryllis, Lin.], ó *Hermosa Raquel*, *Amaryllidea* cultivada.
- RASCABARRIGA.** V. Arrayán.
- RASCABARRIGA AMARILLO.** Rubiacea indígena, la *Genipa calophylla*, G.-M., [Casasia, Rich., *Randia*, Gris.], ó *Arbol de la nuez y Guayacancillo de loma*.
- RASCABARRIGA BLANCO.** V. Arrayán.
- RASPA-LENGUA.** s. f. *Samydea* indígena, la *Guidonia hirsuta*, G.-M. (\*) [Casearia, Sw.]. También es otro nombre del *Azulejo bejuco* [V.].
- RAVÉNALA.** s. f. V. *Arbol del viajero*.
- REINA DE LAS FLORES.** [P. R.] *Cactea silvestre?*, no cubana, el *Cereus grandiflorus*, Haw.
- REINA MARGARITA.** V. *Extraña-rosa*.
- REMOLACHA.** s. f. *Chenopodiacea* cultivada, la *Beta vulgaris*, Moq.; var. *rapa*. En Cuba se cultivan las sub-variedades siguientes: *Remolacha blanca de azúcar* ó *R. de Silesia*; *R. amarilla de Alemania*; *R. amarilla de Castelmandarg*; *R. globosa roja*; *R. larga rosada*; *R. larga violacea*; y *R. larga roja*.
- REMOLACHA AMARILLA DE ALEMANIA.** V. *Remolacha*.
- REMOLACHA AMARILLA DE CASTELMANDARG.** V. *Remolacha*.
- REMOLACHA BLANCA DE AZÚCAR.** V. *Remolacha*.

(\*) G. [Iroicana.  $\delta$ . *Decantheras*. V. *Quina*.] *hirsuta*, G.-M. Arbusto. Hojas ovales, acuminadas, dentado-serradas, erizadas, velludas inferiormente. Flores 5-partidas, pubescente-velludas; pedicelos laterales, 1-flores. Jamaica, Santo Domingo.

$\delta$ , *glabrata*, G.-M. [*Casearia hirsuta*, Sw.;  $\beta$ , *glabrata*, Cand. (Es erróneo *C. glabrata*, Cand., citado por Stahl, Fl. P. R., IV, 29)]. Hojas adultas completamente lampiñas. Puerto-Rico.

- REMOLACHA DE SILESIA. V. Remolacha.
- REMOLACHA GLOBOSA ROJA. V. Remolacha.
- REMOLACHA LARGA ROJA. V. Remolacha.
- REMOLACHA LARGA ROSADA. V. Remolacha.
- REMOLACHA LARGA VIOLACEA. V. Remolacha.
- RESEDÁ. s. f. La Reseda odorata, Lin., Resedacea africana, cultivada en Cuba. Es erróneo el nombre de Resedán.
- RESEDÁ FRANCESA. [Cuba y P. R.] Lythracea cultivada, la Lawsonia alba, Lamk. [L. inermis, Lin., L. spinosa, Lin.] Es el célebre Hené de los árabes.
- RESEDÁN. V. Resedá.
- RETAMA. s. f. [P. R.] Leguminosa, silvestre, no cubana, la Sabinea florida, Cand. También un Carbo-nero [V.] de Cuba: la Cassia biflora, Lin.
- RETAMA ÁRBOL. Compuesta silvestre, el Senecio plumbeus, Gris.
- RETAMA ARBUSTO. Compuesta silvestre, la Neuroleña lobata, R. Br., ó Romerillo [V.] y Salvia cimarrona [V.]. En P. R. le dicen Sepí.
- REVIENTA CABALLOS. Lobelia indígena, el Isotoma longiflora, Presl, ó Quibey y Tibey.
- RÍCINO. s. m. V. Palma-Christi.
- ROBLE AGALLA. V. Agalla.
- ROBLE AMARILLO. V. Agalla y Palo guitarra.
- ROBLE BLANCO. V. Roble de yugo.
- ROBLE DE OLOR. Bignoniacea indígena, la Catalpa punctata, Gris, y su var. pubescens, Gris.
- ROBLE DE YUGO. El Tecoma pentaphylla, Cand., ó Roble blanco, Bignoniacea rústica.
- ROBLE GUAYO. Dos Verbenaceas indígenas: 1) Clerodendron Lindenianum, Rich., [C. tuberculatum, Rich. ?]; 2) Petitia Pœppigii, Schauer. [Callicarpa cinerea, Rich. ?]
- ROBLE GÜIRO. El Vitex umbrosa, Sw., Verbenacea silvestre. [V. Ofón criollo.]
- ROBLE NEGRO. V. Ateje.
- ROBLE PRIETO. Boraginea silvestre, la Ehretia Tinifolia, Lin.
- ROBLE REAL. Bignoniacea indígena, la Tecoma longiflora, Gris.
- ROBLE SABANERO. V. Sabanero.
- ROMERILLO. s. m. Compuesta silvestre, el Bidens leucantha, Willd., ó Romerillo blanco, dicho Men-trasto en P. R. [V. Retama arbusto.]
- ROMERILLO BLANCO. V. Romerillo.
- ROMERILLO CIMARRÓN. Compuesta silvestre, la Lagascea mollis, Cav.
- ROMERILLO DE COSTA. El Bidens Coreopsidis, Cand., Compuesta silvestre, dicha en P. R. Manzanilla trepadora.
- ROMERILLO DE LOMA. El Bidens bipinnata, Lin., var. [B. Cynapiifolia, Kth.], Compuesta silvestre. El tipo específico es la Manzanilla negra de P. R.
- ROMERO CIMARRÓN. Compuestas silvestres: Pectis ciliaris, Lin.; P. Cubensis, Gris.; P. pratensis, Sauval; P. punctata, Jacq., especie común á P. R., donde carece de nombre vulgar; y P. Plumieri, Gris. [P. floribunda, Rich.] [V. Flor de San Juan.]
- ROMERO MACHO. El Pectis prostata, Cav., Compuesta silvestre.
- ROMPE-HUESO. s. m. Samydea indígena, la Guidonia sylvestris, G. M. [Casearia sylvestris, Sw.] El tipo de la especie no existe en P. R., sino la var.  $\beta$ , platyphylla, G. M. [Casearia sylvestris, Sw.;  $\beta$ ? platyphylla, Cand.], sin nombre vulgar y no cubana. El Rompe-hueso se llama, además, Aguedita blanca, Llorón [V.], Palo cotorra Sarna, Sarna de perro y Sarnilla, presentando dos var. endémicas

en Cuba:  $\gamma$ , Myricoides, G.-M. [Casearia sylvestris, Sw.; var. Myricoides, Gris.]; y  $\delta$ , sub-opacis, G.-M. [Casearia sylvestris, Sw.; var. Gris.]

ROMPE-ROPA. s. f. V. Sabanero.

ROMPEZARAGÜEY. s. m. V. Albahaca de sabana, Celestina, Rompezaragüelles y Rompezaragüelles macho.

ROMPEZARAGÜEY DE SABANA. V. Albahaca de sabana.

ROMPEZARAGÜEY MACHO. V. Rompezaragüelles macho.

ROMPEZARAGÜELLES. s. m. V. Lagaña de aura y Rompezaragüelles macho.

ROMPEZARAGÜELLES MACHO. La Verónica Havanensis, Cand., ó Rompezaragüey [V.], Rompezaragüey macho, Rompezaragüelles [V.] y Tapa-camino [V.].

ROMPEZARAGÜELLES MORADO. V. Lagaña de aura.

RONDELECIA. s. f. V. Careicillo de monte.

RONDELECIA DE CUABAL. Rubiaceae silvestre, la Rondeletia Phialanthoides, Gris., ó Rondelecia piramidal.

RONDELECIA DE HOJAS MENUDAS. Planta silvestre, la Rondeletia microphylla, Gris.

RONDELECIA DEL PINAR. Rubiaceae endémica, la Rondeletia venosa, Wr.

RONDELECIA PIRAMIDAL. V. Rondelecia de cuabal.

ROSA. s. f. Nombre de un grupo de plantas—el género Rosa, Lin.—que encierra unas 30 especies y un número prodigioso de variedades sub-variedades é híbridos. En Cuba se usa el término Rosal, pero comunmente se dice Rosa tanto á la planta como á la flor. Todas las Rosas que existen en Cuba son introducidas, y tienen á veces nombres tan vagos ó alterados que es necesario un detenido estudio para

fijar su clasificación. Las principales variedades cultivadas en la isla son:

- §. (\*) ROSÆ CENTIFOLIÆ. ROSA CENTIFOLIA, Lin. 1) EUCENTIFOLIA. *a*, vulgaris, Ser. R. de cién hojas. *e*, muscosa, Ser. R. mosca ó R. miniatura.  $\pi$ , pomponia, Lindl. R. pompón. *Híbrido*: R. Unique blanc.
- 2) GALLICA. Variedad..... R. de Jericó. 3) DAMASCENA. *a*, Damascena, Mill. R. de Alejandría.
- §. ROSÆ CANINÆ. ROSA INDICA, Lin.  $\beta$ , Noisettiana, Ser.; *híbridos*: R. Lamarque; R. Le Pactole ó R. Margarita Pedroso; R. Madame Laffitte.  $\delta$ , fragrans, Red. R. Thé *Híbridos*: R. Comte de París; R. Maréchal Niel; R. Niphetos; R. Perle de Lyon. ROSA BENGALENSIS, Pers. R. de Bengala. *Híbridos*: R. Hermosa; R. Viridiflora. ROSA BORBONIANA, Desportes. R. de Borbón. *Híbridos*: R. Comtesse de Barbantane; R. Madame Calot; R. Paul Joseph; R. Reina de Castilla; R. Reine de Victoire; R. Robusta Reynolds Hole. HÍBRIDOS REMONTANTES. R. Alfred de Rougemont; R. Alphonse Karr; R. Admiral Nelson; R. Baronne A. de Rothchild; R. Captan Christy; R. Coquette des blanches; R. Elisa Boelle; R. Empereur Napoleon; R. Géant des batailles; R. Jules Margottin; R. La France; R. Mabel Morrison; R. Mac-Mahon; R. Madame Bernutz; R. Madame Lacharme; R. Madame Van Houtte; R. Paul Neyron; R. Pauline Bonaparte; R. Pie IX; R. Prince Albert; R. Red dragon; R. Sœur des anges; R. Souvenir de La Malmaison.
- §. ROSÆ SYNSTYLE. ROSA MOSCHATA. Ait. R. Mosqueta.

(\*) Solamente se citan las secciones que tienen representantes en Cuba.



§. *ROSE BANKSIANÆ*. *ROSA MICROPHYLLA*, Roxb. R, microphylla.

Quedan por fijar muchas variedades ó híbridos, entre los cuales se cuentan: R, Reina del prado ó R, Isabel II, R, Minadora, R, Perfecta, R, Bellavista, R, Montalvo, R, Miroir des dames, R, Sydonie, R, perle des jardins.

*ROSA DE CIÉNAGA*. [P, R.] *Lythraea silvestre*, no cubana, el *Antherylium Rohrii*, Vahl.

*ROSA DE GUELDRES*. V, Bola de nieve.

*ROSA DE QUELDERS*. [Coloma.] Nombre erróneo. [V, Bola de nieve.]

*ROSA DE SABANA*. *Apocynæ silvestre*, el Echites rosea, Cand. [Mesechites Myrtifolia, J, Müll.]

*ROSA DEL CIELO*. *Caryophyllea* cultivada, el *Lychnis Cæli-Rosa*, Desr. [Viscaria, Cand.]

*ROSA DEL RIO*. La Ginoria Americana, Jacq., ó *Clavellina* [V.]

*ROSA FRANCESA*. La Adelfa [V.]

*ROSAL*. s, m. En Cuba se usa más el término Rosa [V.] tanto para designar la planta como la flor.

*ROSETILLO*. s, m. V, Espuela de caballero. [Jacquinia *Ruscifolia* Jacq.]

*RUDA CABRUNA DE EUROPA*. La *Galega officinalis*, Lin., Leguminosa cultivada?

*RUIBARBÓ DE LA TIERRA*. Otro nombre [?] de la Piña ratón, arbusto [V.]

S

*SABANERO*. El *Tecoma lepidophylla*, Gris., ó *Roble sabanero* y *Rompe-ropa*.

*SABE-LECCIÓN*. *Crucifera* indígena, el *Lepidium Virginicum*, Lin., Mastuerzo [V.] en P, R.

*SABICEA PELITIEZA*. [Stahl.] No es

nombre vulgar; se refiere á una *Rubiacea silvestre*, no cubana, la *Sabicea hirsuta*, Kth.

*SABICEA PELUDA*. [Stahl.] No es nombre vulgar; se refiere á una *Rubiacea silvestre*, no cubana, la *Sabicea hirta*, Sw.

*SABICŪ*. s, m. El *Lysiloma Sabicu*, Benth., ó *Jagüey*, *Leguminosa*.

*SÁBILA*. s, f. Nombre dado á tres *Liliaceas* cultivadas: el *Aloe vulgaris*, Lamk., el *A. Socotorina*, Lamk., y el *A. Margaritifera*, Ait. Se dice igualmente *Zábida* o *Zábila*.

*SABINA CIMARRONA*. V, Espuela de caballero. [*Podocarpus angustifolius*, Gris.]

*SABINA DE COSTA*. V, Cedro de Virginia, encarnado.

*SAETÍA*. [Pichardo.] ?

*SAETILLA*. s, f. V, Patanco.

*SAGŪ*. s, m. *Scitaminea* cultivada, la *Maranta Arundinacea*, Lin. [V, Tulola.]; variedad *Indica*. [M, I, Tuss. *Phrygnium dichotomum*, Lindl.] Dícese también *Yuquilla*, [V, Alcanfor, Arrow-root de la India y Azafrán del país.]

*SAHUMAYA*. [Bachiller.] V, Malanguilla.

*SAJUMAYA*. V, Malanguilla.

*SALTA-PERICO*. s, m. *Acanthacea* silvestre, la *Ruellia tuberosa*, Lin.; var. [*Cryphiacanthus Barbadenis*, Nees; ð, *humilis*.] [V, Verdolaga de sabana.]

*SALVADERA*. s, f. V, Habá.

*SALVIA*. s, f. La *Salvia Occidentalis*, Sw.; y su var. ð, *obscura*, G, M. [*Salvia obscura*, Benth.] *Labias* indígenas. [P, R.] La *Salvia* de playa [V.] en Cuba.

*SALVIA AMERICANA*. La *Lippia geminata*, Kth, *Verbenacea* indígena.

*SALVIA CIMARRONA*. V, Retama arbusto y *Salvia* de playa.

*SALVIA COLORADA*. *Pluchea purpurascens*, Cand. Actualmente esta

- especie se incluye en el género Placus. En P. R. se llama Salvia encarnada.
- SALVIA DE CUBA.** [Colmeiro.] Compuesta cultivada?, la Verbesina Chinensis, Lin.
- SALVIA DE PLAYA.** El Placus odoratus, H. B<sup>n</sup>, [Pluchea odorata, Cass.], Compuesta indígena llamada también Salvia cimarrona y Salvia del país. En P. R. le dicen Salvia [V.].
- SALVIA DEL PAÍS.** V. Salvia de playa.
- SALVIA ENCARNADA.** [P. R.] V. Salvia colorada.
- SALVIA MACHO.** V. Salvia morada.
- SALVIA MORADA.** La Pluchea bifrons, Cand., ó Salvia macho. Actualmente esta especie se incluye en el género Placus.
- SALVILLA.** s. f. V. Boca de león, de paredón.
- SAMAMBAYA.** s. f. Nombre de la Gleichenia dichotoma, Hook. [Mertensia, Willd.], Gleichenia indígena.
- SAN DIEGO.** Chenopodiacea cultivada, la Gomphrena globosa, Lin. Otros la llaman Inmortal y Siempre-viva [V. y Flor de San Diego.] Presenta variedades crómicas.
- SAN DIEGO CIMARRÓN.** El Hyptis capitata, Jacq., Labiada indígena, dicha también San Dieguillo.
- SAN DIEGUILLO.** V. San Diego cimarrón.
- SAN JUAN DEL COBRE.** V. Tuatua.
- SAN PEDRO.** Tres plantas reciben este nombre, son: el Stigmaphyllon mycrophyllum, Gris., el S. diversifolium, Juss., y el Epidendrum Bahamense, Gris. Las dos primeras son Malpighiaceas silvestres, existiendo la segunda en P. R., donde carece de nombre vulgar; la tercera especie es una Orchidea indígena.
- SAN PEDRO DE FLOR AZUL.** El Triopteris rigida, Sw. [V. Bejuco de paralejo.]
- SANDÍA.** V. Melón de agua.
- SANGRE DE ADONIS.** [Pichardo.] En el Departamento Occidental, el Mar-Pacífico [V.].
- SANGRE DE DONCELLA.** La Byrsonima biflora, Gris. [V. Palo de doncella.]
- SANGRE DE VIEJA.** [Fernández.]?
- SANGUINARIA.** s. f. Dáse este nombre á dos Chenopodiaceas indígenas, la Alternanthera Polygonoides, R. Br., ó Bella María, y la A. Achyrantha, R. Br.—[Pichardo.] V. Yerba de la sangre.
- SANTA-MARÍA.** [Coloma.] Compuesta cultivada, Chrysanthemum species [Pyrethrum Tanacetum, Cand. Balsamita suaveolens, Desf.], ó Yerba de Santa María y Yerba romana. [P. R.] V. Albahaquillo.
- SANTA-RITA.** Rubiaceá cultivada, la Ixora Bandhucca, Roxb. [I. coccinea, Lin.].
- SANTO-DOMINGO.** V. Vicaria.
- SAPÉ.** s. m. El Andropogon bicornis, Lin., ó Grama.
- SAPO.** [Fernández.]?
- SAPOTE.** s. m. El Achras Sapota, Lin. [Sapota Achras, Mill.], Sapotea indígena. Se le dice también Nispero y Zapote.
- SAPOTE BLANCO.** Rutacea cultivada, la Casimiroa heptaphylla.
- SAPOTE CULEBRA.** El Lucuma Serpentina, Kth, y el L. Valenzuelana, Rich., ó Siguapa.
- SAPOTE CULEBRA, DE COSTA.** Labatia Chrysophyllifolia, Gris.
- SAPOTE ESPINOSO.** Bumelia horrida, Gris., ó Jequí espinoso y Jiquí espinoso.
- SAPOTE NEGRO.** El Diospyros Laurifolia, Rich., Ebenacea silvestre. En Cuba no existe el D. obtusifolia, Will., cuya especie no es de Kth.
- SAPOTILLO ÁRBOL.** Sapotea indígena, el Sideroxylon polita, Mart. [Sapota, Gris.]
- SARAGOZA.** s. f. V. Yana.

- SARBATANA. s. f. [P. R.] La *Synedrella nodiflora*, Gaertn., Compuesta silvestre en ambas islas, careciendo de nombre vulgar en Cuba.
- SARGAZO COMÚN. Fucacea indígena, el *Sargassum vulgare*, Ag., ó Uva de mar.
- SARNA. s. f. V. Rompe-hueso. [Guidonia sylvestris, G.-M.]
- SARNA DE PERRO. V. Rompe-hueso.
- SARNILLA. s. f. V. Rompe-hueso.
- SARSAMORA. [Morales.] V. Zarza. [Rubus ferrugineus, Wickstr.]
- SASABEIOS. Variedad de Boniato [V.]
- SASAFRÁS. V. Cuabá blanca.
- SÁUCE. s. m. Salicinea indígena, el *Salix Bonplandiana*, Kth.
- SÁUCE LLORÓN. Salicinea cultivada, el *Salix Babylonica*, Lin., ó Llorón [V.]
- SAUCO AMARILLO. El *Tecoma Stans*, Juss., Bignoniacea silvestre.
- SAUCO BLANCO. El *Sambucus nigra*, Lin., Caprifoliacea cultivada.
- SAUMALLA. V. Malanguilla.
- SCHRADERA EN CABEZUELAS. [Stahl.] No es nombre vulgar; se refiere á una Rubiacea puerto-riqueña, no cubana, la *Schradera capitata*, Vahl. En Cuba existe una especie hermana, la *Schradera cephalophora*, Gris, sin nombre vulgar.
- SECATE. [Pichardo.] Nombre probablemente alterado. V. Yerba-Castilla.
- SÉCUA. s. f. Jabilla.
- SEDÁ VEGETAL. V. Yerba acolchada.
- SEIBA. [Cuba y P. R.] s. f. Malvácea silvestre, el *Eriodendron anfractuosum*, Cand.;  $\beta$ , *Caribæum*, Cand.
- SEIBÓN. s. m. Malvacea endémica, el *Bombax emarginatum*, G.-M. (\*)
- [Eserróneo *B. emarginatum*, Rich., citado por Sauvalle, *Fl. cub.*, 14.] También se dice Ceibón.
- SEIBÓN BOTIJA. El *Ochroma lagopus*, Sw., ó Ceibón botija y Lanero, Malvacea silvestre. En P. R. le dicen Guano [V.]
- SEIBÓN DE AGUA. V. Caroleína.
- SEIBÓN DE ARROYO. V. Caroleína.
- SEN DEL PAÍS. La *Cassia bicapsularis*, Lin.
- SENSITIVA. s. f. V. Vergonzosa.
- SEPI. s. m. [P. R.] V. Retama arbusto.
- SERENÍ. s. m. V. Aleluya roja de Guinea.
- SESO VEGETAL. V. Akée de Africa.
- SIBANICŪ. s. m. V. Cubanicú.
- SIEMPRE-VIVA. *Celosia nitida*, Vahl, Chenopodiacea indígena, que otros llaman Moco de pavo. *Pterocaulon virgatum*, Cand., Compuesta indígena, dicha Escobillón en P. R. [V. Eterna, Prodigiousa y San Diego.]
- SIEMPRE-VIVA DE AUSTRALIA. V. Eterna de Australia.
- SIGUA. s. f. V. Cigua.
- SIGUAPA. s. f. V. Hicaco de aura y Sapoté culebra.
- SIGUARAYA. s. f. V. Ciguaraya.
- SIGUARAYA MACHO. V. Ciguaraya macho.
- SIGÜE. [Fernández.]?
- SISI. [Sauvalle.]?
- SOBERBIA. s. f. La *Methonica superba*, Lamk., ó Bandera de España, Liliacea cultivada.
- SOLITARIA. s. f. V. Pan-porcino.
- SOMBRERILLO DE AGUA. Umbellifera indígena, el *Hydrocotyle Rannunculoides*, Lin.
- SONCENA AZUL. [Lachaume.] Otro nombre de la Tuberosa azul [V.]

(\*) Arbol. Hojas digitado-7-[raramente 5-9] folioladas; foliolos coriáceos, lampiños, trasvados, obtusos, escotados en el ápice y paulatinamente atenuados en la base. Flores grandes, terciopeladas. Pétalos angostos. Columna estaminal dividida en el ápice en

multitud de filamentos; anteras reniformes. Ovario piriforme, terciopelado; estigma truncado, sub-5-lobo. [Pachira emarginata, Rich., en Sagra, *Hist. fis., polít., nat. Cuba*, X, 160, t. 20.]

**SOPILLO.** s. m. La *Galactia angustifolia*, K<sup>th</sup>, y la *Cariavali gladiata*, Cand.?, dicha en P. R. Matos colorados. Son des Leguminosas silvestres.

**SOSA.** s. f. Dos *Chenopodiaceas* indígenas llevan este nombre: la *Suæda fruticosa*, Forsk., y la *S. maritima*, Dum.

**SQUIBETES.** Variedad de Boniato [V.]

**SÚCHEL.** s. m. V. Lirio blanco.

**SUMAQUE.** s. m. *Anacardiacea* indígena, el *Rhus copallina*, Lin., ó Añil del pinar, Zumaque y Zumaque barniz.

**SÚRBANA.** [Pichardo.]?

**SÚRBANA MACHO.** V. Cúrbana macho.

**SUSANA.** s. f. *Amaryllidæa* cultivada, el *Pohianthes tuberosa*, Lin., ó Nardo oloroso, Varita de Jesé y Varita de San José.

**SUSPIROS.** [Coloma.] La Maravilla. [Mirabilis Jalapa, Lin.,]

## T

**TABACO.** s. m. Nombre del Cohibá. [V.] preparado para fumar, mascar ó sorber. [V. Tabaco cimarrón.]

**TABACO CIMARRÓN.** Se aplica este nombre á las siguientes especies de nuestras selvas: 1) *Solanum triste*, Jacq.; 2) *Nicotiana repanda*, Will.; *Solaneas*; 3) *Hydrolea spinosa*, Lin., ó simplemente Tabaco [V.]: *Hydrophyllæa* (\*); 4) *Buddleia Americana*, Lin.: *Loganica*; 5) *Schwenkia Americana*, Lin. [S. *adscendens*, Gris.; non K<sup>th</sup>.]; *Scrophularinea*. [V. Pendejera ma-

cho. (*Solanum Verbascifolium*, Lin.,)]

**TABACO DE SABANA, DE FLOR ROSADA.** La *Schultesia stenophylla*, Mart, *Gentianeæ silvestre*.

**TABÁIBA.** V. Lirio blanco.

**TABANO.** s. m. La *Pavonia Typhalæa*, Cav., *Malvacea* indígena. En P. R. le dicen Cadillo pequeque.

**TABAYA.** V. Tubago.

**TABLERO DE DAMAS.** Planta de jardín, la *Fritillaria meleagris*, Lin.

**TABUCÁN.** Variedad de la Yuca agria?

**TABURETE.** s. m. V. Lengua de vaca.

**TABURETE DE FLOR MARAÑUELA.** *Rubiacea* silvestre, lo mismo que en P. R. donde se nombra Cachimbo. Es la *Uragoga crocea*, G. M. [Palicourea crocea. Cand.]

**TAGUA.** s. f. V. Palma-marfil. [Pichardo.]?

**TAGUA-TAHUA.** [Fernández.]?

**TAGUA-TAGUA.** [Cuba.]? [P. R.] La *Passiflora foetida*, Lin. [V. *Passionaria vejigosa*.]

**TALAYA.** s. m. *Tamariscinea* cultivada, el *Tamarix Gallica*, Lin., ó Tamariz,

**TALLOTE.** s. m. [P. R.] V. Chayote.

**TAMACURRA.** [Fernández.]?

**TAMARINDILLO.** [Fernández.] *Alvaredæa species*?

**TAMARINDO.** s. m. El *Tamarindus Indica*, Lin. [T. *Occidentalis*, Gært.,]

**TAMARIZ.** s. m. V. Talaya.

**TAMBALISA.** s. f. La *Sophora tomentosa*, Lin., *Leguminosa* silvestre.

**TAPA-CAMINO.** La *Ardisia actinina*, Willd., *Myrsinea* indígena. [V. Lengua de vaca y Rompezaragüelles macho.] En P. R. la *Vernonia arborescens*, Sw., y sus variedades *Swartziana*, Gris., y *Lessingiana*, Gris., *Compuesta* silvestre, existe en Cuba pero no tiene nombre vulgar. La variedad *divaricata*, Gris.,

(\*) Además de la citada, las *Hydrophyllæas* [*Hydroleaceas*.] tienen en Cuba tres especies: 1) *Hydrolea nigricaulis*, W.; endémica; 2) *Nama Jamaicensis*, Lin.; silvestre; 3) *Wigandia Kunthii*, Choisy,  $\beta$ , *macrophylla* [W. m., Cham. & Schlecht.]; cultivada.

- es la *Vernonia remotiflora*, Rich. [V. Lagaña de aura.]
- TAPIOCA.** s. f. V. Alcanfor.
- TARARACO.** s. m. *Amaryllidea* cultivada, la *Amaryllis reginae*, L. Hérit; ó *Azucena* de Méjico.
- TARAREY.** [Pichardo.] ?
- TÉ DE COSTA.** V. Yerba de la sangre.
- TÉ DE LA TIERRA.** V. Malva té.
- TEBENQUE.** [Pichardo.] ?
- TENGUE.** s. m. La *Peppigia* proce-  
ra, Presl. [P. excelsa, Rich.] Tam-  
bién se dice *Abey* hembra. Es una  
Leguminosa silvestre.
- TERCIOPELO.** [Pichardo.] ?
- TERCIOPELO DE MONTE.** *Ipomæa* ca-  
lophylla, Lin., Convolvulacea sil-  
vestre.
- TERCIOPELO SOLFERINO.** *Ipomæa* ar-  
gentifolia, Rich.
- TETA DE BURRO.** [P. R.] El *Chry-  
sobalanus rugosa*, G. M. [*Hirtella*  
rugosa, Pers. *Hirtella* Porto-Ric-  
censis, Willd.], Rosacea silvestre,  
no cubana. [V. Hicaco de aura.]
- TETA DE YEGUA.** V. Hicaco de aura.
- THUMBERGIA.** s. f. Nombre de una  
*Acanthacea* indígena, la *Thun-  
bergia fragrans*, Roxb.; γ. Por cor-  
rupción se dice *Tumbergia*.
- THUYA.** s. f. Dáse este nombre á  
una *Conifera* cultivada, la *Thuia*  
*Occidentalis*, Lin. Otros escriben  
*Tuya* y *Tulla*. [V. y *Cedro* blanco  
de Virginia.]
- TIBEY.** s. m. V. *Revienta* caballos.
- TIBISÍ.** Entre las especies indígenas  
y bien determinadas de las *Grami-  
neas*, llevan este nombre: el *Ar-  
throstylidium* *Cubense*, Rupr.; el  
*A. fimbriatum*, Gris.; y el *A. capi-  
llifolium*, Gris.
- TIBISÍ GRANDE.** V. *Carrizillo* de  
monte.
- TINTILLO.** s. m. [P. R.] *Rubiacea*  
silvestre, lo mismo que en Cuba,  
donde se llama *Agalla* de costa  
[V.]. Es *Genipa* species. [*Randia*  
*aculeata*, Lin.]
- TITONIA.** [Pichardo.] ?
- TOATUA.** [Bachiller.] V. *Tuatua*.
- TOCINO.** s. m. La *Acacia* *paniculata*,  
Willd.
- TOMATE.** s. m. *Solanea* cultivada, el  
*Lycopersicum esculentum*, Mill.  
[*Solanum Lycopersicum*, Lin.]  
Presenta algunas variedades.
- TOMATE CIMARRÓN.** [Pichardo.] ? ó  
*Guinda*.
- TOMATE DE MAR.** V. *Almorrana*.
- TOMATILLO.** s. m. *Physalis* angula-  
ta, Lin., *Solanea* silvestre.
- TOMATILLO DE SABANA.** [Morales.]  
Otro nombre [?] de la *Pareira*  
brava. [*Cissampelos* *Pareira*, Lin.]
- TOMATILLO DE LA HABANA.** *Sola-  
num* *Havanense*, Jacq., ó *Ají* de  
China.
- TOMEGUÍN.** s. m. *Rutacea* silvestre,  
el *Xanthoxylon pterota*, Kth., ó  
*Espino* [V.] y *Limoncillo*. [V. *Li-  
món* café.]
- TOMILLO.** s. m. *Thymus vulgaris*,  
Lin., *Labiada* cultivada.
- TOMILLO DE COSTA.** *Myrtacea* sil-  
vestre, *Eugenia* *Rosmarinifolia*,  
Poir. [V. *Birijí* de hojas menudas.]
- TORBISCO DE LAS ANTILLAS.** V. *Tor-  
visco* de las Antillas.
- TORCIDO.** s. m. Otro nombre del  
*Lebrero* ó *Palo torcido* [V.].
- TOROLICO.** s. m. V. *Rabo* de zorra.
- TORONGIL.** s. m. La *Melissa* *offici-  
nalis*, Lin., *Labiada* cultivada. No  
se usa en Cuba su nombre catalán,  
*Torongina*.
- TORONJA.** s. f. *Rutacea* cultivada, el  
*Citrus vulgaris*, Lin., *macrocarpa*,  
Reich.
- TORTUGA.** [Fernández.] ?
- TORVISCO DE LAS ANTILLAS.** *Dap-  
hnopsis* *Caribæa*, Gris. [D. *Tini-  
folia*, Meissner; α. *Meissner*.] Otros  
escriben *Torbisco* de las Antillas.  
Es una *Thymelæacea* silvestre.
- TOSTRÓN.** s. m. La *Boerhaavia* *visco-  
sa*, Lagasca; y la *B. erecta*, Lin.  
*Nyptagineas* indígenas. [V. *P. ....*  
de perro.]
- TOTUMA.** s. f. V. *Güira* cimarrona.



- TRÉBOL CRIOLLO.** V. Trébol de agua.
- TRÉBOL DE AGUA.** *Limnanthemum Grayanum*, Gris., y *L. Humboldtianum*, Gris., dicho el primero, además, Trébol criollo. Pertenecen á las Gentianeas.
- TRÉBOL DE OLO.** Compuesta naturalizada [], el *Eupatorium aromatisans*, Cand. [E. triplinerve, Guibourt. Piqueria trinervia, Guibourt; non Cav. E. febrifugum, H. Bk ?; non Sess. & Moc.]
- TRES-CABEZAS.** [P. R.] Rubiacea endémica, la *Uragoga triptoecephala*, G.-M. (\*) [*Cephaelis Bello.*]
- TRÉVOL DE AGUA.** V. Trébol de agua.
- TRICOLOR.** s. f. V. Guacamaya.
- TROMPETA DE JUDEA.** Orquídea indígena ?, el «*Laeliopsis Cubensis*, Lindl.» Se cultiva en el Jardín Botánico [?].
- TUATUA.** s. m. Euphorbiacea indígena, el *Jatropha Gossypifolia*, Lin., Frailecillo, Frailecito ó San Juan del Cobre. Se escribe también Tuatua.
- TUA-TUA.** V. Tuatua.
- TUBAGO.** ?
- TUBICÁN.** ?
- TUBEROSA AZUL.** Liliacea cultivada, el *Agapanthus umbellatus*, L'Hérit. [V. *Soncena azul.*]
- TUBUCÁN.** ?
- TULIPÁN.** s. m. Liliacea cultivada, la *Tulipa Gesneriana*, Lin.
- TULIPERO.** s. m. El *Liriodendron Tulipifera*, Lin., Magnoliaceas cultivada.
- TULLA.** [Fernández.] Nombre erróneo del Cedro blanco de Virginia [V.] y de la *Thuya* [V.].
- TULOLA.** s. f. Scitaminea silvestre, la *Maranta Arundinacea*, Lin. [V. Sagú y Arrow-root del oeste indio.]
- TUMBERGIA.** V. *Thunbergia*.
- TUNA.** s. f. La *Opuntia Tuna*, Mill., Cactea indígena. [Baehiller.] Variedad del Boniato [V.].
- TUNA BRAVA.** *Opuntia vulgaris*, Mill., ó *Tuna silvestre*. Es una Cactea cultivada.
- TUNA CABEZONA.** V. Cardón.
- TUNA CABEZUDA.** V. Cardón.
- TUNA DE CRUZ.** ?
- TUNA MANS.** Cactea cultivada la *Opuntia Cochinillifera*, Mill.
- TUNA SILVESTRE.** V. Tuna brava.
- TÚNICA DE CRISTO.** Otro nombre del Nangué. [V.].
- TURMA-TORO.** [P. R.] Compuesta silvestre, lo mismo que en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es el *Eupatorium macrophyllum*, Lin. [*Hebeclinium macrophyllum*, Cand.]
- TUYA.** s. f. V. *Thuya*.

## U

(\*) Gén. *Uragoga*, Lin. = Sección *Euura-goga*, H. Bk. = Sub-sección *Cephaelis*. 2. *Tapogomea*, G.-M. Capítulos soldados con las brácteas. = *U. triptoecephala*, G.-M. Yerba lampiá, sub-carnosa. Hojas opuestas, pecioladas, elíptico-oblongas, agudas, sub-decurrentes en la base, verde-azul y lustrosas por la cara superior, pátidas por la inferior, peciolos, nervuras y divisiones rosadas. Pedúnculo largo, 3-céfalo. Brácteas del involu-cro capitular anchas, óvalo-redondeadas. Flores blancas, pequeñas, más ó menos sentadas. Cáliz truncado ó 5-dentado. Estambres 5, insertos en la garganta de una corola hipocraterimorfa, 5-lobada y de tubo infundibuliforme. Estigma 2-fido, sub-exserto.

- UANA.** V. Guanana.
- UBÍ.** s. m. *Vitea* indígena, el *Cissus Sicyoides*, Lin., *Vitea*. En P. R. le dicen Caro.
- UBÍ AGRIO.** El *Cissus acida*, Lin., *Vitea* indígena. En P. R. le dicen Caro agrio.
- UBÍ DE CINCO HOJAS.** [Pichardo.] V. Bejuco ubí macho.
- UBÍ DE CUATRO LADOS.** [Pichardo.] V. Ubí de vejigatorio.
- UBÍ DE HOJA ANCHA.** *Cissus cordifolia*, Lin.
- UBÍ DE HOJAS SIMPLES.** [Pichardo.] V. Ubí.

UBÍ DE TRES HOJAS. El *Cissus subavenia*, Planchon, ó Ubí macho [V.]. En P. R. le dicen Caro de tres hojas.

UBÍ DE VEJIGATORIO. *Cissus quadrangularis*, Lin., ó Uvas moras, *Vitea silvestre*.

UBÍ DE VEJIGATORIOS. [Pichardo.] V. Ubí de vejigatorio.

UBÍ MACHO. Este nombre se aplica al *Vitis trifoliata*, Moral; «variedad intermedia.» [V. Ubí de tres hojas.]

ULE. V. Olí.

UÑA DE GATO. V. Zarza [*Pisonia aculeata*, Lin.], Manca montero y Bejuco perdiz rosado.

UÑA DE LEÓN. ?

UVA. s. m. El fruto de la Vid [*Vitis vinifera*, Lin.], *Vitea* que puede cultivarse extensamente en Cuba.

UVA CALETA. V. Uva de la caleta.

UVA DE CALETAS. V. Uva de la caleta.

UVA DE MAR. V. Sargazo común.

UVA DE LA CALETA. Fruto del Uvero—*Coccoloba uvifera*, Lin.—*Polygonacea* indígena, y también toda la planta.

UVA DE LAS CALETAS. V. Uva de la caleta.

UVA GOMOSA. La *Cordia alba*, Rœm. & Schult. [V. Ateje amarillo y Varía blanca.]

UVAS MORAS. V. Ubí de vejigatorio.

UVERILLO. s. m. Cinco *Polygonaceas* indígenas reciben este nombre, son: *Coccoloba calabotrys*, Meissner; *C. Kunthiana*, Meissner; *C. Cubensis*, Meissner; *C. armata*, Wr.; y *C. microphylla*, Gris. [V. Uvero blanco.] [Fernández.] V. Uvero macho.

UVERO. s. m. Nombre del *Coccoloba uvifera*, Lin. Produce la Uva de la caleta, conociéndose por muchos con este trivial [V.]. También le dicen Guabara.

UVERO BLANCO. *Coccoloba pallida*, Wr., ó Uverillo [V.] y Calambrefia.

UVERO DE COSTA. *Coccoloba rufescens*, Sauval. [C. *punctata*, Lin.; *parvifolia*, Gris.]

UVERO EXÓTICO. [Fernández.] *Coccoloba Indica*, Lin.?

UVERO MACHO. *Polygonacea* indígena, el *Coccoloba retusa*, Gris. Denomínase, además, Manatí, Yarúa, y, según Fernández, Uverillo [V.].

UVÍ. [Fernández.] En la *Arboricultura cubana* se da este trivial, y el técnico de *Vitis Casiboená*, al Ubí [V.]. [*Cissus Sycioides*, Lin. *Vitis Moral*.]

V

VACA-BUEY. s. f. La *Curatella Americana*, Lin., *Dilleniacea* indígena; Chaparro de otros. [V. Acajú.]

VACUOÁS. V. Pándano caracolillo.

VAINA. s. f. V. Legumbre.

VAINILLA. s. f. Nombre vulgar de las siguientes especies silvestres: I) *Orchideas*: 1, *Vanilla planifolia*, Andrews [*V. claviculata*, Sw. V. *silvestris*, Schiede. V. *sativa*, Schiede. V. *viridiflora*, Blume. *Myrobroma fragrans*, Salisbury.]; variedad *macrantha* [*V. phœantha*, Reich. f.]; 2, *Vanilla anaromatica*, Gris. [*V. aromatica*, Sw.]; 3, *Vanilla claviculata*, Sw. [*V. barbellata*, Reich. f.]; 4, *Vanilla palmarum*, Lindl. [*V. lutea*, Wr.]; 5, *Vanilla Wrightii*, Reich. f. [*V. gratiosa*, Gris.] —II) *Boraginea*: *Heliotropium Peruvianum*, Lin. ó *Heliotropium* de olor de vainilla.—III) *Composita*: *Eupatorium Dalea*, Lin. [*Critonia*, Cand.], dicho Guerrero en P. R.

VAINILLA AMARILLA. *Orchidea* endémica? el *Epidendrum fucatum*, Lindl. [E. *Sagreanum*, Rich.]

VAINILLA ROSADA. El *Epidendrum macrochilum*, Hook. [E. *atropurpureum*, Wr.]; y el E. *Duboisia*.

- num, Brongn.: *Ochideas silvestres*.
- VAQUOÁS.** V. *Pándano caracolillo*.
- VARA DE JESÉ.** V. *Susana* y *Varita de San José*.
- VARA DE ORO.** *Compuesta* cultivada, el *Solidago virgaurea*, Lin., ó *Pluma de oro*.
- VARIA.** s. f. *Boraginea silvestre*, la *Cordia Gerascanthus*, Jacq., ó *Capa rota*, *Capa prieta*, *Palo de rosa del país* y *Baría*. La *Cordia Gerascanthoides*, Kth, ó *Baría*.
- VARIA BLANCA.** *Cordia alba*, Roem. & Schult., ó *Ateje blanco*, *Capa blanca* y *Uva gomosa*. [V. *Ateje amarillo*.]
- VARITA DE JESÉ.** V. *Susana* y *Varita de San José*.
- VARITA DE SAN JOSÉ.** La *Althaea rosea*, Cav. El nombre es corrupción de *Vara* ó *Varita de Jesé*. [V. *Susana*.] Es una *Malvacea* de cultivo.
- VEJIGA DE PERRO.** Nombre de tres *Solaneas* indígenas: el *Physalis Hermanni*, Dun.; el *P. Linkiana*, Nees.; y el *P. pubescens*, Lin., dicha esta última *Pantomima*.
- VELESA.** s. f. *Plumbaginea* cultivada, el *Plumbago Capensis*, Thunb., que algunos llaman *Embeleso*, *Jazmín azul* y *Azulejo*. También el *P. caerulea*, Kth.
- VELESA ROSADA.** *Plumbago rosea*, Lin., planta cultivada.
- VERA.** s. f. Tres *Rubiaceas* indígenas reciben este nombre: la *Guettarda pauciflora*, G.-M. [*Stenostomum pauciflorum*, Sauval. S. radiatum, Gris.; variedad.]; la *Guettarda granulata*, G.-M. [*Stenostomum granulatum*, Gris.; pro part.]; y la *Guettarda species* [*Stenostomum nitidum*, Cand.] Por error se escribe *Bera* [Fernández.] V. *Llorón*.
- VERA CERA.** [Fernández.]? Pichardo escribe *Bera cera*.
- VERBASCO.** s. m. El *Gnaphalium Americanum*, Mill., *Compuesta silvestre*, dicha *Yerba lanuda* en P. R.
- VERBENA.** s. f. *Verbenacea* indígena, la *Verbena officinalis*, Lin. También la *Stachytarpheta elatior*, Schad. Igualmente diversas especies de cultivo. [Pichardo.] V. *Verbena azul*.
- VERBENA AZUL.** *Stachytarpheta Jamaicensis*, Vahl [S. strigosa, Vahl. *Verbena Jamaicensis*, Lin. *Zapania Jamaicensis*, Lam<sup>k</sup>.], *Verbenacea silvestre*.
- VERBENA CIMARRONA.** *Stachytarpheta orubica*, Vahl.
- VERBENA DE HOJA ANGOSTA.** *Stachytarpheta angustifolia*, Vahl.
- VERBENA DE ITALIA.** [Pichardo.]?
- VERBENA FRANCESA.** [Pichardo.]?
- VERBENA SILVESTRE.** [Pichardo.] Es la *Verbena azul*.
- VERDOLAGA.** s. f. La *Portulaca Halimoides*, Lin.; la *P. quadrifida*, Lin.; la *P. microphylla*, Rich.; *Portulaceas silvestres*. [V. *Yerba de vidrio*.] Es de cultivo la *Portulaca grandiflora*, Lindl.; var. *Thomburnii*.
- VERDOLAGA DE COSTA.** *Aizoacea silvestre*, el *Sesuvium Portulacastrum*, Lin., dicho *Azucena del mar* y *Verdolaga de la playa* en P. R.
- VERDOLAGA DE CUBA.** *Portulacea silvestre*, la *Claytonia perfoliata*, Donn. [C. *Cubensis*, Bonpl.]
- VERDOLAGA DE MAR.** *Iresine crassifolia* Moq., *Chenopodiacea silvestre*.
- VERDOLAGA DE SABANA.** *Portulacea silvestre*, la *Portulaca pilosa*, Lin., que otros llaman *Salta-Perico* y *Diez del día*.
- VERDOLAGA DE LA MAR.** [Colmeiro.] *Sauvalle* suprime este nombre cubano de la *Borrighia arborescens*, Cand., ó más bien *Verbesina arborescens*, G.-M., la cual se llama *Clavelón de playa* [V.] en P. R.

- VERDOLAGA DE LA PLAYA.** [P. R.] V. Verdolaga de costa.
- VERDOLAGA FRANCESA.** 1) Una Portulacea silvestre, el *Talinum patens*, Willd. 2) Una Aizoacea silvestre, citada por Sauvalle como Portulacaceae, la *Trianthema monogyna*, Lin. [Lachaume.] ?
- VERDOLAGA VERDADERA.** *Portulaca oleracea*, Lin., *Portulaca silvestre*.
- VERDOLAGUILLA BLANCA.** V. Peregil de costa.
- VERGAJO DE TORO.** Malpighiacea silvestre, como en P. R., donde le dicen Paralejo velludo y Peralejo velludo; es el *Heteropterys Laurifolia*, Juss. [H. pubiflora, Bello. *Banisteria* ? pubiflora, Cand.] [V. Guáiro santo de costa.]
- VERGONZOSA.** Leguminosa cultivada, la *Mimosa pudica* Lin., bien conocida, además, por *Sensitiva*. En P. R. le dicen Moriviví.
- VERRACO.** s. m. El *Croton homolepidus*, J. Müll., ó *Clavellina* de laguna [V.]. Es una Euphorbiacea silvestre.
- VETIVER.** s. m. El *Andropogon squarrosus*, Lin. f., Graminea cultivada.
- VÍBONA.** s. f. Con este nombre se designa una Araliea endémica, la *Schefflera cuneifolia*, G. M. [Hedera cuneifolia, Wt. *Dendropanax cuneifolium*, Sauval.], hermana de la *Schefflera species* [Hedera *Samydfolium*, Wt. *Dendropanax Samydfolium*, Sauval.], también endémica y sin nombre vulgar. Se dice Víbona, Palo cachimba y Ramón de vaca en Cuba y Víbona y Palo cachumba en P. R. á la *Schefflera species*. [Hedera arborea, Sw. *Dendropanax arboreum*, Desne & Planch. *Sciadophyllum Jacquini*, Gris.] La *Hedera capitata*, Smith [*Sciadophyllum capitatum*, Gris.], Araliea no cubana, se dice en P. R. Víbona y Palo chumba. En fin, en Cuba se nombran Víbonas las Rubiaceas siguientes, extrañas á la Flora de P. R.: *Erithalis rotundata*, Gris.; *E. parviflora*, Gris.; y *E. pentagonia*, Cand. Muchos escriben Bíbona. [V. Huevo de perro.]
- VÍBORA.** s. f. V. Prodigiosa.
- VICARIA.** s. f. *Apocynaea silvestre*, la *Vinca rosea*, Lin., ó Santo Domingo, Purísima y Dominica.
- VID.** s. f. V. Uva.
- VIDALBA.** s. f. V. Yerba de pordioseros.
- VIDRIELLA.** s. f. V. Yerba de pordioseros.
- VIGUETA.** s. f. *Exostema floribundum*, Roem. & Schult., ó *Vigueta naranjo*, blanca; Chinchona, Quina [V.] y Quina pitón, Rubiaceae indígena.
- VIGUETA BLANCA.** Rubiaceae silvestre, *Rondeletia alaternoides*, Rich., ó Caobilla de sabana.
- VIGUETA DE COCINA.** [Pichardo.] ?
- VIGUETA DEL PERÚ.** Ortografía más propia que la de *Bigueta del Perú* [V.], que se halla en Fernández.
- VIGUETA HEMBRA.** La *Maba species* [*Macreightia Caribaea*, A. Cand.], Ebenacea indígena. Fernández trae, con la ortografía viciosa de *Bigueta hembra* [V.], una planta difícil de determinar.
- VIGUETA NARANJA.** *Tapura cubensis*, Gris., *Dichapetalea* [*Chailletia*] indígena. Es la *Bigueta* de naranjo [V.], que cita Fernández.
- VIGUETA NARANJO.** *Rondeletia Tinifolia*, Gris., Rubiaceae indígena, también dicha Caobilla de sabana, de flor blanca y Adedica.
- VIGUETA NARANJO, BLANCA.** V. *Vigueta*. [*Exostema floribundum*, Roem. & Schult.]
- VIGUETA PELUDA.** [Fernández.] ?
- VILORITA.** s. f. El *Colchicum autumnale*, Lin., ó *Quita-meriendas*.
- VINAGERA.** [Sauvalle.] V. *Vinagera*. [*Gonzalagunia spicata*, G. M.]

- VINAGRERA.** s. f. Nombre del *Oxalis corniculata*, Lin., y del *O. frutescens*, Lin., Geraniaceas silvestres, también llamadas Vinagrillo. [V. Mariposa.] Aplicase igualmente el nombre de Vinagrera á una Rubiacea silvestre, la Gonzalezagunia spicata, G.-M. [Gonzalea spicata, Cand.] En P. R. le dicen Gonzalez epigada [V].
- VINAGRILLA.** s. f. *Rumex obtusifolius*, Lin.
- VINAGRILLO.** s. m. *Oxalis violacea* Lin. [*Oxalis intermedia*, Rich.], Geraniacea silvestre. [V. Vinagrera.]
- VIOLETA.** s. f. Violacea cultivada, la *Viola odorata*. Lin., ó *Violeta olorosa*.
- VIOLETA CHINA.** Scrophularinea cultivada, la *Torenia Asiatica*, Lin.
- VIOLETA DIENTE DE PERRO.** [Coloma.] *Erythronium Dens-Canis*, Lin., Liliacea cultivada.
- VIOLETA OLOROSA.** V. Violeta.
- VIOLETA SILVESTRE.** Nombre de dos Violaceas silvestres, el *Ionidium procumbens*, Gris. [*Hybanthus*, G.-M.]; y el «*I. lineatum*, Ging., y su presunta var.  $\beta$ ?, Cand.» Hoy se incluyen en el género *Hybanthus*, lo mismo que la *Ipecacuana* de Méjico [V.], que se transforma en *Hybanthus strictus*, H. Bn; su puesta en P. R. por Stahl. Al lado de estas especies se coloca otra silvestre y sin nombre vulgar, el *Hybanthus Havanensis*, Jacq. [*Ionidium Havanense*, Benth. & Hook. (\*)] [V. Yerba de San Martín.]
- VIOLETINA.** s. f. La *Duranta Plumieri*, Jacq., Verbenacea silvestre que se conoce, además, con el nombre de Celosa cimarrona.
- VIRIJÍ.** s. m. *Eugenia ferruginea*, Rich., Myrtacea silvestre.
- VIUDA.** s. f. [Coloma.] Dipsacea cultivada, la *Scabiosa atropurpurea*, Lin., ó *Ambarina*, Escabiosa [V.] y Escobilla morisca.
- VIZNAGA.** s. f. Umbellifera cultivada, el *Ammi Visnaga*, Lamk., ó Perlas?
- VOLADORES.** V. Ñame cimarrón.
- VOLANTÍN.** s. m. Nombre de diversas Capparideas silvestres, son: *Cleome pungens*, Willd.; *C. polygama*, Lin.; *C. Hustoni*, R. Br.; *C. procumbens*, Jacq.; *C. macrorhiza*, Sauval; *Gynandropsis pentaphylla*, Cand. En Bayamo, algunas de estas especies se llaman Aruña-gato
- VOLATÍN.** V. Volantín.
- VOMITEL AMARILLO.** Ortografía más propia que la de Bomitel amarillo [V.], empleada por Fernández.
- VOMITEL BLANCO.** La *Cordia nitida*, Vahl, dicha también Ateje hembra, Ateje macho, Atejillo, y la *Cordia Leucosebestena*, Gris., ó Hierro de costa. Son Boragineas, lo mismo que la *Cordia Galeottiana*, Rich., más conocida por Ateje blanco [V.].
- VOMITEL COLORADO.** *Cordia Sebestena*, Lin.
- VOMITEL ENCARNADO.** Ortografía más propia que la de Bomitel encarnado [V.], usada por Fernández.
- VOMITEL SEBESTENA.** Nombre más propio que el de Bomitel sebestena [V.].

## Y

- YABA.** s. f. La *Andira inermis* Kth., ó Moca en Cuba y P. R. Es una Leguminosa silvestre.
- YABA AMARILLA.** *Andira microcarpa*, Gris. [A. retusa, Gris.; non Kth.]

(\*) Es erróneo el término *Jonidium*, lo mismo que el nombre *Hybanthus Havanense*, Gris., que cita Sauval, *Fl. cub.*, 5.



- YABILLA. s. f. [Fernández.]?
- YABRUMA. [Bachiller.] La Yagruma macho [V.].
- YABŪ. [Pichardo.] V. Yabuná.
- YABUNÁ. [Pichardo.]?
- YAGRUMA HEMBRA. La *Cecropia peltata*, Lin. [V. Cowleyina.]; la *C. obtusa*, Trec.; y la *C. digitata*, Ten. [V. Guaruma y Yarumba.]
- YAGRUMA MACHO. *Araliacea* indígena, el *Didymopanax undulatum*, Decsne & Planch. [V. Padero.]
- YAGRUMITA. s. f. [Morales.] Otro nombre del Palo amarillo. [*Bocconia frutescens*, Lin.: *Papaveracea* indígena.]
- YAGUA. [Fernández.] V. Jagua.
- YAGUAARAJA. V. Agoreros.
- YAGUAJUSTA. [Pichardo.] V. Palma justa.
- YAGUARABA. V. Agoreros.
- YAHUBÍAS. V. Yautía.
- YAHUTÍA. [Oviedo.] V. Yautía.
- YAIGUAGE. s. m. El *Hypelate paniculate*, Camb., Gáita en P. R.
- YAICUAGE DE COSTA. *Hypelate trifoliata*, Sw., *Sapindacea* indígena. [V. Maninge.]
- YAITÍ. s. m. La *Sebastiania lucida*, J. Müll., ó Aité.
- YAITÍ BOBO. *Sebastiania albicans*, Sauval.?
- YAITÍ DE HOJA MENUDA. *Sebastiania pallens*, J. Müll., *Euphorbiacea* silvestre.
- YAMA. [Pichardo.] V. Llama.
- YAMAGUA. s. f. V. Yamao.
- YAMAGUEY. V. Jamaguey y Yamaquey.
- YAMAGUEY DE COSTA. Nombre más apropiado que el de Yamaquey de costa. [V. Agalla de costa.]
- YAMA O. s. m. V. Guaragua o.
- YAMAQUEY. s. m. La *Poirrettia refracta*, Gris. Según Pichardo es más propió el nombre de Yamaquey [V.].
- YAMAQUEY DE COSTA. V. Yamaquey de costa.
- YAMAQUEY DE TRES HOJAS. [Fernández.] V. Jamaguey de tres hojas.
- YANA. s. f. *Combretacea* silvestre, la *Terminalia erecta*, H. Bn [*Conocarpus erectus*, Lin.], ó Saragoza. [V. Mangle botón.]
- YANÁ. s. f. V. Jía manzanilla.
- YANILLA. s. f. *Simarubea indígena*, el *Picrodendron Juglans*, Gris, [*Schmidelia macrocarpa*, Rich.], ó Guayo. [V. Palo de caja.]
- YANTAS. V. Yautía.
- YARE. s. m. Jugo de Yuca agria [V. y Naiboá.]
- YAREY. s. m.?
- YARŪA. s. f. V. Uvero macho.
- YARUGA. [Fernández.]?
- YARUMBA. s. f. La *Cecropia peltata*, Lin. [V. Yagruma hembra.]
- YEURUMA. La Yagruma macho [V.].
- YAUTÍA. s. f. [Bachiller.] Dícese también Yahubías, Yahutía, Yantas y Diahutía. Entra á formar parte del Calalú [V.].
- YAYA. s. f. La *Uvaria Blainii*, G.-M., [*Asimina*, Gris.] [V. Palo de lanza.] La *Oxandra virgata*, Rich., ó Yaya común. También la *Oxandra Laurifolia*, Rich., ó Purio [V.].
- YAYA CIMARRONA. *Melastomacea* silvestre, el Mouriri [ó Mourirria] *acuta*, Gris. [Mourirria *Myrtilloides*, Poir.] Todas las especies del gén. Mourirria se incluyen modernamente en el gén. Mouriri. [V. Lebrero, Mirto del país y Murta.]
- YAYA COMŪN. V. Yaya.
- YAYA DE MONTE. Otro nombre de la Yaya común ú *Oxandra virgata*, Rich. [*Bocagea virgata*, Benth. & Hook.]
- YAYA MACHO. V. Lebrero.
- YAYABACANÁ. V. Hayabacaná.
- YAYAGUA. [Bachiller.] Nombre taino de la Piña morada. [Ananas Cubense, G.-M.]
- YAYAJBICO. V. Jayajabico.
- YAYAMA. [Bachiller.] Nombre taino de la Piña morada. [Ananas Cubense, G.-M.]

- YEDRA.** s. f. Con este nombre, y el de *Pedo de chino*, se conoce en Cuba una *Phytolaccacea* cultivada, el *Agdestis Clematidea*, Moq. & Sess. Igualmente se llama *Yedra* la *Hedera helix*, Lin.
- YEDRA MORADA.** *Polemoniacea* mexicana, cultivada en Cuba, la *Cobaea scandens*, Cav.
- YEDRA TERRESTRE.** Aplícase este nombre á dos plantas, una *Malvacea* indígena, la *Sida Hederæfolia*, Cav.; y una *Labiada* cultivada?, la *Glechoma Hederacea*, Lin. [*Nepeta Glechoma*, Benth.]
- YEGAN.** [Bachiller.]?
- YEMA DE HUEVO.** V. Calabaza yema de huevo.
- YERBA ACOLCHADA.** [*Lachaume Textiles.*] *Asclepiadea* originaria de Virginia, extendida por la Syria y cultivada en algunos puntos de Europa, igualmente que en Cuba. Es la *Asclepias Cornuti*, Decsne. [*Asclepias Syriaca*, Lin.] También se le llama *Asclepias Syria* y suministra una suerte de *Ouate*, que otros nombran *Seda vegetal*.
- YERBA BRAVA.** [Pichardo.]?, ó *Benubú*.
- YERBA BUENA.** [Pichardo.] La *Mentha sativa*, Lin.
- YERBA BUENA CIMARRONA.** *Salvia serotina*, Lin.
- YERBA BUENA DE OLOR DE PIMIEN-  
TA.** V. *Menta inglesa*.
- YERBA BUENA SILVESTRE.** V. *Menta silvestre*.
- YERBA CAIMÁN.** El *Polygonum acre*, Kth.
- YERBA CANA.** El *Senecio vulgaris*, Lin.; var.; *Compuesta silvestre*.
- YERBA CARMÍN.** V. *Bledo carbonero*.
- YERBA CASTILLA.** [Pichardo.]?, ó *Secate*.
- YERBA CEPA.** [Pichardo.]?
- YERBA CÚPIDO.** El *Catananche cærulea*, Lin., ó *Flor de Cupido* y *Cupidona*. Modernamente se incluye esa especie en el género *Catanan-*  
*ce*, siendo una planta cultivada.
- YERBA DE ÁURA.** [Pichardo.]?
- YERBA DE BOCA?** La *Euphorbia pilulifera*, Lin. [*E. hirta*, Lin.] [V. *Golondrina*.]
- YERBA DE BURRO.** [P. R.] V. *Lengua de vaca*. [*Elephantopus spicatus*, Juss.]
- YERBA DE CÁNCER.** [P. R.] La *Ammannia latifolia*, Lin., y la *A. humilis*, Michx., *Lythraceas* que en Cuba carecen de nombre vulgar.
- YERBA DE CLAVO.** [P. R.] Con este nombre y el de *Yerba de clavo palustre*, se designa una especie de *Ludwigia*, *Cenotheracea* clasificada primeramente de *Jussiaea* *suffruticosa*, Lin., y sinónima de la *J. palustris*, Mey. En Cuba no tiene nombre vulgar. [P. R.] El *Hydrocotyle Asiatica*, Lin., *Umbellifera silvestre*; se encuentra en Cuba, careciendo de denominación vulgar.
- YERBA DE CLAVO ACUÁTICO.** [P. R.] En Cuba se nombra *Clavellina* [V.]. [*Ludwigia Clavellina*, G.-M. & Molt.]
- YERBA DE CLAVO AGUDA.** [P. R.] *Ludwigia species* [*Jussiaea acuminata*, Sw.], sin nombre vulgar cubano.
- YERBA DE CUARTO.** [P. R.] El *Hydrocotyle spicata*, Lamk., *Umbellifera silvestre*, como en Cuba, donde carece de designación trivial. También en P. R. otra planta de la misma familia, el *Hydrocotyle umbellata*, Lin. [V. *Quitasonillo*.]
- YERBA DE DON CARLOS.** *Graminea silvestre*, el *Andropogon fastigiatum*, Sw.
- YERBA DE ESTRELLA.** [P. R.] Nombre de dos *Caryophylleas silvestres*: la *Stellaria ovata*, Willd.; y la *Drymaria cordata*, Willd.; únicas especies puertorriqueñas de la familia. En Cuba existe la últi-

- ma, (\*) sin nombre vulgar, encontrándose, además, los siguientes representantes silvestres: *Arenaria serpens*, Kth; y *Drymaria Ortegoides*, Gris.
- YERBA DE FAJA. [P. R.] *Sparganophorus Vaillantii*, Gärtn., Compuesta silvestre, á igual que en Cuba, donde carece de nombre vulgar.
- YERBA DE GARRO. Rubiaceas silvestres: *Spermacoce species* [*Diodia Lippioides*, Gris.; *S. rigida*, Willd.; *S. Eritrichoides*, Gris.; *S. tenuior*, Lin.; y *S. radicans*, Willd.]
- YERBA DE GUINEA. Dos Gramineas silvestres reciben tal nombre; son: el *Panicum altissimum*, Mey; y el *P. maximum*, Jacq.
- YERBA DE LIMÓN. V. Cañuela santa.
- YERBA DE LOMBRICES. [P. R.] V. Yerba lombricera.
- YERBA DE PARANÁ. V. Yerba Paraná.
- YERBA DE PLATA. [P. R.] La *Rolandra argentea*, Rottb., Compuesta silvestre, no cubana.
- YERBA DE POLLO. La *Tradescantia geniculata*, Jacq. [T. floribunda, Kth.], *Commelinacea* silvestre.
- YERBA DE PORDIOSEROS. *Ranunculacea* cultivada, el *Clematis vitalba*, Lin.; ó *Muermera*, *Vidalba* y *Vidriella*.
- YERBA DE PURGACIÓN. V. Bejuco de purgación.
- YERBA DE SAN CARLOS. [Colmeiro.] Es la Yerba de Don Carlos.
- YERBA DE SAN JUAN. [P. R.] El *Pectis Serpyllifolia*, Less., Compuesta silvestre, no cubana.
- YERBA DE SAN MARTÍN. [Cuba y P. R.] *Violacea* silvestre. la *Sauvagesia erecta*, Lin. En Cuba hay, además, otra especie, aunque sin nombre vulgar: la *S. pulchella*, Planch. La primera es la única *Violacea* silvestre en P. R.; en Cuba se encuentran, al par que las anteriores, las especies nombradas *Ipecacuana* de Méjico y *Viola silvestre* [V.].
- YERBA DE SANTA MARÍA. V. Santa María.
- YERBA DE VIDRIO. *Aizoaceas* indígenas, dichas también *Verdolaga* [V.]; el *Sesuvium microphyllum*, Willd.; y el *S. pentandrum*, Ell. [V. Barrilla.]
- YERBA DE LA BERMUDA. El *Panicum diffusum*, Sw., ó Bahama, Bermuda y Yerba del prado.
- YERBA DE LA CARIDAD. [Pichardo.]?, ó Yerba del Cobre.
- YERBA DE LA NIÑA. El *Phyllanthus niruri*, Lin.; var. *tenuicaulis*. El *P. pentaphyllus*, Wr. La *Euphorbia Hypericifolia*, Lin. [V. Golondrina.]
- YERBA DE LA PACIENCIA. *Rumex patientia*, Lin.
- YERBA DE LA SANGRE. La *Cordia globosa*, Kth, ó M..... de gallina [V.], *Boraginea* silvestre. La *Lantana involucrata*, Lin., también llamada M..... de gallina y, además, *Filigrana cimarrona* y Té de costa, siendo una *Verbenacea* silvestre. [Pichardo.]?, ó *Celidonia* y *Sanguinaria*.
- YERBA DE LA SANGRE, CIMARRONA. *Boraginea* indígena, la *Cordia microphylla*, Roem. & Schult.
- YERBA DE LAS LOMBRICES. V. Yerba lombricera.
- YERBA DE LOS EMPEINES. V. Guacamaya francesa.
- YERBA DE LOS HERPES. V. Guacamaya francesa.
- YERBA DEL CLAVO. V. *Clavellina*. [Ludwigia *Clavellina*, G.-M. & Molt.]

(\*) De esta hay en Cuba la var. *diandra*, Gris., P. Wright.

- YERBA DEL COBRE. V. Yerba de la Caridad.
- YERBA DEL PARÁ. V. Yerba Pará.
- YERBA DEL PARAL. V. Yerba Pará.
- YERBA DEL PRADO. V. Yerba de la Bermuda.
- YERBA DEL SAPO. Malvacea cultivada, el Hibiscus Abelmoschus, Lin. [V. Culantro cimarrón.]
- YERBA DEL TEJADO. Urticacea indígena, la Pilea depressa, Blume.
- YERBA GUANINA. V. Guanina.
- YERBA HEDIONDA. Leguminosa silvestre, la Cassia Occidentalis, Lin. ó Brusca y Martinica. [V. Guanina y Platanillo.]
- YERBA HEDIONDA VELLUDA. La Cassia hirsuta, Lin. f. [V. Platanillo.]
- YERBA JIGANTA. V. Acanto.
- YERBA LANUDA. [P. R.] Verbasco [V.] en Cuba.
- YERBA LECHERA. [Colmeiro.] La Euphorbia Cotinifolia, Lin.? [V. Lechera.]
- YERBA LIMÓN. V. Cañuela santa.
- YERBA LOMBRICERA. La Spigelia Anthelmia, Lin., Logania indígena, dicha también Yerba de las lombrices y, en P. R., Yerba de lombrices.
- YERBA LUISA. Lippia Citriodora, Kth [Aloysia, Ort., Verbena triphylla, L'Hérit.], Verbenacea cultivada.
- YERBA LUISA, CIMARRONA. [Pichardo.]?
- YERBA MARAVEDÍ. V. Maravedí.
- YERBA MORA. El Solanum nigrum, Lin.
- YERBA MULATA. Rumex sanguineus, Lin.
- YERBA OLDENLANDIA. [P. R.] V. Graciosa.
- YERBA PARÁ. Panicum molle, Sw., ó Yerba del Pará, Yerba del Paray Yerba de Paraná. Es una Gramínea silvestre.
- YERBA PLATA. V. Escarcha.
- YERBA POROSA. [P. R.] Compuesta silvestre, como en Cuba, donde carece de nombre vulgar. Es el Porphyrillum rudérale, Cass.
- YERBA ROMANA. V. Santa María.
- YERBA SAN GERÓNIMO. Orthopogon hirtellus, R. Br., Gramínea silvestre.
- YERBA TERRESTRE. [Pichardo.] Nombre erróneo. [V. Yedra terrestre.]
- YERÉN. s. m. Scitaminea cultivada, la Maranta Allouya, Aubl., ó Llerén, Llerenes, Lirén y Lairén.
- YRACAS. [Bachiller] V. Hiraca.
- YUA. [Fernández.] V. Ayúa.
- YUCA AGRIA. Manihot utilisima, Polh.
- YUCA BLANCA. V. Yuca dulce.
- YUCA CARTAGENA. Variedad del Manihot. Aipi, Planch. [V. Yuca dulce.]
- YUCA CIMARRONA. V. Yuquilla de ratón.
- YUCA DULCE. Manihot Aipi, Planch., ó Yuca blanca, Euphorbiacea cultivada. [V. Yuca Cartagena.]
- YUQUILLA. s. f. La Curcuma longa, Lin., ó Raíz americana y Rais de Madrás. [V. Azafrán del país y Sagú.]
- YUQUILLA DE PAREDÓN, DE HOJA MENUDA. La Zamia stricta, Miq., Cycadea silvestre.
- YUQUILLA DE RATÓN. La Zamia angustifolia, Jacq., ó Yuca cimarrona, Guáyara y Guáyiya; y la Zamia pumila, Lin.; Cycadeas indígenas.
- YUQUILLA DE RATÓN, DEL PINAR. Cycadea rústica, la Zamia media, Willd.
- YURAGUANO. s. m. Thrinax Miraguano, Mart., Palma indígena. Recibe, además, los nombres de Miraguano [V.], Guanichiche y Palma yuraguano [V.].
- YURAMIRA. [Pichardo.]?

YURUMA. [Bachiller.] La Yagruma macho [V.]

Z

ZABABEYES. [Bachiller.] [Aráb.] Variedad del Age [V.]

ZÁBIDA. [Aráb. *Sabar, Sabirat.*] s. f. V. Sábila. [Pichardo.]?

ZÁBILA. [Aráb.] V. Sábila.

ZAMIA (\*) GUTIERREZ. [Sauvalle.] No parece nombre vulgar, designando una Cycadea endémica, la Zamia Gutierrezii, Sauval.

ZANAHORIA. s. f. [Aráb. *Asfanoriáh.*] Umbellifera cultivada, el Daucus Carota, Lin. Presenta muchas variedades, de las cuales algunas se cultivan en Cuba, estas variedades se reúnen en tres grupos: 1) Z. blancas, de las que se encuentran en este país la Z. blanca de cuello verde y la Z. blanca de Breteuil; 2) Z. amarillas, la Z. amarilla de Archicourt; 3) Z. rojas, entre las que tenemos la Z. roja de cuello verde de Flandes y la Z. roja de Vilmorin.

ZANAHORIA AMARILLA DE ARCHICOURT. V. Zanahoria.

ZANAHORIA BLANCA DE BRETEUIL. V. Zanahoria.

ZANAHORIA DE CUELLO VERDE. V. Zanahoria.

ZANAHORIA GRUESA DE CUELLO VERDE DE FLANDES. V. Zanahoria.

ZANAHORIA ROJA DE VILMORIN. V. Zanahoria.

ZANCA DE GRULLO. [Pichardo.]?

ZANCARANA. [Pichardo.]?

ZANDÍA. [Aráb. *Sindi* (del país de Sin.)] s. f. V. Melón de agua.

ZAPAPOTE. [Fernández.]?

ZAPAPOTE COSTERO. [Fernández.]?

ZAPAPOTE DE LA TIERRA. [Fernández.]?

ZAPAPOTE DULCE. [Fernández.]?

ZAPATILLO. [Pichardo.]?

ZAPATO DEL OBISPO. *Commelina* species.

ZAPATÓN BLANCO. [Morales, Herbario del Instituto de la Habana.] Nombre cubano de la Leguminosa dicha en P. R. Gallito [V. este nombre en el texto y en las Adicciones y correcciones.

ZAPOTE. [Azt.] V. Sapote. [Achras Sapota, Lin.]

ZARAGATONA. [Aráb. *Bazar-Kathóná.*] s. f. Plantaginea exótica, el Plantago Cynops, Lin., y también la infusión mucilaginoso que se hace con sus semillas, únicas partes de la planta que se encuentra en Cuba.

ZARAPICO. s. m. El Iberis umbellata, Lin., ó Carraspique blanco [V. Zaraza.]. Carraspique morado y Pinito de flor.

ZARAZA. s. f. El Iberis odorata, Lin., Crucifera de jardines, dicha también Carraspique blanco. [V. Zarapico.]

ZARCILLA. s. f. Ortogafia más propia que la de Zarzilla [V.]; nombre que recibe la Gloriosa del país [V.]

ZARZA. s. f. Entre las Nyctagineas indígenas, tres reciben este nombre, son: *Pisonia discolor*, Spreng.; *P. obtusata*, Sw.; y *P. aculeata*, Lin., ó Uña de gato [V.]. Dáse, además, el nombre de Zarza al *Rubus durus*, Sauval., con una variedad que presenta, y al *R. ferrugineus*, Wikstr., entre las Rosaceas. En fin es Zarza también el *Celtis aculeata*, Sw., Urticacea indígena, dicha Uña de gato [V.] en la Vuelta Abajo.

ZARZA BLANCA. [Pichardo.]?

(\*) [*Zyua* (el cono del Pino).]



ZARZA MORA. [Morales.] V. Zarza. [Rubus ferrugineus, Wikstr.]  
 ZARZABACOA DE MONTE. [P. R.] Amor seco en Cuba [V.]. [Desmodium axillare, Cand.]  
 ZARZABACOA PELUDA. [P. R.] Amor seco en Cuba [V.]. [Desmodium barbatum, Benth.]  
 ZARZAPARRILLA. s. f. Nombre vulgar de tres Liliaceas indígenas, el Smilax Havanensis, Jacq., el S. oblongata, Sw. [V. Raiz de China.], y el S. syphilitica, Rich. (\*)

(\*) Aprovechamos la oportunidad para presentar el catálogo de las Liliaceas y Amaryllideas que crecen en Cuba, citando especialmente las especies que no tienen nombre vulgar, y enviando con éste al texto en el caso contrario.

## LILIACÉAS.

Las especies silvestres ó cultivadas que hay en Cuba son: I. SMILAX: 1º mollis, Willd. (S. triplinervia, Gris; non Willd., Wr, número 3231. *Zarzuela peluda.*); 2º lanceolata, Lin. ? (S. Laurifolia, Poepp.); 3º Pomingensis, Willd. (Wr, nº 1526), y var.  $\beta$ , Sagreana (Raiz de China [a y  $\beta$ ]). El S. Schlechtendalii, Kth, que Gris, le da por sinónimo á la esp., lo es de una var.  $\gamma$ , con una sub-var.  $\beta$ , no cubanas.; 4º oblongata, Sw. (Wr, nº 694. Raiz de China, *Zarzaparrilla*. Sauval, lo considera como var. del S. Havanensis, Jacq., careciendo de razón para creer que el S. oblongata, Sw., fuera mal empleado por Gris.); 5º Havanensis, Jacq., a, vulgaris (S. Havanensis, Jacq.?, var. impressa, Gris., Pl. Wright., pág. 536. S. coriacea, Spreng.?) forma dentata (Wr, nº 693, p. p.), forma ovata (Wr, nº 693, p. p.) [Raiz de China, *Zarzaparrilla*: ambos nombres á las formas cubanas de a.]; 6º Illicifolia, Kth. (S. Havanensis, Gris., p. p.), var.  $\beta$ , sub-lappacea; 7º no sabe-

ZARCILLA. [Pichardo.] Mala ortografía de Zarzilla [V.].

ZARZUELA PELUDA. El Smilax mollis, Willd., Liliacea.

ZIZANA ACUÁTICA. Hydropyrum esculentum, Link, Graminea cultivada?

ZUMAQUE BARNIZ. [Fernández.] V. Sumaque.

mos como reducir las esp. Balbisiana, Kth, y Pseudo-China, Rich., que cual una sola trae Gris., Cat. pl. Cub., pág. 250 (*Zarzaparrilla*); 8º no entendemos al S. syphilitica, Rich.,—II. DIANELLA? 1º «Cubensis, Rich.,—Las especies cultivadas se encuentran en nuestra *Flora de Cuba*, Habana, 1837, pág. 20. También se indican en el texto del actual libro, artículos: *Azucena*, *Bayoneta*, *Drago*, *Jacinto*, *Lirio turco*, *Mariagón*, *Palo-candela*, *Sábila*, *Soberbia*, *Tablero de dama*, *Tuberosa azul* y *Tulipán*, faltando agregar: 1º CORDYLINÉ BRASILIENSIS, Hort., *Drago del Brasil* [Dracæna, Hort.]; 2º ANTHERICUM RAMOSUM, Lin. [Phalangium, Lamk.]; y 3º HARTWEGIA COMOSA, Nees. [Phalangium viviparum, Reinw.]

## AMARYLLIDEAS.

Las especies, silvestres ó cultivadas, que hay en Cuba son: I. AMARYLLIS. 1º carinata, Spreng.; 2º V. Bruja; 3º V. Bruja; 4º V. Turaraco.—II. AGAVE: 1º «Antillarum, Desc.; 2º V. Magney.—III. FOURCROYA: 1º «odorata, Poir.; 2º V. Pita.—IV. POLIANTES: 1º V. Susana.—V. CRINUM: 1º BRUSSONETII, Herb., pluriflorum (cult.); 2º V. Lirio.—VI. ALSTROMERIA: 1º V. Gloriosa del país.—VII. PANCRATIUM: 1º V. Lirio de San Juan.—VIII. HYPOXIS: 1º V. Azafrán del país; 2º decumbens, Lin.; 3º Juncea, Sm.—IX. BURMANNIA: 1º bicolor, Mart.; 2º flavula, Sauval; 3º capitata, Mart.—X. APTEERIA: 1º setacea, Nutt.—XI. GYMNOZYPHON: 1º species (Ptychomeria tenella, Lindl. ?); 2º species. (Ptychomeria nivea, Gris.)



## ADICIONES Y CORRECCIONES.

---

- ACEITUNA AMERICANA.** [Morales, Herbario del Instituto de segunda enseñanza, de la Habana.] La *Bontia Daphnoides*, Lin., Selaginacea cultivada, única especie de la familia que hay en Cuba. Algunos le dicen *Bontia*.—*Colóquese en la página 10, debajo de Aceituna.*
- ALBAHACA ANISADA.**—*Agréquese:* Es una Labiada de jardín.
- ALBAHACA CIMARRONA.**—*Donde dice macranthum entiéndase micranthum. Después de Ocimum Americanum, Lin., agréquese: ó más bien, «O. canum, Sims.»*
- ALBAHACA DE HOJAS ANCHAS.**—*En lugar de bullatum es difforme.*
- ALBAHACA DE SABANA.**—*Refórmese así: El Eupatorium villosum, Sw. [E. Cubense, Cand.], ó Rompezaragüelles [V.] y R. de sabana. Es una Compuesta silvestre.*
- AIGA SENSITIVA.** Confervacea indígena, la *Ulva Lactuca*, Lin., ó Lechuga de mar.—*Colóquese en la pág. 14, debajo de Alfiler.*
- ANIGUAMAR.**—*Suprímase siboney.*
- ANIGUANIMAR.** [Oviedo.] Vale tanto como Aniguamar.—*Colóquese en la pág. 15, debajo de Aniguamar.*
- APICHÚ.**—*En lugar de siboney entiéndase: quíchua.*
- ÁRBOL DE LAS OREJAS.** V. Oreja de judío.—*Colóquese en la pág. 17, debajo de Árbol de la vida.*
- ÁRBOL DEL DIABLO.** V. Manzanillo.—*Colóquese en la pág. 17, debajo de Árbol del cuerno.*
- ASTRAPEA.** s. f. No es nombre vulgar. Malvacea cultivada, la *Dombeya species*. [*Astrapæa penduliflora*, Cand.]—*Colóquese en la página 18, debajo de Asclepias de Syria.*
- ATIBIUNEIX.**—*Suprímase indígena.*
- AUYAMA.**—*Refórmese así: s. f. [Pichardo.] Nombre de origen arábigo, usado en Santo-Domingo para designar la Calabaza común [V.]. Es sinónimo del término mejicano Ayote, no usado en Cuba, y no del chileno Sapayo ó Zapallo, que es la Calabaza amarilla.*
- AYOTE.** [*Armas.*] V. Auyama.—*Suprímase todo.*
- AZUCENA DEL MAR.** [P. R.] V. Verdolaga de costa.—*Colóquese en la pág. 19, debajo de Azucena de Méjico.*
- BADIERA.** Hoy se admite *Polygala Domingensis*, Jacq.; y P. *diversifolia*, Lin.
- BANDERILLA.**—*En vez de Ker, es Sellow.*
- BEJUCO DE INDIO.** ? Convolvulacea silvestre, la *Ipomæa tuberosa*, Lin.—*Colóquese en la pág. 22, debajo de Bejucos de hojas de carey.*
- BEJUCO DE PARALEJO.**—*Refórmese como sigue: [P. R.] El Stigmaphyllon fulgens, A. Juss. ? [Banisteria, Lin. B. ? bracteata, Cand.]; y el S. species [Banisteria? floribunda, Cand.]; Malpighiaceas silvestres, no cubanas. El *Tetrapterys inæqualis*, Cav.; y el T. *panicu-**

- lata, Bello: Malpighiaceas, dudosa en P. R. la primera, endémica la segunda, y no cubanas. El *Triopteris rigida*, Sw. [T. lucida, Kth. T. Havanensis, Kth.], dicho en Cuba San Pedro, de flor azul, lo mismo que una variedad de las selvas cubanas la cual tiene en sinonimia T. Jamaicensis, Lin.; non Sw. [V. Bejuco San Pedro.]
- BEJUCO DE PARALEJO, ROSADO. —*Suprimase todo desde donde dice También es de P. R. &ª Es Heteropteris más bien que Heteropteris.*
- BEJUCO SAN PEDRO. —*Entiéndase Stigmaphyllon.*
- BEJUCO SAN PEDRO, DE FLOR AMARILLA. —*Suprimase la última especie &ª*
- BELLA MARÍA. s. f. V. Sanguinaria. —*Colóquese en la página 23, debajo de Bella de noche.*
- BIJÁGUARA. —*Al terminar el párrafo agréguese: [V. Palo mabí.]*
- BONTIA. V. Aceituna americana.
- BOTÓN BLANCO DE ARENALES. —*En lugar de podocephala, Sauval, entiéndase species.*
- BOTÓN DE ORO. Léase: *Spilanthus Beccabunga*, Cand., Compuesta silvestre.
- BOTONCILLO. —*En vez de parviflora, Sauval, debe decir: species.*
- CABELLOS DE ÁNGEL. V. Faurestina. —*Colóquese en la pág. 28, debajo de Cabello de ángel.*
- CARIOTA. V. Palma. —*Corresponde á la pág. 35, debajo de Cariáquito blanco.*
- CERECERO. —*Refórmese así: s. m. Malpighiacea cultivada, la Malpighia Punicifolia, Lin.*
- CEREZAS. —*Refórmese así: [P. R.] Malpighiacea cultivada, la Malpighia biflora, Poir. ? [M. Punicifolia, Cav.; non Lin.]*
- CHINCHONA. —*Agréguese: También el Exostema [ó Exostemma.] ellipticum, Gris., y sus variedades β, rotundata, G.-M. [Exostemma rotundatum, Gris.]; y γ, triflorum, G.-M. [Exostemma triflorum, Gris.; non G. Don], Rubiaceas silvestres.*
- CLAVELÓN DE PLAYA. —*Desde Verbesina, léase arborescens, G.-M. [Borríchia, Cand.] En Cuba hay, además, la var. β, argentea, G.-M. [Borríchia, Cand.]*
- COLA DE PAVO. *Dictyotea* indígena, la *Padina Pavonia*, Lamour. [Zonaria, Ag.] —*Colóquese en la página 41, debajo de Cola de león.*
- CUERO. —*Entre las especies, debe admitirse: G. reticulata, Gris., y var. [G. Lindeniana Rich.]; &ª*
- CUERO DE HOJAS GRANDES. —*En vez de Guayabita, léase. Guayabito.*
- ECLIPTA BLANCA. [P. R.] *Desde Compuesta silvestre, léase*, siendo en realidad la *Eclipta erecta*, Lin.; var. [E. punctata, Lin. E. longifolia, Schrad. E. alba, Hasskarl, p. p.] Es silvestre en Cuba — careciendo de nombre vulgar — el tipo genuino de la especie *E. erecta*, Lin. ¿Existe en P. R. la *E.?* pusilla, Cand. ?
- ENCINA DE MAR. *Fucacea* indígena, el *Fucus serratus*, Lin. ? —*Colóquese en la pág. 47, debajo de Encina de España.*
- ENREDADERA DEL HACHA. —*En S. La-markii, bórrese Cand. y léase Gris.; en S. erecta, bórrese Gris. y léase Lin.*
- ESCOBA AMARGA. —*En lugar de bipinnatifida, entiéndase bipinnatifida.*
- ESCOBA CIMARRONA. —*Refórmese así: Malvacea silvestre, la Sida triquetra, Lin. [Abutilon triquetrum, Rich. Bastardia triquetra, Morál.]*
- GALLITO. —*En lugar de donde carece de nombre vulgar, léase: donde le dicen Zapatón blanco.*
- GARROCHO. [P. R.] *Malvacea silves-*

ESTA OBRA SE VENDE

AL PRECIO DE

CUATRO PESOS BILLETES

PARA LA HABANA

EN LA LIBRERÍA

LA ENCICLOPEDIA

REILLY NUM. 96.

ALORDA

IPR

LA ANTLA

DE G. CACHO-EGRETE

Calle Zulueta número 73.

En este establecimiento se hacen toda clase de trabajos con prontitud, esmero y á precios módicos.

En precio muy equitativo se venden tipos y demás útiles necesarios de una imprenta, así como también una máquina sistema Liberty número 4, todo de uso, pero en buen estado. Hay letra suficiente para un periódico y varios títulos.






DICCIONARIO  
BOTANICO

DE LOS  
NOMBRES VULGARES  
CUBANOS Y PUERTO-RIQUEÑOS


POR  
MANUEL GOMEZ DE LA MAZA

Doctor en Ciencias Naturales, Licenciado en Medicina, Secretario  
de la Sección de Ciencias de la Real Sociedad Económica,  
Miembro numerario de la Sociedad Antropológica, Ayudante  
del Jardín Botánico y del Museo de Historia Natural  
de la Universidad.

Mo. Bot. Garden,  
1895.



HABANA.  
Imprenta "La Antilla" de Cacho-Negrete.  
CALE DE ZULUETA NUM. 73.  
1889.





- tre, no cubana, la Quararibea turbinata, G.-M. (\*)
- GRACIOSA.—Donde dice Haley, léase: Halei.
- GUACO.—Hay una errata; léase: 6) Eupatorium Houstonis, Sw. [Mikania Swartziana, Gris.], ó Guaco de cabro en P. R. 7) Eupatorium species. [Mikania Trinitaria, Cand.] 8) Eupatorium &c.—Lo que sigue está bien.
- GUAGUACÍ.—Donde dice Tenstrœmioides, entiéndase Ternstrœmioides.
- GUÁIRO SANTO DE COSTA.—Donde dice Heteropteris, léase Heteropterys.
- GUAYABITO SAN ANTONIO.—Bórrese ó Yaya silvestre.
- GUAYACANCILLO DE COSTA.—Agréguese: [V. Rana.]
- GUERRERO.—s. m. [P. R.] En lugar de todo lo que dice póngase simplemente: [V. Vainilla.]
- IPECACUANA CIMARRONA.—Reformese así: Rubiaceae indígena, la Uragoga muscosa, G.-M. [Cephalis, Sw.]
- IPECACUANA DE MÉJICO.—Agréguese: [V. Violeta silvestre.]
- LECHUGA DE MAR. V. Alga sensiti-
- va.—Colóquese en la pág. 67, debajo de Lechuga cimarrona.
- MANZANILLA DEL PAÍS.—Donde dice Grangea species [Egletes Dominicensis, Cass.]; léase: Grangea Dominicensis, G.-M. [Egletes Cass.], y su var.  $\beta$ , viscosa, G.-M. [Egletes Less.].—Lo que sigue está bien.
- MIL EN RAMA. Rhodymeniacea indígena, el Plocamium pinnatum, Lamour?—Colóquese en la pág. 76, debajo de Milla.
- OGIERA.—En la nota, en lugar de es una de las tres Eleutheranthera citadas, léase: es la 4ª esp. de Eleutheranthera, ó sea la E. discoidea G.-M. [Wedelia, Schlecht.; Less. Wollastonia Lantanoides, Cand.], de Saint-Thomas.
- PALMA ENANA.—Suprímase la , que que hay después de species.
- PARALEJO VELLUDO. [P. R.] V. Vergajo de toro.—Colóquese en la pág. 86, debajo de Paraiso francés.
- PELOTA DE MAR. Nombre cubano [?] y español de una Confervaceae indígena, la Conferva Egagropila, Lin.—Colóquese en la pág. 87, debajo de Pegojo.
- PERALEJO DE PINARES.—Donde dice Cand, léase Rich.
- PERALEJO VELLUDO. [P. R.]—En lugar de cuanto dice, póngase: V. Vergajo de toro.
- POAYA.—En lugar de Cand, léase Balb.  
=Página 88, nota, línea 11, donde dice bicular entiéndase orbicular; línea 15, entre albumen y córneo suprímase la coma.

(\*) Gén. Quararibea, Aubl.—Sección Myrodia, H. Bn, Hist. pl., IV, 155. [Columna estaminal larga, 5-dentada, con 10-15 anteras insertas todas en su ápice.] = Q. turbinata, G.-M. [Myrodia, Sw. M. ovata, Fl. Mex. ic. ined.] Hojas alternas, cortamente pecioladas, simples, oblongas ó elípticas, lustrosas, lampiñas, coriáceas ó cartáceas. Cáliz apeonzado, irregular, 5-dentado. Pétalos 5, doble mayores que el cáliz. Ramos esparcidos. Puerto-Rico, Méjico.